





Ex Bibliotheca
majori Coll. Rom.
Societ. Jesu

14. 20. A. 5.

54' 5. 48

54:
d.
48.

*Pla. C. in d. Comp. del R.
B. Provinciale*

M

Della Camera del
compagno del Proute

278

1

7



ARITMETICA PRATICA,

278
2

COMPOSTA

AL P.F. STEFANO DI S. GREGORIO
di Napoli de' RR. PP. Scalzi Agostiniani
della Congregatione d'Italia.



errara, per Francesco Suzzi Stamp. Camerale.
Con licenza de' Superiori. 1642.
Si vendono in VENEZIA dalli Turrini.

Al Molto Illustre Sig. il Sig.

NIO. BATTISTA BERLINGHIERI.



FRA' l'affidue vigilie, e
continue fatiche delle
mie compositioni mo-
rali, nelle quali per
beneficio dell' anime
spiegauo le difficoltà,
che sogliono tal' hora auiluppare le
conscienze di meno pratici Mercanti
nelle diuersità de contratti, m' uscì
(non sò come) dalle mani vn' op-
etta pratica d' Aritmetica, e mentre
tauo dubbioso se la celauo per pare-
re à prima vista cosa aliena dalla mia
professione, o pure se la publicauo per
utilità, e solleuamento delle persone

occupate in diuersi negotij; Si frap-
 fero alla fine le preghiere di molti qua-
 li ponendomi auanti li occhi il bene-
 ficio, che poteua apportare, mi fecero
 vn'amorosa violenza, acciò lasciassi,
 che questo libretto accompagnasse co-
 me ombra il suo corpo, & in quella
 guisa à punto, che suole l'ombra, che
 fa il stile dell' horologio Solare, star
 sempre congiunta con il corpo dal qua-
 le procede, & à questo modo dimo-
 strare non solo il numero dell' hore,
 mà anco l'altre minutissime parti del
 tempo, così mi contentassi, che que-
 sta ombra uscita dal corpo delle ma-
 terie diffuse de contratti, dimostrasse
 minutissimamente non solo li numeri
 rileuanti, mà anco le minutie diuerse,
 che sogliono ben spesso mettere il cer-
 uello à partito nelli negotij più im-
 portanti; Mà perche m'accorgeuo,
 che si come à quella è necessaria la lu-
 ce del Sole, acciò faccia palese le di-
 stin-

5
tintioni del giorno, così à questa era
necessaria qualche luce, acciò dimo-
strasse più chiaramente la diuersità de
numeri; m'è parso bene porla sotto la
luce è li splendori di V. S. quale si co-
ne nell'altre professioni è rilucente,
così in questa non lascia di far mostra
le suoi raggi; non sdegni per tanto la
picciolezza del dono, che è à punto
come ombra; mà accetti l'effetto del-
la mostra di così numerose distinctio-
ni d'Aritmetica tanto necessarie, e non
degni l'affetto, che desidera offrirli co-
e maggiori, e degne della sua gene-
rosità. Ferrara li 20. Settembre 1642.

Di V. S. Mol. Illust.

Affectionatiss. Seruo

F. Stefano di S. Greg. de Scalzi Agost.

In-

4
**Licenza del Molto Reuerendo Padre
Vicario Generale de' Scalzi
Agostiniani.**

NO I F. Gioseppe dalla Madre di Dio Vic. Gen. della
Congregatione delli Scalzi Agostiniani d'Italia
hauendo inteso esser stato composto dal R. P. Stefano
di S. Gregorio nostro Theologo vn libro intitolato *Arit-
metica pratica*, quale d'ordine del nostro Commissario
Generale, e stato reuisto, & approvato dal R. P. Bonifa-
cio di S. Andrea Lettore, & Priore del Conuento de SS.
Agostino, e Mauro di Commacchio, e dal R. P. Simone
dall' Assonta Priore del Conuento di S. Gioseppe di Fer-
rara nostri Theologi, a quali ciò commisse; Intendendo
hauer a riuscire opera utile, e di commune beneficio, se-
sia fatta publica per mezzo delle stampe, concediamo li-
cenza al predetto R. Stefano di stamparla; osservando
prima le cose da osservarsi. Data in Napoli nel nostro
Conuento di S. Maria della Verità li 26. di Luglio 1642.

F. Gioseppe dalla Madre di Dio Vic. Gen.

Stall. lib. 2. V. 111
Locus Sigilli

omne. Agostiniani
F. Constantino da S. Nicola Secr. Gen.

In-

7

Indice de Trattati, & Cap. pi, che si contengono in quest'Opera.

Della Numeratione Tratto I.

Forma delle figure dell' Abaco, & natura di esse.

Cap. I.

Numeratione de Numeri intieri. Cap. II.

Additione de Numeri intieri, ouero Assummare.

Cap. III.

Della Sottrattione. Cap. IV.

Della Multiplicatione. Cap. V.

Della Diuisione. Cap. VI.

De Numeri rotti, ouero minutie.

Trattato II.

Numeratione de Numeri rotti. Cap. I.

Additione, ouero Assummare de Numeri rotti.

Cap. II.

Sottrattione de Numeri rotti. Cap. III.

Multiplicatione de Numeri rotti. Cap. IV.

Diuisione de Numeri rotti. Cap. V.

Minutie de minutie. Cap. VI.

Della inscriptione. Cap. VII.

Pratica de Numeri intieri, & minutie. Cap. VIII

Re-

Regola del Tre. Trattato III.

Della regola del Tre, e come si facci. Cap. I.

Regola del Tre euclidea. Cap. II.

Regola del Tre composta. Cap. III.

Della Società. Trattato IV.

Che cosa sia Società. Cap. Vnico.

Delle Allegationi. Trattato V.

Che cosa sia Allegatione, & come si facci. Cap. I.

Delle false positioni. Trattato VI.

Che cosa sia falsa positione, & come si facci detta.

Regola. Cap. I.

Delle false positioni doppie. Cap. II.

Delle progressioni Arithmetiche. Tr. VII

Che cosa sia progressione Arithmetica, & come si facci. Cap. Vnico.

Delle progressioni Geometriche. Tr. VIII

Che cosa sia progressione Geometrica, & come si facci. Cap. Vnico.

Della Radice Quadra. Trattato IX.

Che cosa sia radice quadra, & come si caui dalli numeri. Cap. Vnico.



ARITMETICA PRATICA.

Forma delle figure dell'Abaco, & natura
di esse. Cap. I.



*A*ritmetica pratica, ouero l'arte
dell'Abaco contiene in se cinque par-
ti, cioè Numeratione, Additione,
Sottrattione, Multiplicatione, &
Divisione. Tutta la difficoltà di
detta Arte consiste in cognoscere le
figure, delle quali ella si serue, & sa-
pere bene la natura di dette figure. Le figure dunque
delle quali ella si serue sono dieci di questa forma; cioè
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. le quali hanno il lor proprio si-
gnificato aalli luochi, nelli quali risiedono, verbi gratia
la prima figura si chiama uno, perche risiede nel primo
luoco, la seconda si chiama due, perche risiede nel secon-
do luoco, & così di mano in mano sino alla nona figura.
Dopo viene la decima, chiamata zero, che da per se non
significa cosa alcuna, ma dà sì bene cognitione, & gran
for-

forza alle figure, alle quali ella si accompagna, che per ciò viene chiamata similmente (cifra) poiche la cifra da se stessa, benchè pari non significhi cosa alcuna, nondimeno significa assai, accompagnata con il concetto del proferente conforme al presente diremo; dubiando la natura di dette figure.

La natura dunque di dette figure è, che essendo accompagnate insieme, la prima da vigore alla seconda, & fa, che significhi dieci volte più di quello prima significaua. Aduertendo, che le prime figure in quest'arte, sono quelle, che sono ultime da farsi, & le ultime sono quelle, che sono le prime a farsi; di modo che essendo accompagnato verbi gratia l'uno con il due in questo modo, 12. il due si chiama la prima figura, & da vigore alla figura dell'uno, che dichia dieci, restando il due nel suo essere di modo, che dette due figure diranno dodici, alle quali se vi si aggiungerà un'altra figura, farà l'istesso effetto, cioè farà, che le due figure antecedenti dichino dieci volte più, che prima diceuano, verbi gratia aggiungendo alle 12. uno cinque in questo modo 125. l'uno non dirà più dieci, ma cento, cioè dieci volte più di prima, & il due non dirà più due, ma vinti, dieci volte più che prima, & il cinque resta nel suo essere, di modo, che dette tre figure dicono centouinticinque, & se a dette figure vi si aggiungesse un'altra figura, farebbe similmente, che tutte le tre figure antecedenti dicessero dieci volte più che prima diceuano, verbi gratia se si aggiungesse uno zero, benchè detto zero non dichia cosa alcuna, nondimeno fa l'istesso effetto, che fanno l'altre figure, cioè fa, che tutte l'altre figure antecedenti, dichino dieci volte più di quello prima diceuano, & così l'uno, che diceua cento, direbbe mille, il due, che diceua vinti, direbbe ducento,

il cinque, che diceua solamente cinque, direbbe cinquanta, si che queste quattro figure 1250. dicono mille duecento cinquanta, & così di mano in mano sempre, che si aggiunge una figura fa, che l'altre antecedenti dichino dieci vol'e più che prima diceuano, conforme meglio vederemo nel seguente capitolo della Numeratione.

Per la natura di dette figure si suole dare ad' imparare alli principianti di dett' Arte, dicendoli, che la prima figura si chiama numero, la seconda decina, la terza, centenaro, la quarta migliaro, la quinta decina di migliaro, la sesta centenaro di migliara, la settima milioni, l'ottaua decina di milioni, la nona centenaro di milioni, la decima migliaro di milioni, la vndecima decina di migliara de' milioni, la duodecima centenaro di migliara di milioni, nella decima terza si cominciano milioni de' milioni, & si va ascendendo similmente per decine, centenara, & migliara, conforme si è fatto nelli numeri precedenti, & meglio vederemo nel seguente capitolo della Numeratione.

Numeratione de' numeri intieri.

Cap. II.

IL numerare non vuol dire altro, se non che uno esprimere, cioè dichiarare qualsiuoglia numero con le sue proprie figure, quale figure, già habbiamo detto essere dieci, noue de quali si chiamano figure significative, & una, cioè il zero, si chiama figura non significativa; la natura di dette figure, già l'habbiamo detta, al presente solamente resta dirsi il modo da farsi detta Numeratione.

Il modo di fare qualsiuoglia numeratione di qualsiuoglia

glia numero proposto è, spartire detto numero in più membri; & qualsiuoglia membro contenghi solo tre figure con fare vn punto, ò linea frà la terza, & quarta figura dalla parte di sotto, & così similmente frà la sesta, & settima, cominciando dalle prime figure, & così di mano in mano sino al fine, come si vede in questo esempio.

I
7.201.234.569.

Et se saranno figure assai, per sapere pronunciare li milioni, si potrà fare per ogni settima figura vno numero di sopra, cioè nella prima settima figura vno 1. conforme si vede fatto nel sopradetto esempio; che vuol dire, che da quella figura cominciano li milioni, nell'altra settima figura, che sarà terzadecima, si fa vn due, & vuol dire, che cominciano li milioni di milioni; alla terza settima, che sarà la decimanona in ordine, si fa vn tre, & vuol dire, che da quella figura cominciano li milioni de milioni, de milioni, & così si fa di mano in mano, per ogni settima figura crescendo vn numero, di modo, che appresso poi si farebbe vn quattro, poi vn cinque, &c. & detti numeri di sopra posti significano, che tante volte si deue porre questa parola milione, nella pronunziazione di detti numeri, v. g. in questo numero.

3 2 1
6.423.571.567.325.432.152.

Il tre sopra al sei significa, che in quel sei si hà d'aggiungere tre volte questa parola milioni, la prima in diretto, & l'altre in obliquo, & così si dice, sei milioni, di milioni, de milioni. Il due significa, che in i si hà da dire solamente due volte, cioè milioni di milioni, & l'uno significa, che si hà dire solamente una volta milioni.

Per

Per sapere addesso pronunciare detto conto, bisogna intendere, che conforme l'infimi numeri, si pronunciano con numeri, decine, & centenara, così ancora si hanno da pronunciare li milioni, con aggiungerui solamente quella parola milioni tante volte, quante vi v'è meste. Et se ancora conforme l'altre seguenti tre figure si pronunciano con numeri, decine, & centenara de migliaia; così parimente le seconde tre figure dopò li milioni, si pronunciano con numeri, decina, & centenara di migliaia di milioni, di modo, che la differentia, che è fra la pronuncia delle tre prime figure, & le seconde è solamente, che nelle seconde se ci aggiunge questa parola milia, si che dunque il presente esempio, che quiui replica.

6.423.571.567.325.432.152.

si pronuncia in questo modo, sei milioni, di milion, di milioni, quattrocento vintitre milla milioni, di milioni; si dice due volte, perche questa è operatione spettante al due, che è sopra l' vno l' altre tre lettere dicono cinquecento settant' vno milioni, di milioni, cinquecento sessanta sette milia milioni, trecento vinticinque milioni, quattrocento trentadue milia, cento cinquanta due; si che bisogna pronunciare sempre tre figure per volta, sempre che si può, acciò non si faccia errore.

Dico. sempre, che si può, perche molte volte occorre in dette tre figure, che vi sia qualche zero, & due ancora con una sola figura significatiua, & all'hora si pronuncia solamente la figura, & le figure significatiue, come v. g. in questo esempio.

2.005.032.

La figura del due dice due milioni, ma l'altre tre figu-

ve dicono solamente cinque milia, di modo, che quelli due zeri servono solamente per dare vigore al due, poi che se non vi fossero detti due zeri direbbe insieme con il cinque venticinquemilia, conforme le tre prime figure dicono solamente trentadue, sì che tutto detto numero si pronuncia due milioni cinquemilia trenta due.

Così similmente si ha da osservare, quando sono figure assai, con pronunciare solamente le figure significative, come si vede in quest' altro esempio.

27. 235 063. 005. 060. 053. 007.

Doue vedi, che il primo membro da pronunciar si tiene solamente due figure, & però si pronunciano solamente dette due figure in questo modo, venti sette milioni, di milioni, di milioni, ducento trenta cinquemilia milioni, di milioni, sessantatre milioni, di milioni, cinque milia milioni, sessanta milioni, cinquantatre milia, & sette, sì che si vede, che solamente le figure significative si pronunciano, & si cognosce la natura di dette figure, & insieme la natura del zero, cioè cifra, che differisce solamente dall' altre in quanto, che da per se non significa cosa alcuna, ma si bene da l' istessa forza, & vigore di tutte l' altre figure, che auanti d' essa si pronuntiano, conforme fanno tutte l' altre figure significative.

Additione de' Numeri intieri, ouero

Assumere. Cap. III.

Assumere, ouero additione de' numeri, non vuol dire altro, che vna radunanza, cioè collectione de più partite de numeris quale partite si pongono l' vna sopra l' altra, & le prime figure si de nono porre sotto la

pre.

prima, le seconde sotto la seconda, & così di mano in mano sin tanto, che ti ne sono da porre, & quelle partite, che tengono poche figure, si deuono porre di modo, che il mancamento si ueda dalla mano sinistra, cioè nell'ultime figure, conforme si vede in questo esempio.

Doue vedi, che le figure del secondo numero corrispondono con le sue quattro figure solamente ad altre quattro di sopra, & il terzo numero vi corrisponde solamente con tre figure, il quarto poi corrisponde non solo a tutte le cinque figure di sopra, mà ne tiene una souerchia da mano sinistra.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | 2 | 3 | | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | | | | |

Si summano poi dette figure in questo modo, con cominciare dalle prime figure, e si può cominciare tanto di sopra, come di sotto, con tirare prima una linea di sotto detti numeri, conforme si vede nel detto esempio; dopò si aggiunge la prima figura con tutte l'altre prime dell'altre partite, & nel fine si pone il sopra più delle decine, di sotto la detta linea con aggiungere dette decine alla seconda figura da assummarsi; come v. g. nel sopradetto esempio, si unisce il 6. con il 5 che fanno vndeci, vi si aggiunge il 3. che fanno quattordici, ultimamente vi si pone il due, che sono sedeci; si pone dunque il 6. che è il sopra più della decina, sotto la linea, & si porta la decina d'aggiungere al 2. figura seconda da assummarsi, & si dice tre, & due di sotto sono cinque, si pone detto 5. sotto la linea, poi si pigliano le terze figure da assummarsi con dire tre, & due, sono cinque, quattro, che sono noue, e tre dodici; si pone il due sotto la linea, & si porta una decina, quale unita con il 4. dice cinque, e sette sono dodici, si fa due sotto la linea,

Et si porta una decina, quale vnita con il 5. dice 6. Et 5. che sono undeci, si fa vno sotto la linea, Et si porta una decina, quale vnita con il 6. dice sette, si pone detto 7. sotto la linea, conforme il tutto si vede già fatto in detto esempio, Et summano dette partite settecento dodici milla, ducento cinquanta sei.

Si è d'aduertire, che può accadere di douersi assumere molte quantità di partite, di modo, che con assumere solamente le prime figure, si passi il centenaro, Et così in tal caso si hà da porre il sopra più del centenaro sotto la linea, Et detto centenaro, o centenara, si dicono in tante decine, Et si aggiungono alla seconda figura da assumersi v. g. in questo esempio.

| | |
|--|------|
| Assumate le prime figure, summano | 568 |
| cento, Et due, si pone il due sotto la linea, | 19 |
| Et si portano dieci decine quali vnite con il | 326 |
| 6. si dice sedeci, Et vnite con tutte le seguenti figure, summano trenta nove. si fa | 5407 |
| nove sotto la linea, Et si portano tre qua- | 658 |
| le vnite con il 5 summano 8. Et vnite con | 25 |
| le seguenti, summano quaranta quattro. si | 456 |
| fa il 4. sotto la linea, Et si portano 4. qua- | 207 |
| le vnite con il 5. summano 9., Et aggiun- | 309 |
| toni l'altro di sotto sono dieci, si fa dieci sotto | 1358 |
| la linea, Et summano tutte dette figure | 505 |
| diecimilla quattrocento nouanta due. | 127 |
| | 203 |

Ma il meglio consiglio è, quando occorrono tante partite da assumersi, farne di quelle tre, o quattro classe, acciò facendo qualche errore non s' habbi sempre da cominciar da capo, ma in più classe diue, si assummano tutte dette classe da per se, Et poi si possono vnire

vnire

vnire tutti in vna summa, che così facilmente si le fa errore in vna classe, subito si vede, & facilmente si può correggere, come si vede in questi esempi.

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 7652 | 3023 | 5026 | 8032 |
| 503 | 720 | 4560 | 326 |
| 604 | 522 | 605 | 530 |
| <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 8759 | 4275 | 10191 | 8888 |
| | | | 10191 |

Di modo, che vadunate tutte dette partite insieme, summa trentadue milla cento, e tredici.

dico — 32113

Fatte dette operationi, si sogliono dare alcune regole per cognoscere se dette operationi sono state ben fatte; la prima de quali, & la più vsitata è quella del noue, la quale si fa in questo modo; primieramente si leuano li noue da tutti li numeri, quali sono stati assummati, sempre che si può, sino all'ultima figura; & il sopra più delli noue, ouero il numero inferiore alli noue, si pone alla mano sinistra della croce; di poi il simile si fa da tutta la summa assummata, & si stà ben fatta la operatione, risponderà l'istessa figura, come la prima. da porsi nella mano destra di detta croce, acciò si vedano siano simili, & si cognosca l'operatione esser ben fatta, conforme già si vede nelli esempi sopra posti.

Detti noue si leuano in questo modo, cioè si vnisce vno numero di vna figura, con l'altra dell'altre figure, ad vna per vna, & passando il numero de' noue, si lascia da detti noue, & il rimanente si porta da numerarsi con l'al-

l'altre figure, conforme con li esempi si farà chiaro, v. g.
 dà questo esempio; si leuano li noue in questo
 modo, cominciando dal numero assumendo, 653057
 sono 6. & 5. fanno vndeci, leuando noue re- 5353
 stano due, & 3. che vengo appresso sono cin- | ———
 que, & cinque seguitano, che sono dieci leua- 658410
 re noue resta vno, & sette, che seguono sono
 8. & 5 sono tredici, leuate noue restano 4.
 & tre seguitano, che sono sette, & 5 ap- 6) (6
 presso, che sono 12. leuate li noue, restano 3.
 & 3. seguitano, che sono 6. detto 6. si pone
 alla mano sinistra della croce; poi si leuano l. 9. della sum-
 ma fatta sotto la linea, dicendo sei, & cinque sono vnde-
 ci, leuate li noue restano due, & 8 appresso, sono dieci,
 leuate li noue resta vno, & 4. sono 5. & dopo vno, che
 sono sei, detti sei si pongono a mano destra della croce,
 & si vede, che dette due figure della croce sono eguali,
 segno, che l'operatione, e ben fatta, altrimenti bisognerebbe
 farla di nouo, & in questo modo si leuano li noue
 da qualsiuoglia numero, il che bisogna ben sapere; per che
 in tutte l'altre operationi, che diremo appresso, si fa sem-
 pre dell'istesso modo.

Quando occorre leuare li noue da qualche partita, che
 le figure non arriuassero à noue, quel numero, che consti-
 tuiscono dette partite, quello si ritiene, & si pone nella
 parte della croce v. g. da questo numero 123. non si pos-
 sono leuare li noue, perchè le figure non summano più,
 che sei, di modo, che detto numero 6. vuol dire essere già
 leuati li noue da detto numero cento ventitre, & resta-
 no 6. conforme similmente da 120. leuando li noue, re-
 stano tre parimente da 53. leuati li noue restano 8. quando
 poi dette figure arriuano à noue, si farà vno zero alla
parte

parte della croce conforme in questi
esempj si vede .

108

135

0)(0

Doue nel primo esempio, leuando

252

li noue tanto dal numero da assum-

—

marfi, quanto dalla summa di esso,

495

resta zero; così similmente nel se-

—

condo, leuando li noue tanto del nu-

120

mero da assummarfi, quanto dal

200

numero assummato restano otto .

120

8)(8

Detta regola del noue, benchè

—

sia optima, nondimeno in se stessa è

440

falsa, poiche può essere, che vno fac-

—

ci errore in lasciare vna partita di 9.

ò più partite, che costituischino noue, & così nella proua
si ritrouerà bene, non ostante, che

veramente la summa sia falsa, v. g.

120

in questo esempio; poniamo caso,

200

che vno habbia assummato per er-

139

rore dette partite, & habbi fatto

—

cinquecento quaranta noue, confor-

549

0)(0

me si vede in detto esempio. Certo

e, che la summa è falsa, nondimeno in quanto alla pro-

ua v'è bene; così ancora in quest' al-

tro esempio, doue si vede, che la

2952

summa di detto esempio è falsa, &

3051

nondimeno la proua è buona, sì che

4956

si vede chiaramente detta regola

—

6)(6

esser falsa, si seruono con tutto ciò li

10059

Mercanti di detta regola, perche

li errori detti sonoouerchi grossi, & non si possono fare

senon che quasi volontariamente: ò da persone assai igno-

rante, massime in così numero giusto di noue, essendo, che

li

li errori possono essere di due, ò 3. ò altra summa piccola; ma di summa così grossa. & giusta, e quasi impossibile.

Oltre questa regola, vi è anco l' altra regola del sette; quale si fa in questo modo, si buttano, ouero si leuano li sette di tutte le partite, che si hanno da assumere, & finita vna partita si pone il rimanente delli sette dietro vna linea, auuertendo; che non si fa conforme si è detto del noue; anzi in questa regola le prime figure, dalle quali si comincia l' operatione, sono decine, con le quali si vnifcono li numeri delle figure seguenti, & da detto numero si leuano li sette, conforme con esempj farò il tutto chiaro.

Si hāno da leuare v. g. li sette da questa $1253 \mid 0$. partita si dice dieci, & due, sono dodici, leuati li sette, bisogna vnire la prima, & seconda figura insieme, & poi leuar li; detto cinque dice cinquanta, quali uniti con l'altro cinque fa cinquanta cinque, dal quale numero leuate li sette, restano sei, qual sei dice sessanta, & uniti con il 3 dice, sessanta tre, da quali leuati li sette resta zero, quale si pone dietro la linea, conforme vedi in aetto esempio.

Quando poi sono più partite da assumersi, & si ha da vedere per questa regola, se sia ben fatta l' operatione si fa in questo modo, v. g. in questo esempio, perche la prima figura è 7. si leua assolutamente poi dice da vintre tre, leuate li sette restano due, quali uniti con il zero, dicono vinti, leuati li 7. restano 6. qual sei con il cinque appresso dice sessantacinque, leuati li 7. restano due, quale due si pone incontro alla detta partita $72305 \mid 2$
 $2210 \mid 4$
 $5022 \mid 5$
 $15 \mid 1$

 $81562 \mid 5$) (5
 dietro la linea, come vedi già fatto in

detto

detto esempio . Dopò si leuano li 7. dall'altre partite dell' istesso modo , & si dice da trenta due leuati li sette , restano 4. quali vniti con l'vno, dice quarant' vno, leuati li sette restano sei , quali vniti con il zero dice sessanta, da quali leuati li sette restano 4. da porsi similmente dietro la linea; poi da sessanta leuate li sette, restano 4. vniti con il tre , dicono quaranta tre , leuati li 7. resta vno , quale vnito con il due dice dodici , & leuati li sette , restano 5. da porsi similmente dietro la linea; poi da 15. leuati li 7. resta vno da porsi dietro la linea . Dopò si assummano le figure messe dietro detta linea , & si dice due , & quattro sei, & cinque undeci , & vna , che sono dodici, da detti dodici , leuati similmente li sette , restano 5. & detti cinque si pongono à mano sinistra della croce, poi si fa dell' istesso modo al numero assummato , nel quale non essendoui errore , darà l' istessa figura da porsi à mano destra della croce .

Si dice dunque nel numero già assummato in detto esempio , che è 81562. da 8. leuate 7. resta vno . Aduertendo , che hora non si vnisce la prima figura con la seconda per leuare li sette , perche la prima figura in se già contiene detto 7. , & così si hà da far sempre , resta dunque vno, quale vnito con l' altro vno , dice undeci , da quali leuati li 7. restano 4. , quali vniti con il 5. dice quaranta cinque , da quali leuati li 7. restano 3. , quali vniti con il 6. dice trenta sei, & leuati li sette resta vno, quale vnito con il due dice dodici , da quali leuati li 7. restano cinque da porsi à mano destra della croce , & così si vede, che stà ben fatta l' operatione .

Et benchè questa regola ancora possi fallire, conforme si è detto del noue; nondimeno si risponde dell' istessa maniera; ben vero , che questa non è troppo usitata per es-

sere

sera troppo lunga, & assai più fastidiosa; mà per volerse
seruire di detta regola è necessario hauea una buona
prattica delli numeri, che contengono
detti sette, acciò non si habbia tanto da
faticare, che perciò si è fatta la pre-
sente tabella quale bisogna hauerla be-
ne in patta.

7 — 0

14 — 0

21 — 0

28 — 0

35 — 0

42 — 0

49 — 0

56 — 0

63 — 0

70 — 0

Si dà ancora vn'altra regola, ouero
auuertimento per vedere se si fosse er-
rato, & è, che si deuono summare det-
te figure più volte di sopra, & da bas-
so, che facilmente si vederà, se vi è er-
rore, il che basti per detta additione,
ouero assumere.

Della Sottrattione. Cap. IV.

Sottrattione non vuol dire altro, se non che subducere,
cioè leuare vno numero minore, dal maggiore, &
facilmente si potrà conoscere quale sia il numero mag-
giore, ò minore dalla quantità delle figure, & se fossero
partite eguali di figure, si conoscerà dalle prime figure,
cioè da quelle, che sono le prime à farsi, & quale sarà mag-
giore, quella partita sarà similmente
maggiore dell'altra, come v. g. in que-
ste partite, benche siano di eguale nu-
mero, anzi benche la partita di sotto
habbi tutte le figure maggiori di quella di sopra, eccetto
la prima, nondimeno è la minore partita, per causa, che
la figura prima della prima partita è maggiore. Dopò,
che se sarà conosciuto questo, si hà d'auuertire, che nel
sottraere sempre la partita maggiore si pone sopra, & la
mi-

| | |
|--|--------|
| | 702141 |
| | 634352 |

minore di sotto, in questo modo, cioè si pongono le prime figure di mano destra, l'una corrispondente à l'altra, poi le seconde, & poi di mano in mano sin tanto si può di modo, che il difetto, ò mancamento si veda nelle figure di mano sinistra, si fa poi una linea sotto dette partite, & si fa la sottrattione in questo modo.

Si comincia a fare la sottrattione dalle prime figure di mano destra, & hauendo sottratto una figura minore dalla maggiore di sopra, si pone il residuo sotto la linea in corrispondenza di detta figura sottratta. Auuertendo, che quando la figura di sopra è minore di quella di sotto, all'hora non si potria fare la sottrattione, & perciò in tal caso detta figura di sopra minore, si fa imprestare una decina dalla prima figura significatiua, che appresso di lei viene, restando detta figura con una decina meno, cioè si sarà un cinque, resterà quattro, & così di mano in mano, & si sarà uno, cioè una decina, resterà zero; & si frà le dette figure vi fossero uno, ò più zeri, detti zeri si fanno 9. & da detti noue, si fa la sottrattione, conforme con esempi dichiararemo il tutto.

Hauendo da fare questa sottrattione v. g. si fa in questo modo cominciando dalle prime figure di mano destra; da quattro si hanno a leuare sette, mà non si può, per essere il sette maggiore del quattro, acciò dunque il quattro sia maggiore, si fa imprestare una decina dalla tre figura più prossima significatiua, restando detto tre due, di modo, che detto quattro diuenta quattordici, & se dice da quattordici, leuate sette restano sette, quale sette si pone sotto la

63523004

55674557

5848447

63523004

5)(5

linea

stare una decina del cinque figura à lei più prossima significatiua, restando detto 5. quattro, & così si dice, da dieci leuate 5. restano cinque da porsi sotto la linea, dopo seguita il zero, il quale rimane 9. per la detta operatione fatta, & così se dice da 9. leuate due, restano 7. da porsi sotto la linea, di poi si dice da 4. leuate 3. resta uno da porsi sotto la linea, dopo seguita il zero, dal quale non si possono leuare sette, & così detto zero si fa imprestare una decina del sei, quale resta cinque, & si dice da dieci leuate sette restano 3. da porsi sotto la linea, li tre altri zeri restano noue per causa di detta operatione, & così si dice da noue leuate sei restano 3. da 9. leuate 5. reno 4. da 9. leuate 3. restano 6, & da cinque leuate 4. resta uno, conforme il tutto vedi fatto in detto esempio.

Benche detto modo di Sottrarre, con farsi imprestare una decina dalla figura più prossima significatiua, quando occorre, che la figura di sopra sia minore di quella di sotto (aduertendo, che quando fosse, eguale si faria uno zero di sotto la linea) sia assai vsitato, nondimeno è ancora un altro modo assai similmente facile, & vsitato; & è, che in tal caso si piglia la differentia, che è trà la figura di sotto, & la decina, v. g. se la figura di sotto è 5. la sua differenza sarà 5. perche cinque ci vogliono sino à dieci, detta poi differentia di 5. si aggiunge con la figura di sopra, v. g. se fosse detta figura di sopra 3. dal quale non si può leuare 5. si piglia la sua differentia de 5. & si vnisce con il tre, che fanno 8. da porsi sotto la linea; ma in tal caso si aggiunge poi una decina alla prossima seguente figura di sotto di modo, che se sarà 2. diuenterà 4. & così di mano in mano si va facendo sempre, che occorre non potersi fare la sottrattione, per essere la figu-

significatiua, dalla quale si possa sottrahere detta decina, come si chiarirà con questo esempio, doue si dice da due leuate 1. resta 1. da poi si sotto la linea, da 4. non si possono leuar 7. si piglia la differentia, che sono tre. & uniti con il 4. fanno 7. da poi si sotto la linea, & il 3. diuenta 4. & da zero non si possono leuare 4. si dice da 4. sino a dieci sono 6. si fa 6. sotto la linea perche detto 6. non si può unire con il zero, che non è figura significatiua. Et perche appresso al detto 3. non ci seguita altra figura significatiua, alla quale si potesse aggiungere la decina; però se finge vna decina sotto l'altro zero, & perche da zero non si può leuare vno, però si piglia la sua differentia da vno sino a dieci, che sono noue, & detto noue si pone sotto la linea, se finge similmente vn'altra decina sotto il cinque, & si dice da cinque leuato vno resta 4. & così vien finita l'operazione conforme si vede in detto esempio.

Fatta, che sarà detta operatione, bisogna esaminare se stà ben fatta, il che si può fare in questo modo, cioè per la regola del noue, è per quella del sette, la terza è cō assumere il numero fatto sotto la linea con il numero sottratto, & se detti numeri assunti renderanno l'istesso numero, dal quale si è fatta la sottrattione, è segno, che l'operatione è fatta buona, conforme si vede nellisopradetti esempi; la quarta regola è sottraere il numero sottratto messo sotto la linea dal numero principale di sopra, che renderà il numero sottratto, se però starà ben fatta l'operatione, poi che conforme il numero da sottrarsi, da il numero di sotto la linea, così detto numero di sotto la linea sottratto dal numero principale, renderà le figure del

500042

371

499671

500042

$$\begin{array}{r} 2 \end{array} \left(\begin{array}{r} 3 \end{array} \right.$$

numero sottratto, che stà in mezzo, & dette due ultime regole sono infallibili, che non sono così l'altre, come di sopra habbiamo detto, & tutte dette quattro regole, le prouaremo con il presente esempio.

In questo esempio vi sono tutte le quattro regole, con le quali tutte si vede detta operatione starà ben fatta; la prima è del 7. & facendoci detta proua se dice, da cin-

| | | |
|--------------------|---|--------------------|
| Regola del 7. | $ \begin{array}{r} 999 \\ 500764 \\ \underline{2781} \\ 4997983 \\ \underline{4997983} \\ 2781 \end{array} $ | Regola del 9. |
| $6 \overline{) 6}$ | $ \begin{array}{c} 2 \\ 4 \end{array} $ | $4 \overline{) 4}$ |

quanta, leuate li 7. resta uno, dipoi da dieci leuate 7. restano tre, poi da trenta leuate li 7. restano due, appresso da 27. leuate li 7. restano 6. da sessantasei leuate li 7. restano tre, da trenta quattro leuate li 7. restano 6. da porsi à mano sinistra della croce, poi si lenano li sette tanto dal numero sottratto, quanto dal numero rimasto, cioè quello, che stà fatto sotto la linea, se dice dunque da 27. leuate li 7. restano 6. da 68. leuate li sette restano 5. da 51. leuate li 7. restano due da porsi dietro la linea, conforme vedi già fatto in detto esempio. Poi si comincia l'altro dicendo da 49. leuate li 7. non resta cosa alcuna; da 9. leuate 7. restano 2. da 27. leuato li 7. restano 6. da 69. leuate li sette restano 6. da sessanta otto leuate li 7.

resta-

restano 5. da 53. leuate li 7. restano 4. da porsi dietro la linea, conforme già si vede fatto; poi si uniscono questi due numeri di dietro la linea, & si vede, che summano 6. da porsi à mano destra della croce, & così si vede, che l' operatione stà ben fatta, perche già corrispondono in se la figure di detta croce.

Vi è similmente in detto esempio la regola del 9. quale se esamina in questo modo, cominciando dal numero principale sono cinque, & 7. che sono dodici, leuati li 9. restano 3. quali uniti con il 6. fanno 9. si butta detto 9. poi si dice 4 quale per non hauere altre figure, si pone à mano sinistra della croce, poi si leuano li 9. tanto dal numero sottratto, quanto dal rimanente di sotto la linea in questo modo, due, & sette sono 9. si butta detto 9. seguita 8. & uno, che sono 9. si butta similmente detto 9. poi seguitano 4. quali si uniscono con il 7. perche li due noue già si buttano, & così si dice 4. & 7. sono vndeci, leuato il 9. restano 2. quali uniti con l'otto seguente fanno dieci, leuato il 9. resta uno, quale unito con il 3. fanno 4. da porsi dall' altra parte della croce, & si vede similmente, che l' operatione è ben fatta, perche le figure della croce sono uguali.

Vi è ancora la terza regola, poiche assummati li numeri sottratti, con il numero rimanente fatto sotto la linea, fanno l' istessa summa del numero principale dal quale si è fatta la sottrattione; v. g. il numero sottratto è 2781. & il numero rimasto è, 4997983. detti due numeri uniti insieme summano 5000764. , che è il numero principale conforme si vede in detto esempio, & poi, per la quarta regola, sottratto dal numero principale, il numero rimanente, cioè sottratto da 5000764. il numero de 4997983. restaranno 2781. , che è il numero

Laltre figure, conforme con li esempi si farà chiaro, v.g.
 dà questo esempio; si leuano li noue in questo
 modo, cominciando dal numero assumendo, 653057
 sono 6. & 5. fanno vndeci, leuando noue re- 3353
 stano due, & 3. che vengo appresso sono cin- |
 que, & cinque seguitano, che sono dieci leua- 658410
 re noue resta vno, & sette, che seguono sono
 8. & 5 sono tredici, leuate noue restano 4.
 & tre seguitano, che sono sette, & 5. ap- 6) 6
 presso, che sono 12. leuate li noue, restano 3.
 & 3. seguitano, che sono 6. detto 6. si pone
 alla mano sinistra della croce; poi si leuano li 9. della sum-
 ma fatta sotto la linea, dicendo sei, & cinque sono vnde-
 ci, leuate li noue restano due, & 8 appresso, sono dieci,
 leuate li noue resta vno, & 4. sono 5. & depò vno, che
 sono sei, detti sei si pongono à mano destra della croce,
 & si vede, che dette due figure della croce sono eguali,
 segno, che l'operatione, è ben fatta; altrimenti bisognerebbe
 farla di nouo. & in questo modo si leuano li noue
 da qualsiuoglia numero, il che bisogna ben sapere, per che
 in tutte laltre operationi, che diremo appresso, si fa sem-
 pre dell istesso modo.

Quando occorre leuare li noue da qualche partita, che
 le figure non arrinassero à noue, quel numero, che consti-
 tuiscono dette partite, quello si ritiene, & si pone nella
 parte della croce v.g. da questo numero 123. non si pos-
 sono leuare li noue, perche le figure non summano più,
 che sei, di modo, che detto numero 6. vuol dire essere già
 leuati li noue da detto numero cento ventitre, & resta-
 no 6. conforme similmente da 120. leuando li noue, re-
 stano tre parimente da 53. leuati li noue restano 8. quando
 poi dette figure arrinano à noue, si farà vno zero alla
parte

parte della croce conforme in questi
esempj si vede .

108

135

252

—

495

—

120

200

120

—

440

—

Doue nel primo esempio, leuando
li noue tanto dal numero da assum-
marsi, quanto dalla summa di esso,
resta zero; così similmente nel se-
condo, leuando li noue tanto del nu-
mero da assummarsi, quanto dal
numero assummato restano otto .

Detta regola del noue, benchè
sia optima, nondimeno in se stessa è
falsa, poiche può essere, che vno fac-
ci errore in lasciare vna partita di 9.

ò più partite, che costituischino noue, & così nella proue
si ritrouerà bene, non ostante, che

veramente la summa sia falsa, v. g.

in questo esempio; poniamo caso,

che vno habbia assummato per er-

rore dette partite, & habbi fatto

cinquecento quaranta noue, confor-

me si vede in detto esempio. Certo

e, che la summa è falsa, nondimeno in quanto alla pro-

ua uà bene; così ancora in quest'al-

tro esempio, doue si vede, che la

summa di detto esempio è falsa, &

nondimeno la proua è buona, si che

si vede chiaramente detta regola

esser falsa, si seruono con tutto ciò li

Mercanti di detta regola, perche

li errori detti sono sonerchi grossi, & non si possono fare.

senon che quasi volontariamente: ò da persone assai igno-

rante, massime in così numero guisto di noue, essendo, che

li

0)(0

8)(8

0)(0

6)(6

li errori possono essere di due, ò 3. ò altra summa piccola; mà di summa così grossa. & giusta, e quasi impossibile.

Oltre questa regola, vi è anco l'altra regola del sette; quale si fa in questo modo, si buttano, ouero si leuano li sette di tutte le partite, che si hanno da assumere, & finita una partita si pone il rimanente delli sette dietro una linea, auuertendo; che non si fa conforme si è detto del noue; anzi in questa regola le prime figure, dalle quali si comincia l'operatione, sono decine, con le quali si vniscono li numeri delle figure seguenti, & da detto numero si leuano li sette, conforme con esempi farò il tutto chiaro.

Si hāno da leuare v.g. li sette da questa 1253 | 0. partita si dice dieci, & due, sono dodici, leuati li sette, bisogna vnire la prima, & seconda figura insieme, & poi leuarli; detto cinque dice cinquanta, quali uniti con l'altro cinque fa cinquanta cinque, dal quale numero leuate li sette, restano sei, qual sei dice sessanta, & uniti con il 3 dice, sessanta tre, da quali leuati li sette resta zero, quale si pone dietro la linea, conforme vedi in detto esempio.

Quando poi sono più partite da assumersi, & si ha da vedere per questa regola, se sia ben fatta l'operatione si fa in questo modo, v. g. in questo esempio, perche la prima figura è 7. si leua assolutamente poi dice da unite tre, leuate li sette restano due, quali uniti con il zero, dicono vinti, leuati li 7. restano 6. qual sei con il cinque appresso dice sessanta cinque, leuati li 7. restano due, quale due si pone incontro alla detta partita dietro la linea, come vedi già fatto in

| | | |
|-------|--|---|
| 72305 | | 2 |
| 2210 | | 4 |
| 5032 | | 5 |
| 15 | | 1 |

81562 1)(5

detto

detto esempio . Dopò si leuano li 7. dall'altre partite, dell' istesso modo , & si dice da trenta due leuati li sette , restano 4. quali vniti con l' vno, dice quarant' vno, leuati li sette restano sei , quali vniti con il zero dice sessanta, da quali leuati li sette restano 4. da porsi similmente dietro la linea, poi da sessanta leuate li sette, restano 4. vniti con il tre , dicono quaranta tre , leuati li 7. resta vno , quale vnito con il due dice dodici , & leuati li sette , restano 5. da porsi similmente dietro la linea; poi da 15. leuati li 7. resta vno da porsi dietro la linea . Dopò si assummano le figure messe dietro detta linea , & si dice due , & quattro sei, & cinque undeci , & vna , che sono dodici, da detti dodici , leuati similmente li sette , restano 5. & detti cinque si pongono à mano sinistra della croce, poi si fa dell' istesso modo al numero assummato , nel quale non essendoui errore , darà l' istessa figura da porsi à mano destra della croce .

Si dice dunque nel numero già assummato in detto esempio , che è 81562. da 8. leuate 7. resta vno . Aduertendo , che hora non si vnisce la prima figura con la seconda per leuare li sette , perche la prima figura in se già contiene detto 7. , & così si hà da far sempre , resta dunque vno, quale vnito con l' altro vno , dice undeci , da quali leuati li 7. restano 4. , quali vniti con il 5. dice quaranta cinque , da quali leuati li 7. restano 3. , quali vniti con il 6. dice trenta sei, & leuati li sette resta vno, quale vnito con il due dice dodici , da quali leuati li 7. restano cinque da porsi à mano destra della croce , & così si vede, che stà ben fatta l' operatione .

Et benchè questa regola ancora possi fallire, conforme si è detto del noue; nondimeno si risponde dell' istessa maniera; ben vero, che questa non è troppo usitata per es-

sero

sera troppo lunga, & assai più fastidiosa; mà per volersi servire di detta regola è necessario hauere una buona prattica delli numeri, che contengono detti sette, acciò non si habbia tanto da faticare, che perciò si è fatta la presente tabella quale bisogna hauerla bene in pattica.

| | |
|--|--------|
| Si dà ancora vn' altra regola, ouero auuertimento per vedere se si fosse errato, & è, che si denono summare dette figure più volte di sopra, & da basso, che facilmente si vederà, se vi è errore, il che basti per detta additione, ouero assumere. | 7 — 0 |
| | 14 — 0 |
| | 21 — 0 |
| | 28 — 0 |
| | 35 — 0 |
| | 42 — 0 |
| | 49 — 0 |
| | 56 — 0 |
| | 63 — 0 |
| | 70 — 0 |

Della Sottrattione. Cap. IV.

Sottrattione non vuol dire altro, se non che subducere, cioè leuare uno numero minore, dal maggiore, & facilmente si potrà conoscere quale sia il numero maggiore, ò minore dalla quantità delle figure, & se fossero partite eguali di figure, si conoscerà dalle prime figure, cioè da quelle, che sono le prime à farsi, & quale sarà maggiore, quella partita sarà similmente maggiore dell' altra, come v. g. in queste partite, benche siano di eguale numero, anzi benche la partita di sotto habbi tutte le figure maggiori di quella di sopra, eccetto la prima, nondimeno è la minore partita, per causa, che la figura prima della prima partita è maggiore. Dopò, che se sarà conosciuto questo, si hà d'auuertire, che nella sottrarre sempre la partita maggiore si pone sopra, & la

| | |
|--|--------|
| | 702141 |
| | 634352 |

mi.

minore di sotto, in questo modo, cioè si pongono le prime figure di mano destra, l'una corrispondente à l'altra, poi le seconde, & poi di mano in mano sin tanto si può di modo, che il difetto, ò mancamento si veda nelle figure di mano sinistra, si fa poi vna linea sotto dette partite, & si fa la sottrattione in questo modo.

Si comincia a fare la sottrattione dalle prime figure di mano destra, & hauendo sottratto vna figura minore dalla maggiore di sopra, si pone il residuo sotto la linea in corrispondenza di detta figura sottratta. Auuertendo, che quando la figura di sopra è minore di quella di sotto, all'hora non si potria fare la sottrattione, & per ciò in tal caso detta figura di sopra minore, si fa imprestare vna decina dalla prima figura significatiua, che appresso di lei viene, restando detta figura con vna decina meno, cioè si sarà vn cinque, resterà quattro, & così di mano in mano, & si sarà vno, cioè vna decina, resterà zero; & si frà le dette figure vi fossero vno, ò più zeri, detti zeri si fanno 9. & da detti noue, si fa la sottrattione, conforme con esempi dichiararemo il tutto.

Hauendo da fare questa sottrattione v. g. si fa in questo modo cominciando dalle prime figure di mano destra; da quattro si hanno a leuare sette, mà non si può, per essere il sette maggiore del quattro, acciò dunque il quattro sia maggiore, si fa imprestare vna decina dalla tre figura più prossima significatiua, restando detto tre due, di modo, che detto quattro diuenta quattordici, & se dise da quattordici, leuate sette restano sette, quale sette si pone sotto la

63523004

55674557

5848447

63523004

5)(5

linea

stare una decina del cinque figura. à lei più prossima significatiua, restando detto 5. quattro, & così si dice, da dieci leuate 5. restano cinque da porsi sotto la linea, dopo seguita il zero, il quale rimane 9. per la detta operatione fatta, & così se dice da 9. leuate due, restano 7. da porsi sotto la linea, di poi si dice da 4. leuate 3. resta uno da porsi sotto la linea, dopo seguita il zero, dal quale non si possono leuare sette, & così detto zero si fa imprestare una decina del sei, quale resta cinque, & si dice da dieci leuate sette restano 3. da porsi sotto la linea, li tre altri zeri restano noue per causa di detta operatione, & così si dice da' noue leuate sei, restano 3. da 9. leuate 5. reno 4. da 9. leuate 3. restano 6, & da cinque leuate 4. resta uno, conforme il tutto vedi fatto in detto esempio.

Benche detto modo di Sottrarre, con farsi imprestare una decina dalla figura più prossima significatiua, quando occorre, che la figura di sopra sia minore di quella di sotto (aduertendo, che quando fosse, eguale si faria uno zero di sotto la linea) sia assai vsitato, nondimeno è ancora un' altro modo assai similmente facile, & vsitato; & è, che in tal caso si piglia la differentia, che è trà la figura di sotto, & la decina, v. g. se la figura di sotto è 5. la sua differenza sarà 5. perche cinque ci vogliono sino à dieci, detta poi differentia di 5. si aggiunge con la figura di sopra, v. g. se fosse detta figura di sopra 3. dal quale non si può leuare 5. si piglia la sua differentia de 5. & si vnisce con il tre, che fanno 8. da porsi sotto la linea; ma in tal caso si aggiunge poi una decina alla prossima seguente figura di sotto di modo, che se sarà 2. diuenterà 4. & così di mano in mano si va facendo sempre, che occorre non poter si fare la sottrattione, per essere la figu-

significatiua, dalla quale si possa sottrahere detta decina, come si chiarirà con questo esempio, doue si dice da due leuate 1. resta 1. da poi si sotto la linea, da 4. non si possono leuar 7. si piglia la differentia, che sono tre, & uniti con il 4. fanno 7. da poi si sotto la linea, & il 3. diuenta 4. & da zero non si possono leuar 4. si dice da 4. sino a dieci sono 6. si fa 6. sotto la linea, perche detto 6. non si può unire con il zero, che non è figura significatiua. Et perche appresso al detto 3 non ci seguita altra figura significatiua, alla quale si potesse aggiungere la decina; però se finge vna decina sotto l'altro zero, & perche da zero non si può leuar vno, però si piglia la sua differentia da vno sino a dieci, che sono noue, & detto noue si pone sotto la linea, se finge similmente vn'altra decina sotto il cinque, & si dice da cinque leuato vno resta 4. & così vien finita l'operazione conforme si vede in detto esempio.

500042

371

499671

500042

$$\begin{array}{r} 2 \end{array} \left(\begin{array}{r} 2 \end{array} \right.$$

Fatta, che sarà detta operatione, bisogna esaminare se stà ben fatta il che si può fare in questo modo, cioè per la regola del noue, è per quella del sette, la terza è cō assumere il numero fatto sotto la linea con il numero sottratto, & se detti numeri assunti renderanno l'istesso numero, dal quale si è fatta la sottrattione, è segno, che l'operatione è fatta buona, conforme si vede nellisopradetti esempi; la quarta regola è sottraere il numero sottratto messo sotto la linea dal numero principale di sopra, che renderà il numero sottratto, se però stà ben fatta l'operatione, poi che conforme il numero da sottraersi, da il numero di sotto la linea, così detto numero di sotto la linea sottratto dal numero principale, renderà le figure del

numero sottratto, che stà in mezzo, & dette due ultime regole sono infallibili, che non sono così l'altre, come di sopra habbiamo detto, & tutte dette quattro regole, le prouaremo con il presente esempio.

In questo esempio vi sono tutte le quattro regole, con le quali tutte si vede detta operatione starà ben fatta; la prima è del 7. & facendoci detta proua se dice, da cin-

| Regola del 7. | $ \begin{array}{r} 999 \\ 5000764 \\ \underline{2781} \quad \quad 2 \\ 4997983 \quad \quad 4 \\ \hline 5000764 \\ 4997983 \\ \hline 2781 \end{array} $ | Regola del 9. |
|--------------------|--|--------------------|
| $6 \overline{) 6}$ | | $4 \overline{) 4}$ |

quanta, leuate li 7. resta uno, dipoi da dieci leuate 7. restano tre, poi da trenta leuate li 7. restano due, appresso da 27. leuate li 7. restano 6. da seßantasei leuate li 7. restano tre, da trenta quattro leuate li 7. restano 6. da porsi à mano sinistra della croce, poi si leuano li sette tanto dal numero sottratto, quanto dal numero rimasto, cioè quello, che stà fatto sotto la linea, se dice dunque da 27. leuate li 7. restano 6. da 68. leuate li sette restano 5. da 51. leuate li 7. restano due da porsi dietro la linea, conforme vedi già fatto in detto esempio. Poi si comincia l'altro dicendo da 49. leuate li 7. non resta cosa alcuna; da 9. leuate 7. restano 2. da 27. leuato li 7. restano 6. da 69. leuate li sette restano 6. da seßanta otto leuate li 7. resta-

restano 5. da 53. leuate li 7. restano 4. da porsi dietro la linea, conforme già si vede fatto; poi si uniscono questi due numeri di dietro la linea, & si vede, che summano 6. da porsi à mano destra della croce, & così si vede, che l' operatione sia ben fatta, perche già corrispondono in se le figure di detta croce.

Vi è similmente in detto esempio la regola del 9. quale se esamina in questo modo, cominciando dal numero principale sono cinque, & 7. che sono dodici, leuati li 9. restano 3. quali uniti con il 6. fanno 9. si butta detto 9. poi si dice 4 quale per non hauere altre figure, si pone à mano sinistra della croce, poi si leuano li 9. tanto dal numero sottratto, quanto dal rimanente di sotto la linea in questo modo, due, & sette sono 9. si butta detto 9. seguita 8. & uno, che sono 9. si butta similmente detto 9. poi seguitano 4. quali si uniscono con il 7. perche li due noue già si buttano, & così si dice 4. & 7. sono undeci, leuato il 9. restano 2. quali uniti con l'otto seguente fanno dieci, leuato il 9. resta uno, quale unito con il 3. fanno 4. da porsi dall' altra parte della croce, & si vede similmente, che l' operatione è ben fatta, perche le figure della croce sono uguali.

Vi è ancora la terza regola, poiche assummati li numeri sottratti, con il numero rimanente fatto sotto la linea, fanno l' istessa summa del numero principale dal quale si è fatta la sottrattione; v. g. il numero sottratto è 2781. & il numero rimasto è, 4997983, detti due numeri uniti insieme summano 5000764., che è il numero principale conforme si vede in detto esempio, & poi, per la quarta regola, sottratto dal numero principale, il numero rimanente, cioè sottratto da 5000764. il numero de 4997983. restaranno 2781. che è il numero

sottratto, & questo è quanto si possa dire circa la sottrazione.

Della Multiplicatione. Cap. V.

Multiplicare non vuol dire altro, se non fare, che uno numero proposto, diuenghi tante volte più maggiore, quanti sono li numeri, per li quali si ha da moltiplicare, come v. g. moltiplicare il 9. per 8. non vuol dire altro, se non che detto 9. diuenghi otto volte più di quello, che in se stesso è, & così moltiplicato detto 9. per 8. fa la summa de 72. quale summa contiene in se otto volte 9. Per imparare detta multiplicatione con facilità

| | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 |
| 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
| 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 |

za, è di bisogno esercitarsi, & hauere gran pratica dell'a
presente scuola pitagorica, così chiamata, perche fù ritro-
uata da Pitagora, benché con l' esercizio facilmente an-
cora s' impari; acciò ciascheduno cognoschi, quante volte
uno numero viene contenuto in vn' altro maggiore, &
così si ha facilità in fare le operationi.

La figura, ò le figure, per le quali si hà da mult plicare
il numero proposto si pongono la prima, sotto la prima à
man destra, & la seconda sotto la seconda, & così di ma-
no in mano; doppo si comincia à moltiplicare dalla prima
figura, cioè quella di sopra per quella di sotto, aduertendo,
che il numero maggiore si deue moltiplicare per il mino-
re, per andare ordinatamente, & non confondere li nu-
meri, & benché para non ci possa occorrere errore essen-
ziale, nondimeno non si verria à caminare ordinamen-
te, v. g. se vno dicesse, moltiplicatemi tre per noue, ouero
6. per 15 non parlaria ordinatamente, ne si à bene porre
il noue sotto al 3. ne il 15. sotto al 6. ma venendo pro-
posti detti numeri, ò simili sempre si deue porre prima il
numero maggiore, & di sotto poi il minore, & così si deue
vsare ancora nel parlare, & per maggiore chiarezza di-
remo prima con esempio, come si fa detta

multiplicatione con una figura, & porco- 567004
me si fa con più figure. 7

Si Multiplichi dunque questo nume-
ro per una figura di 7. si fa dicendo in que- 39690.8
sto modo 4. via 7. sono 28. doue nota,
che nō si dice 7. via 4. perche il 7. è nume-
ro maggiore, come habbiamo detto, si pon-
gono dunque li 8. sotto la linea, & si por-
tano due decine; poi si dice 7. via zero, fa-
zero, perche il zero non si può moltiplica-

$$\begin{array}{r} 1 \\ 7 \overline{) 567004} \end{array}$$

re, però si doueria porre il zero sotto la linea, mà perche si portano le due decine della prima operatione, però si pongono dette due decine sotto la linea, poi di nouo si dice con il secondo zero, 7. via zero fa zero, quale si pone sotto la linea, perche non si è portato decina alcuna. Dipoi se dice 7. via 7. fanno 49. si fa 9. sotto la linea, & si portano 4. appresso si dice 6. via 7. fanno 42. & quattro si portano, che sono 46. si fa 6. sotto la linea, & si portano 4. dipoi si dice 5. via 7. sono 35. & quattro, che si portano sono 39. detti 39. si pongono sotto la linea, già che non vi sono più figure da multiplicare, il che tutto si vede già fatto in detto esemplo.

Quando la multiplicatione si hà da fare con più figure, all'hora, multiplicata, che è la prima figura, si moltiplica la seconda dell'istesso modo, mà il numero moltiplicato da porre sotto la linea, bisogna cominciarlo a porre dalla seconda figura, & così anco moltiplicandosi la 3. ò quarta figura, se haueria da porre il numero moltiplicato in corrispondenza di detta terza, ò quarta figura, che si moltiplica; & poi ultimamente se tira una linea di sotto, & si assummano tutti detti numeri in una partita sola per sapere qual sia il numero moltiplicato, conforme il tutto appare in questo esemplo, done primieramente se dice 3. via 5. sono 15. si fa il 5. sotto la linea, & si porta una decina, doppo se dice 5. via 8. sono 40. & uno si porta, sono 41. si fa uno sotto la linea, & si portano 4. poi se dice 4. via 5. sono 20. & 4. si portano, che sono 24. si fa quattro sotto la

$$\begin{array}{r}
 560483 \\
 125 \\
 \hline
 2802415 \\
 1120966 \\
 560483 \\
 \hline
 70060375
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 8 \overline{) 8} \\
 \hline
 1
 \end{array}$$

linea,

linea, & si portano due decime, poi se dice 5. via zero fa zero, ma perche si portano due, non si pone il zero sotto la linea, ma il due appresso se dice 5. via 6. sono 30. si fa zero sotto la linea, & si portano 3. doppo 5. via 5. sono 25. & 3. si portano sono 28. si pongono tutti 28. sotto la linea, perche è finita la multiplicatione della prima figura.

Doppo si moltiplica la seconda figura, cioè il due similmente per tutte le figure, dicendo, due via 3. sono sei, detto sei si comincia a porre a drittura del detto due, che va moltiplicato, cominciando vn'altro verso, conforme si vede in detto esempio, di modo, che quante figure si hanno da moltiplicare, tanti versi, ouero righe si fanno, ma con questa aduertenza, che sempre si cominciano dette righe per incontro a quella figura, che si moltiplica, di modo, che vna riga deue auuanzare l'altra in vna figura, se comincia dunque à porre detto sei sotto l'vno della prima riga. Doppo si seguita per l'altre figure, dicendo due via 8. sono 16. si fa 6. sotto la linea, & si porta vno, appresso 2. via 4. sono 8. & vno si porta, che sono 9. si pone detto 9. sotto la linea, poi zero via due fa zero, da porsi sotto la linea, già che non si porta decina del precedente numero, poi, due via 6. sono 12. si fa due sotto la linea, & si porta vno, dipoi 2. via 5. sono 10. & vno, che si porta sono 11. da porsi sotto la linea, perche è finita la seconda multiplicatione.

Doppo si moltiplica la terza figura dicendo vno via 3. fa 3. da porsi sotto la linea incontro al secondo sei della seconda riga; dipoi, vno via 8. fa 8. da porsi appresso, come di sopra, vno via 4. fa 4. si pone similmente appresso sotto la linea, zero via vno fa zero, da porsi di sotto appresso, vno via 6. fa 6. da porsi anco appresso, & vno via

cinque, sà 5. da porsi di sotto la linea, conforme il tutto si vede fatto in detto esempio. fatto questo se tira una linea di sotto, & si assummano tutte tre le righe di figure in una sola, & quello sarà il numero multiplicato, conforme sta in detto esempio.

Quando poi occorre, che le figure per le quali si hà da fare la multiplicatione fossero uno, & zero, all' hora senza fare operatione alcuna si piglia solamente il zero, & così ancora se fossero più zeri, & tutti detti zeri si aggiungono al numero multiplicando, & restagia fatta la multiplicatione; coma v.g. se si hà da multiplicare 573462 per 10. ò per 100. ouero per 1000. ò per 10000. in detto caso non si fa altro, se non che si pigliano tutti detti zeri, & si aggiungono al numero multiplicando, di modo, che il primo esempio, verria in questo modo 5734620, il secondo in quest' altro 57346200. il terzo in quest' altro, 573462000. , & il quarto in quest' altro, 5734620000. & così di mano in mano sempre, che fossero tutti zeri, & la prima figura significatiua fosse uno.

Ma se in cambio di uno, vi fosse due, ò uno tre, ouero altra figura di più numero; all' hora si multiplica il numero proposto solamente per detta figura significatiua, & a detto numero poi si aggiungono li zeri, tanti, quanti sono; così ancora se vi fossero più figure significatiue insieme, & poi seguitassero li zeri, se faria la multiplicatione con dette figure significatiue, come di sopra; & poi al numero assummato di dette figure, se aggiungeriano li zeri.

Adiene similmente ancora, che se detti zeri siano nel numero multiplicando; & all' hora similmente basterà multiplicare le figure significatiue, & poi aggiungere detti

detti zeri alla multiplicatione fatta, come v. g. si hà da multiplicare 23600. per 23. basterà solamente multiplicare le tre figure significatiue, & poi alla summa, che daranno, si pongono li tre zeri.

Suole similmente accadere; che detti zeri siano tanto nel numero multiplicando, quanto nel numero, per il quale si hà da fare la multiplicatione, & all'hora si serbano tutti detti zeri dell'vno, & l'altro numero, & hauendo fatta solamente la multiplicatione con le figure significatiue, ue si aggiungono poi tutti detti zeri; come v. g. se si hà da multiplicare 25000. per 12000. basterà multiplicare il 25. per il 12 & poi a detta summa porre li sei zeri dell'vna, & dell'altra partita; il che tutto hò detto per fare le operationi più presto; ma li principianti per non confonderfi, deouono usare la regola ordinaria già detta, sin tanto habbino buona pratica.

La proua per sapere se la multiplicatione stà ben fatta, è di tre sorte, la prima è quella del 9. si leuano primieramente li 9. dal numero, per il quale si fa la multiplicatione, & il numero residuo si pone a mano sinistra della croce; poi si leuano detti 9. dal numero multiplicando, & si pone il residuo a mano destra della croce, poi si multiplicano dette due figure in se stesse, & passando li 9. si buttano, & si pone il residuo sopra la croce, & si restasse zero, si fa zero sopra la croce, ouero non arriuando dette due figure moltiplicate alli 9. si pone detto numero, che è sopra la croce; poi si leuano li 9. dal numero moltiplicato, quale renderà l'istesso numero, che stà sopra la croce, si però sarà ben fatta l'operatione, & detto residuo si pone sotto la croce per vedere si corrisponde alla figura di sopra, conforme si vede in questi due esem-

$$\begin{array}{r}
 5463 \\
 36 \\
 \hline
 32778 \\
 16389 \\
 \hline
 196668
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \circ \\
 \circ \quad \circ \\
 \circ
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 7436 \\
 74 \\
 \hline
 29744 \\
 52052 \\
 \hline
 550264
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 4 \\
 2 \quad 2 \\
 4
 \end{array}$$

Vi è ancora la regola del 7. quale si fa con l'istesso ordine, conforme si è fatta questa del nove; ma u. è la terza regola, la quale è affatto infallibile, et è diuidere detto numero multiplicato per uno delli due numeri, delli quali si è assummato detto numero multiplicato; il cotiente della quale diuisione, sarà l'altro numero, dal quale similmente è stato assummato detto numero multiplicato; come v. g. nel sopradetto primo esempio, se si diuidesse il numero multiplicato di 196668. per uno delli numeri, dalli quali si è fatta detta summa, cioè ò per il numero 32778. ouero per l'altro de 16389. il cotiente sarà l'altro numero suo compagno, et questo sarà segno infallibile, che detta operatione sia ben fatta; come poi si habbi da fare detta diuisione, lo diremo nel seguente Capitolo.

Della Diuisione. Cap. VI.

Diuisione non uol dire altro, che distribuire uno numero proposto in più parte similmente proposte, come v. g. 81. da diuidersi a 9. toccherà 9. per ciaschedun

no, perche detto numero 81. contiene in se noue uolte detto numero di 9. detta diuisione si fa in questo modo, si pone prima il numero diuidendo, quale sempre deue essere maggiore del diuifore, di modo, che uenendo proposto qualche numero da diuidersi per qualch' altro numero diuifore, si pone detto diuifore sotto al numero diuidendo, non già come si è fatto nelle antedette operationi; ma si pone detto diuifore sotto l' ultime figure del numero diuidendo, cioè da mano sinistra, collocando l'ultima figura sotto l'ultima, & la penultima sotto la penultima, come vedi in questo esemplo. *M*a se la prima figura del diuifore fosse maggiore di quella del numero diuidendo, all' hora si pone detta ultima ouero prima di mano sinistra, sotto la penultima da mano sinistra del numero diuidendo, come vedi in questo esemplo, perche è cosa certa, che il numero minore non si può diuidere al maggiore, di modo, che bisogna porre talmente il diuifore sotto il diuidendo, che le figure di sopra corrispondenti al diuifore siano di maggiore, ò almeno di eguale numero con il diuifore, acciò si possa fare detta diuisione, poi si fa una linea curua, ò lunga nel fine del numero diuidendo, per hauerci da porre le figure del cotiente.

7652 |

37

5360 |

75

Doppo si vede quante volte cape il diuifore nel numero diuidendo con cominciare dall' ultime figure, & per ciascheduna operatione, che si farà, si pone il cotiente dietro la linea fatta, aduertendo, che detto cotiente non può essere più che 9. il che tutto dichiarerò con esemplo, acciò facilmente si possa capire, & comincerò la diuisione con una figura come in questo esemplo si vede. Si dice dun-

5643 |

4.

quan-

quante volte il 4. cape in 5. che gli sopra stà, si vede, che cape una volta; però si fa uno dietro la linea del cotiente, così chiamata, perche in essa si pongono li cotienti, cioè le figure, che significano quante volte il diuifore è contenuto nel numero diuidendo. pigliando si detto nome dalla parola latina *quoties*, che vuol dire, quante volte, fatto dunque uno al cotiente, se piglia con la mente detto uno, et si moltiplica con il 4. dicendo, uno via 4. fa 4. si ha da sottrahere detto 4. dal 5. et sottratto resta uno, quale si pone sopra al 5. et si cassa detto 5. et resta fatta la prima operatione, et così si ha da fare in tutte l'altre figure, cioè prima se ritroua il cotiente, si pone dietro la linea, di nouo si piglia con la mente, et si moltiplica con il diuifore, quale multiplicatione si sottrae dal numero diuidendo, con porre le figure, che restano, sopra a detto numero diuidendo, et cassando le figure già operate di detto numero diuidendo; doppo si muta il diuifore sotto l'altra figura del numero diuidendo, et si fa l'altra operatione, conforme la prima, cioè si muta il diuifore 4. sotto al 6. dicendo il

| | |
|------|-----|
| 7 | |
| 5643 | 141 |
| 44 | |

4. in 16. cape quattro volte, perche il cotiente si ha da cauare da tutto il numero, che sopra stà al diuifore uerso mano sinistra, et così essendo l'uno sopra al 5. antecedente, et 6. appresso fanno sedeci, et però se dice, che il cotiente di sedeci sia quattro volte, si pone detto quattro appresso la linea, quale di nouo pigliato con la mente, & moltiplicato con il diuifore, si vede, che fa 16. di modo, che non ci è di bisogno di sottrattione, ma si cassa tanto l'uno sopra il 5. quanto il 6. insieme con il diuifore, & si muta detto diuifore sotto al 4. Aduertendo, che non si fa il zero sopra al 6. perche non ci sono figure significatiue auanti di

di lui; mutato dunque detto diuifore ſotto al 4. ſi vede, che vi cape vna volta ſi fa vno appreſſo alla linea conforme vedi in detto eſempio, & pigliando con la mente detto vno, ſe dice vno via 4. ſono 4. di modo, che non occorre ſottrattione; ſi muta di nouo il diuiſore 4. ſotto al 3. & ſi vede, che detto 4. non può capire in detto 3. però ſi fa zero al cotiente, & il 3. reſta per minutia al 4. detti numeri, che reſtano, ſi pongono in contro al cotiente con vna linea, di ſopra ſi pongono li numeri reſtati, ouero rimasſi, & di ſotto ſi pone il diuiſore, ſignificando detti numeri di ſopra doue ſi diuide- re al cotiente di ſotto, conforme il tutto vedi fatto in detto eſempio.

$$\begin{array}{r} 5643 \\ **** \end{array} \bigg| 1410 \frac{3}{4}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ 4 \overline{) 6} \\ 0 \end{array}$$

Il diuidere con vna figura è coſa facile, perche facilmente ſe ritroua il cotiente; ma vn po- co difficile è, quando ſi fa con il diuiſore, che contenghi più figure, & tutta la difficoltà conſiſte in ritrouare il cotiente; che ſia ben pigliato, & all'hora è ben pigliato, quando multiplicato con tutto il diuiſore ſi vede, che detto diuiſore è minore, ò eguale al numero diuidendo, che gli corriſponda di ſopra; il numero diuidendo ſ'intende non ſolo quelle figure, che corriſpondono al diuiſore; ma tutte quelle, che ſtanno auanti nella mano ſiniſtra.

E ſimilmente da aduertire, che il diuiſore ſi vada mutando vna figura per volta, & quando nel mutare non ſe ritroua numero maggiore, ò eguale al diuiſore, all'hora ſi fa vno zero al cotiente, & ſi finiſce quell' operatione mouendo il diuiſore auanti, come il tutto ſi vede in queſto eſempio, e di nouo aduertendo, che il cotiente non può eſ- ſer epui, che 9.

Nel

Nel presente esempio se dice il 4. in 32. cape 8. volte; si pone detto 8. dietro la linea, & multiplicando poi, ò con la memoria, ò in vno pezzo di carta, per tutto il diuifore 40. si vede, che fa la summa di 320. hor dunque sta ben pigliato il cotiente, perche il numero, che sopra sta al diuifore è di 323. dal quale bene si possono sottrarre 320. & così ò con la mente; ò con il scritto in carta separata si pongono detti 320. sotto a detti 323. et si fa la sottrattione dicendo da 3. leua zero, resta 3. si cassa il 3. di sopra, & si fa vn'altro 3. di sopra a detto tre, da due poi leuando due, resta zero, così ancora dal 3. mà non occorre fare detti zeri, perche non possono hauere figure significatiue auanti di loro, come più volte si è detto, si cassano le tre figure del numero diuidendo, & le due del diuifore, & si muta detto diuifore, come vedi in questo esempo.

$$\begin{array}{r} 32320 \\ 40 \end{array} \Bigg| 8$$

Doppo si scorge, che sopra il diuifore 40 sono solamete 32. però si fa zero al cotiente, perche 32. nõ si possono spartire, a 40 & si muta di nuouo il diuifore, di modo, che hora sopra il 40. ui sono 320 se dice dunque quante volte uà il 4. in 32. & si vede, che cape 8. volte; mà per vedere si è ben pigliato, bisogna multiplicarlo per tutto il diuifore, & multiplicato 8. volte 40 sumano 320 simile al numero, che sopra sta al 40. si pone dunque l'otto al cotiente, & è finita la diuisione, perche il diuifore non può più caminare auanti, non essendoci figure, spartito dunque il sopradetto numero a 40. tocca per ciascheduno 808.

$$\begin{array}{r} 3 \\ 32320 \\ 4000 \\ 40 \end{array} \Bigg| 808$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 4 \end{array} \Bigg) \begin{array}{r} 7 \\ 1 \end{array}$$

Diuidiamo similmente 563002. per 575. doue pri-
mie

mienamente è da aduertire, in che loco si hà da collocare il diuifore, perche se si pone il 5. sotto al 5. il 7. sotto al 6. & il 5. sotto al 3. non v'è buono, perche è più il diuifore, che non è il numero diuidendo, che sopra st' a detto diuifore, si pone dunque il 5. sotto al 6. il 7. sotto al 3. & il 5. sotto al zero, & così viene il numero di sopra essere maggiore, come vedi in detto esempio.

Doppo si dice il 5. in 56. benche cape più di noue volte, nondimeno, il cotiente, perche non può essere più di 9. si pone detto 9. al cotiente, & per vedere si stà ben pigliato, si moltiplica per tutto il diuifore 575, quale moltiplicato per 9. fa la summa di 5175. di modo, che è ben pigliato il cotiente, & si pone al suo loco, perche da 5630 che sopra stanno al diuifore, ben si può leuare 5175. messe dunque dette figure sotto al detto numero del diuidendo, si fa la sottrattione; poi si muta il diuifore, il 5. sotto al 3. cassato, il 7. sotto al zero cassato, & il 5. sotto l'altro zero, poi se aice, il 5. in 45. cape 9. volte, & moltiplicato in tutto il diuifore, fa la summa de 5175. non stà ben pigliato il cotiente, perche 4550. che sono di sopra, non si possono diuidere a 5175. di modo, che bisogna mutare il cotiente, & farlo 8. quale moltiplicato per il diuifore, fa la summa di 4600. ne anco è ben pigliato il cotiente per l'istessa causa; si cala di nuouo il cotiente, & si fa 7. quale moltiplicato per il diuifore fa la summa de 4025. hora stà ben pigliato, perche 4550. ben si possono spartire a 4025. come vedi nel sopradetto esempio; poi si fa la sottrattione dal numero di sopra, & si muta il diuifore, il 5. sotto al zero, il 7. sotto l'altro zero, & il 5. sotto al 2. poi se dice il 5. in 52. benche cape più di noue volte, non-

dimeno se dice 9. per il cotiente, quale multiplicato per il diuifore fa la summa de 5175. sta ben pigliato, perche dalla summa, che resta sopra de 5252. ben si può spartire a 5175. si scriue dunque 9. al cotiente, poi si fa la sottrattione, & restano 77. di minutie, da porsi incontro al cotiente, cōforme si vede in detto esemplo.

$$\begin{array}{r}
 5237 \\
 563002 \quad | \quad 979 \quad \frac{77}{177} \\
 57552 \\
 577 \\
 5 \\
 7 \\
 8 \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{l} 7 \\ 7 \end{array} \right. \\
 7
 \end{array}$$

Resta solamente da aduertire, che per essere ben fatta la diuisione, bisogna, che dia tante figure al cotiente, quante sono le volte, che il diuifore si pone, & muta sotto al numero diuidendo, che altrimenti non sta ben fatta.

Oltre il modo già detto di fare la diuisione, vi è ancora vn' altro modo più facile, ma più lungo, nondimeno, mi è parso bene dichiararlo, perche varij sono li humori delle persone, & può essere, che ad alcuni piacesse più questo, che l'altro; dico dunque, che

la diuisione si può fare in quest' altro modo, cioè porre il diuifore sotto al numero diuidendo conforme v'è messo nell'altra regola, & si tira la linea del cotiente, incontro poi detta linea si fa vna scaletta di noue linee conforme quiui vedi fatta, & da mano destra si pongono le figure de numeri, che mi vedi, & poi a mano sinistra,

$$\begin{array}{r}
 86750 \quad | \quad 24 \text{ — } 1 \\
 24 \quad 48 \text{ — } 2 \\
 72 \text{ — } 3 \\
 96 \text{ — } 4 \\
 120 \text{ — } 5 \\
 144 \text{ — } 6 \\
 168 \text{ — } 7 \\
 192 \text{ — } 8 \\
 216 \text{ — } 9
 \end{array}$$

nistra,

niſtra, nella prima linea ſi pone il diuiſore, quale ſi moltiplica per due, & ſi pone il numero moltiplicato nella ſeconda linea corriſpondente al due, poi ſi moltiplica detto diuiſore per il 3. che ſtá nella terza linea, & detto numero moltiplicato ſi pone ſimilmente nella terza linea da mano ſiniſtra, & il ſimile ſi fa con il 4. con il 5. & con tutte l'altre figure di detta ſcaletta ſino al 9. conforme già vedi fatto in detto eſempio, fatto queſto ſi pigliano le figure, che ſtanno ſopra il diuiſore, & ſi vede ſe il numero di dette figure ſi ritroua in detta ſcaletta, & ritrouandoſi, ſi pone al cotiente quella figura di mano deſtra, che corriſponde a quel numero ritrouato nella ſcaletta, & non ritrouandoſi, ſi piglia il numero inferiore, ma il più proſſimo a detto numero diuidendo, che ſtá nella ſcaletta, & detto numero poi ſi ſottrae dal numero diuidendo dell' iſteſſo modo, come ſi è detto di ſopra, & la figura di mano deſtra ſi pone al cotiente, come il tutto chiarirò con il ſopradetto eſem-

pio, che quiui replico.

| | | | | | |
|--|-------|--------------------|-----|---|---|
| Sopra al diuiſore ſono | 86750 | 3614 $\frac{1}{2}$ | 24 | — | 1 |
| 86. detto numero nò | 86750 | | 48 | — | 2 |
| ſe ritroua nella ſcalet- | 86750 | | 72 | — | 3 |
| ta, però ſi piglia vno | 86750 | | 96 | — | 4 |
| numero inferiore, ma il più proſſimo, di | 86750 | | 120 | — | 5 |
| modo, che in queſto eſempio ſi ha da piglia- | | | 144 | — | 6 |
| re il 72. che è il terzo, & il numero, che a | | | 168 | — | 7 |
| lei corriſponde da mano deſtra, ſi pone al | | | 192 | — | 8 |
| cotiente, & li 72. ſi ſottraeno da 86. con- | | | 216 | — | 9 |

forme già ſi vede in detto eſempio, ſi caſſano tutte le figure, come v'è fatto, & ſi muta il diuiſore, & mutato, ſi vede in detto eſempio, che ſopra al diuiſore vi ſono 147. quale numero non è nella ſcaletta, però ſi piglia il più proſſimo

Inferiore, cioè 144. che sta nel sesto scalino, & perciò si pone il 6. al cotiente, & 144. si sottraeno da 147. si muta il diuifore, & si vede, che sopra vi sono 35. quale numero non è nella scaletta, però si piglia il 24. del primo scalino, & si pone vno al cotiente, & si sottraeno 24. da 35. si muta ultimamente il diuifore, sopra del quale vengono ad essere 110. quale numero ne anco è nella scaletta, però si piglia il 96. che sta al quarto scalino, & si pongono 4. al cotiente, & sottraendo 96. da 110. restano di minutie 14. come si vede in detto esempio.

Suole alle volte occorrere, che nel diuifore vi stiano più zeri, & in tal caso per facilitare la diuisione, si possono leuare tante figure da mano destra del numero diuidendo, & il residuo diuiderlo al diuifore, con leuare però tutti li zeri da detto diuifore; come v. g. si ha da diuidere 3630692. per 3500000. si leuano dal diuifore li cinque zeri, & dal numero diuidendo altre cinque figure da mano destra, che sarebbono in detto esempio queste, cioè 30692. & poi si diuideno li 56. che restano nel numero diuidendo, alli 35. che restano similmente al numero diuifore, & restando minutie si pongono come di sopra, & appresso dette minutie, si aggiungono le figure leuate del numero diuidendo, poiche tutte restano minutie, & il diuifore sarà il 35. con li cinque zeri, che si pone sotto la linea di dette minutie, come in detto esempio saria vno al cotiente, & 21. di minutie, di modo, che dette minutie tutte andarebbono messe in questo modo.

350692

3500000

Da questo aduiene, che se il diuifore cotiente nell'ulti-
ma figura, cioè nella prima da mano sinistra, uno 1. &
tutte l'altre fossero zeri, il cotiente sarà l'istesso numero
diuidendo, leuando però prima da detto numero tante fi-
gure, quanti sono li zeri del diuifore, v. g. se si hà da diui-
dere 6579203. per 100000. il cotiente sarà 65, & l'al-
tre figure restano per minutie à tutto il diuifore in que-
sto modo.

$$\begin{array}{r} 79203 \\ \hline 100000 \end{array}$$

Similmente accade, che nel numero diuidendo vi siano
parimente zeri, & occorrendo, che quando si finisce l'ope-
ratione, non ve siano più figure significatiue in detto nu-
ro diuidendo, all'hora si pigliano tutti detti zeri, & si ag-
giungono al cotiente, come v. g. si hanno da diuidere
1863000000. per 345. nella seconda operatione si ri-
trouerà, che non rimangono più figure significatiue nel
numero diuidendo, di modo, che non si può fare diuisione
alcuna, si pigliano dunque cinque zeri, che restano non
operati, & si põgono al cotiente, il quale riuscirà in que-
sto modo. 5400000.

Et quando aduiene, che tanto al numero diuidendo,
quanto al diuifore, vi siano detti zeri, all'hora si leuano
tanti zeri dal diuidendo, quanti sono quelli del diuifore,
quali similmente si leuano, & poi si diuidono l'altre figu-
re del diuidendo al diuifore, & restando a detta operatio-
ne minutie, si pongono conforme al solito, & non occorre
aggiungere li zeri a dette minutie, ne al diuifore di sotto,
essendo, che hanno l'istesso valore, che se vi fossero, v. g.
 $\frac{3}{4}$ dette minntie vogliono tanto, quanto se fossero fatte

in questo modo

12000

18000

conforme se dirà nel seguente trattato del valore, & re-
dazione di dette minutie.

Fatta la diuisione, bisogna esaminare si stà ben fatta, si
come si è fatto in tutte l'altre operationi, si fa dunque la
proua nella diuisione in tre modi, il primo è per la regola
del 9. con leuare primieramente detti 9. dal diuifore, &
il residuo porre a mano sinistra della croce, poi si leuano
dal cotiente, & il residuo si pone a mano destra; doppo si
moltiplicano dette due figure l' vna per l'altra, & dal
moltiplicato leuando detti 9, il residuo si pone sopra la
croce; mà se vi fossero minutie, si vnisce detto residuo con
dette minutie, & leuandosi li 9. da detto numero, il resi-
duo si pone sopra la croce.

Ultimamente si leuano detti 9. dal numero diuiden-
do, & il residuo si pone sotto la cro-
ce, il quale deuè corrispondere con
la figura di sopra la croce per essere
ben fatta la diuisione, come v. g. in
questo esempio, il Zero sotto la cro-
ce, corrisponde a quella di sopra, pe-
rò è segno, che stà ben fatta la diui-
sione.

La seconda regola è quella del 7
la quale si fa dell'istesso modo, cioè
con l'istesso ordine, conforme si è
fatta questa del 9. si leuano prima
li 7. del numero diuifore; v. g. in

22
22478

56430 | 1567 $\frac{18}{16}$
34666
333

o
) (1
o

detto

detto esempio, se diria, da 36. leuati li 7. resta vno, si fa detto vno a mano sinistra della croce, poi dal cotiente, & se diria, da 15. leuate il 7. resta vno, poi da 16. restano due, ultimamente da 27. restano 6. da porsi a mano destra della croce, & multiplicando l'vno con il 6. faria similmente sei; mà perche ci sono le minutie, reseruando detto 6. & leuati da 18. di minutie li 7. restano 4. quali poi si vniscono con il sei riserbato, che fanno dieci, dalli quali leuate 7. restano 3. da porsi sopra la croce, dimodo, che in detto esempio la proua del 7. riuscirà in questo modo, & è segno, che è ben fatta la diuisione.

$$\begin{array}{r} 3 \\ 1 \overline{) 6} \\ 3 \end{array}$$

Il terzo esame si fa in questo modo, cioè si multiplica il cotiente, & il diuisore fra di se, al quale numero si aggiungono le minutie, (se vi sono) che darà l'istesso numero, che è stato diuiso, se però sarà ben fatta la diuisione, & detta regola è veramente infallibile, & questo quanto si può dire circa la diuisione.

TRATTATO SECONDO

De' Numeri, ouero Minutie.

Numeratione de numeri rotti. Cap. I.

Sino adesso habbiamo trattato delli numeri intieri, imparando il numerare, l'assummare, il sottrarre, il multiplicare, & il diuidere, & circa le operationi di detti numeri intieri è di bisogno essere molto bene esercitato, chi desidera seguitare auanti in det

28 Numeratione de numeri rotti Trat. II.

ta Aritmetica, che altrimenti non occorre ad affaticarsi in quest'altri seguenti Trattati. Si come dunque habbiamo trattato di detti numeri intieri, tratteremo similmente del numerare, dell'assumere, del sottraere, del multiplicare, & del diuidere li numeri rotti, essendo, che occorrono nella commune pratica de' negotij trattaremo dunque in questo Capitolo della numeratione di detti numeri rotti.

Primieramente bisogna presupporre, che numero rotto non vuol dire altro, che qualche parte, de qualche numero intiero diuiso, della quale parte, si hanno da fare più parte rotte, & eguali, conforme al diuisore, come v. g. 20. spartiti a 6. tocca 3. per ciascheduno, & due restano da farnesi sei parte eguali, conforme è il diuisore; benchè al presente non si chiama più diuisore, mà si bene denominatore, perche denomina, ouero dichiara, che detti numeri si hanno da spartire in tante parte eguali, conforme è esso denominatore; così ancora detto numero rimasto, che stà sopra a detto denominatore, se chiama numeratore, perche hà da numerare detti numeri in tante parti eguali, conforme è stato diuiso il numero diuidendo, si pronanciano poi dette minutie in questo modo v. g. $\frac{3}{4}$ tre quarti $\frac{2}{3}$ due terzi $\frac{5}{7}$ cinque settime $\frac{3}{5}$ tre quinte $\frac{2}{6}$ due sesti $\frac{3}{8}$ tre ottauc $\frac{2}{9}$ vinti sei trigesime ottauc, & così tutte l'altre.

Il valore poi di dette minutie può crescere in due maniere, la prima con crescere il numeratore, sopra l'istesso denominatore come v. g. $\frac{3}{4}$ tre settime, sarà di più valore, se si farà $\frac{4}{4}$ quattro settime, l'altro modo è minuire il denominatore sotto l'istesso numeratore, v. g. $\frac{4}{3}$ quattro ottauc, si farà maggiore, se si farà $\frac{4}{6}$ quattro sesti; osi similmente si fanno dette minutie di minor valore in due

mo-

modi, il primo è con mancare il numeratore sopra l'istesso denominatore, come v. g. $\frac{3}{7}$ tre quinte, saranno di minor valore, facendo $\frac{2}{7}$ due quinte, il secondo modo è crescere il denominatore sotto l'istesso numeratore, v. g. $\frac{4}{6}$ quattro sesti, si farà minore con fare $\frac{4}{8}$ quattro ottave; ma si occorresse, che tanto il denominatore, quanto il numeratore fossero eguali v. g. $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{5}{5}$ all'hora dette minutie vagliono per vno integro di spartirsi al denominatore, come del due, zoccaria vno per vno, così del 3. &c.

Et perche molte volte può occorrere, che vno non sappia quale minutia sia maggiore dell'altra, v. g. $\frac{5}{7}$ o $\frac{6}{8}$ all'hora si fa in questo modo, si multiplicano dette minutie in croce, & il multiplicato si pone sopra dette minutie multiplicata, & quella minutia, che hauerà più numero di sopra, sarà maggiore, conforme si può vedere in questi esempi.

$$\begin{array}{r} 40 \\ \hline 5 \end{array} \quad \begin{array}{r} 43 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 16 \\ \hline 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} 18 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 45 \\ \hline 7 \end{array} \quad \begin{array}{r} 60 \\ \hline 12 \end{array}$$

Si vede nel primo esempio, che vi sono due minutie, cioè $\frac{5}{7}$ & $\frac{6}{8}$ si multiplica dunque il 5. della prima minutia con l'otto della seconda, & se dice 5. via 8. sono 40. se pongono detti 40. sopra al 5. poi se dice 6. via 7. sono 43. si pongono detto 43. sopra il 6. come già vedi fatto, & così sta similmente fatto nell'altri esempi, & così si fa sempre.

Per facilitare tanto la numeratione di dette minutie, quanto tutte l'altre operationi, che circa esse habbiamo da fare, bisogna ridurre dette minutie con suoi denominatori nel minore numero, che si può, restando però

50 Numeratione de numeri rotti Trat. II.

con l'istesso valore, che prima hauendo v. g. $\frac{5}{100}$ cinquanta centesime, si possono ridurre a vno dimidio, cioè a questa $\frac{1}{2}$ che l'istesso, così ancora $\frac{2}{6}$ dodeci trigefime seste, si riducono a questa $\frac{1}{3}$ & similmente $\frac{1}{8}$ sedeci quadragesime ottave a questa $\frac{1}{4}$ & così tutte l'altre sempre, che si può fare, & all'hora si può fare, quando tanto il denominatore, quanto il numeratore si possono diuidere in più parti, come $\frac{6}{4}$ a $\frac{3}{2}$ & $\frac{1}{2}$ a $\frac{2}{4}$ altre poi non si possono ridurre come $\frac{5}{1}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{4}$ & simili, & in tal caso non si mouino.

Di modo, che bisogna subito dare l'occhio, & vedere in quante parti eguali si può diuidere il numeratore, & poi vedere se il denominatore similmente si può diuidere in tante parti, o in qualcheduna di quelle, & in quella minima quantità, che si possono diuidere, in quella si diuide v. g. nelli sopradetti esempj $\frac{6}{4}$ il 6. numeratore si può diuidere in 6. parti eguali, in due, & in tre, poi si vede, che il 24. denominatore si può diuidere similmente in 6. parti, & si potria anco diuidere in due, & in tre, ma si deue pigliare la più minima quantità, che è quella de 6. & così viene detta minutia ridotta ad $\frac{1}{4}$ che è dell'istesso valore de prima, & già il 4. è la sesta parte del 24. conforme l'vno è la sesta parte del 6. & il simile si vede in tutti l'altri esempj.

Detto modo è assai esato dalli Aritmetici, per cognoscere facilmente il valore di dette minutie, & per fare tutte l'altre operationi necessarie, si che non bisogna giudicare subito errore, vedendo detti libri d'Aritmetici, & scorgendo, che in detti esempj, benché li numeri intieri parino bene diuisi, nondimeno nelle minutie pare errore, perche dette minutie saranno già ridotte in minore figura, & però non si deue giudicare errore,

Quando poi si hanno a numerare dette minutie de più
quantità de numeri, si forsi per assummare insieme dette
minutie, ouero per sottraerle e di bisogno ridurle ad vno
denominatore, retenendo sempre l'istesso valore, poiche
altrimente è impossibile poter si fare operatione alcuna
v.g. $\frac{3}{4} \frac{2}{5} \frac{1}{6}$ dette minutie non si possono numerare per ha-
uere diuersi denominatori, per ridurle dunque ad vno de-
nominatore si fa in questo modo, si multi-
plica il 3. numeratore primo con il 5. de-
nominatore, che gli corrisponde in croce, $\frac{15}{4} \times \frac{8}{5}$
e la summa si pone sopra al detto primo
numeratore 3. poi si moltiplica il 2. nu-
meratore con il 4. denominatore, che gli corrisponde in
croce, e il moltiplicato si pone similmente sopra detto
numeratore 2. conforme già vedi in detto fatto esempio,
fatto questo, si moltiplica i due denominatori insieme,
cioè il 4. con il 5. che summano 20. e detto 20. serue
per denominatore delli 15. e dell' otto, di
modo, che dette minutie verrebbono a stare in
questo modo. $\frac{15}{20} \frac{8}{20}$

Quando poi occorre, che siano più minutie da reducirsi
sotto vno denominatore, all' hora si fa in questo modo, si
moltiplicano tutti li denominatori di dette minutie, v.g.
in queste minutie $\frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{3}{4} \frac{1}{5}$ moltiplicati li denominatori
frà di se summano 120. perche due via 3. sono 6. e 4.
via 6. sono 24. e 5. via 24. sono 120. dappò detti 120
se diuidono con il primo denominatore 2. che fanno 60.
moltiplicati poi detti 60. per il numeratore, che sta sopra
a detto 2. che è vno, se due vno via 60. fa 60. si fa dun-
que $\frac{60}{120}$ sessanta sopra al 120. per la prima minutia, poi
si parteno detti 120. al 3. secondo denominatore, che
fanno 40. detti 40. moltiplicati per il due di sopra al 3.
fan-

52 Numératione de numeri rotti Trat. II.

fanno 80. si fa dunque $\frac{80}{120}$ ottanta sopra al 120. per la seconda minutia, doppo detti 120. si diuidono a 4. che fanno 30. quali moltiplicati per il 3. di sopra al 4. summano 90. si fa $\frac{90}{120}$ nouanta sopra al 120. per la terza minutia, poi si diuidono detti 120. al 5. che faranno 24. & moltiplicati per l'uno di sopra a detto 5. fa similmente 24. si pongono dunque $\frac{24}{120}$ per la quarta minutia, di modo, che dette quattro partite veriano a questo modo, $\frac{60}{120}$ $\frac{80}{120}$ $\frac{90}{120}$ $\frac{24}{120}$ & si potriano porre con minore denominatore in questo modo. $\frac{30}{60}$ $\frac{40}{60}$ $\frac{45}{60}$ $\frac{12}{60}$

Fatto questo facilmente dette minutie si possono numerare, assumere, & sottrarre conforme si vuole, & dichiariremo appresso trattando di ciascheduna di dette operationi.

Additione, ouero assumptione de numeri rotti. Cap. II.

E di bisogno prima aduertire, che quando le minutie arriuanò al suo denominatore vagliono per uno intero, come v.g. $\frac{5}{6}$ $\frac{6}{6}$ di modo, che radunando più minutie insieme, quante volte cape il dominatore in dette minutie, per tanti numeri integri vagliono, come con esēpi dimostriamo appresso.

Quando dunque le minutie si sono redutte sotto eguali denominatori, all'hora si radunano insieme dette minutie in vna summa con vno denominatore, v.g. si hanno da assumere queste minutie $\frac{3}{12}$ $\frac{4}{12}$ $\frac{5}{12}$ radunate insieme le minutie, summano 12. & verriano in questo modo $\frac{12}{12}$ doue si vede, che non e' quali le minutie assunte al denominatore, però tutte minutie vagliono per vno intero, come poi si habbi a fare, che le minutie habbino

uno eguale denominatore, & con eguale valore, già l'abbiamo detto nel Capitolo antecedente.

Quãdo poi occorre, che il denominatore fosse più assai, che non è il numeratore, all' hora vale per tanti numeri intieri, quante volte detto numeratore cape in detto numeratore; e per maggior chiarezza mostreremo questo con più esempij.

Vi sono v. g. da assumere queste min-
utie, si pongono prima sotto uno denomi-
natore, & verriano dette minutie a questo
modo $\frac{8}{12}$ $\frac{9}{12}$ poi si assummano, & si dice 8.
& 9 fanno 17. si pongono 17. sopra al 12
in questo modo, $\frac{17}{12}$ ma perche le minutie non solo entrano
una volta nel denominatore 12. ma ancora ci auanza-
no 5. però detto 5. si pongono per minutie, di modo, che
dette minutie assummate insieme vaglionò per uno intie-
ro, & restano 5. de minutie, si che la summa di det. e mi-
nutie saria questa; cioè $1\frac{5}{12}$ & se il denominatore doppò
l'assumatione fosse v. g. in questo modo, $\frac{3}{2}$ detta sum-
ma de minutie valeria per due integri, & restariano 6.
di minutie, di modo, che verriano a questo valore $2\frac{6}{12}$
ouero $2\frac{1}{2}$ che è l'istesso.

Et se per sorte se hauessero da assumere queste minu-
tie, cioè $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{5}$ all' hora se haueriano prima da porre tut-
te dette partite sotto uno denominatore eguale, confor-
me la regola insegnata nell' antecedente capo, ouero se po-
tria ancora fare apunto come si fa quando sono due parti-
te, & doppò, che dette due partite sono assummate insie-
me fare l' istessa operatione con la terza partita, & cost
poi con la quarta, & c. di modo, che in detto esempio ver-
ria l' operatione con le due prime partite in questo modo
 $\frac{8}{12}$ & poi detta partita operata con la terza, cioè con le

54. Assumatione de numeri rotti Trat. II.

rendera le minutie a questo modo $\frac{1}{2} \frac{3}{4}$ & operando poi questa partita con le $\frac{1}{2}$ renderia le minutie a questo modo $\frac{2}{4} \frac{3}{4}$ che è l'istesso, che $\frac{3}{4}$.

Quando poi si hanno da assumere minutie con numeri integri, ouero integri, & minutie, con altri integri, & minutie, si fa in questo modo, v. g. 5. si ha da assumere con $\frac{3}{4}$ verria la summa de $5 \frac{3}{4}$ cinque, & tre quarti insieme, ouero 9. & si faria $9 \frac{3}{4}$ così ancora se si hauesse da assumere $7 \frac{3}{4}$ con $5 \frac{3}{4}$ verria $12 \frac{3}{4}$ è perche la minutia arriua al denominatore, se faria 13. senza minutia. Così parimente $15 \frac{5}{8}$ con $13 \frac{8}{8}$ fariano $28 \frac{1}{4}$ ouero $29 \frac{1}{2}$ perche la minutia soprauanza il dominatore in due, & così si aggiungono tutte l'altre, mà il tutto consiste, che le minutie siano messe prima sotto vno eguale denominatore.

La pruoua, che si fa in detta operatione è la sottrattione, cioè sottratta vna minutia aggiunta, resterà l'altra, se non si è errato, come v. g. $7 \frac{3}{4}$ con $5 \frac{3}{4}$ summano $12 \frac{3}{4}$ da detto numero leuando $5 \frac{3}{4}$ resterà $7 \frac{3}{4}$ così ancora da queste minutie $\frac{3}{4}$ & $\frac{5}{8}$ operando conforme la regola, si farà questa minutia $\frac{7}{8}$ cioè $2 \frac{7}{8}$ dal quale numero leuando $\frac{3}{4}$ resterà $\frac{5}{8}$ mà come si facci detta sottrattione, lo diremo nel seguente Capo.

Sottrattione de numeri rotti.

Cap. III.

Quando le minutie minori si hanno da sottraere dalle maggiori, hauendo vno denominatore, si sottraeno facilmente, v. g. da $7 \frac{7}{8}$ leuate $\frac{4}{8}$ resta $\frac{3}{8}$ è quando non hanno eguale denominatore, si fanno eguali cōforme si è detto nel primo capo, & così poi si sottrae subito la

la minore dalla maggiore, v. g. $\frac{4}{5}$ & $\frac{3}{6}$ se riducono a questo modo $\frac{8}{10}$ & $\frac{5}{10}$ leuati li 15. da 24. restano $\frac{9}{10}$.

Et quando occorre leuare le minutie da qualche numero integro, all'hora si piglia vno numero integro, & se ne fa minutie, & poi si fa la sottrattione, v. g. si ha da leuare da 8. $\frac{3}{4}$ si leua vno da 8 & restano 7. & di detto vno se ne fa minutie, cioè $\frac{2}{4}$ dalle quali leuate $\frac{3}{4}$ restano $\frac{1}{4}$ & verria l'esempio $7\frac{1}{4}$.

Altre volte occorre leuare integri, & minutie da vna partita de integr, come v. g. da 25. leuate $5\frac{3}{4}$ primieramente si leuano li 5. da 25. & restano 20 poi si piglia vno, & restano 19. & di detto vno si fa minutie $\frac{3}{4}$ delle quali sottratte $\frac{3}{4}$ restano $\frac{1}{4}$ di modo, che la sottrattione resteria a questo modo $19\frac{1}{4}$.

Occorre similmente leuare da numeri integri con minutie, altri integri, & minutie, v. g. da $24\frac{6}{8}$ leuate $9\frac{4}{5}$ bisogna vedere prima quale minutia sia maggiore conforme la regola sopra data, & vedendo, come in questo esempio, che la minutia detraendo sia maggiore, & che perciò non si può sottrarre dalla minore, doppo leuati li 9. da 24. che restano 15. si piglia vno, che restano 14. & di detto vno si fa minutie, di modo, che verria l'esempio in questo modo $14\frac{8}{8}$ & aggiuntoui li sei, fariano $2\frac{4}{8}$ dette poi minutie se haueriano da ridurre sotto vno eguale denominatore, conforme si è detto di sopra insieme con le $\frac{4}{5}$ & dipoi la minutia minore si sottraeria delle maggiore di modo, che l'esempio verria in questo modo $14\frac{1}{8}$ perche multiplicati li denominatori fra di se, cioè 18. & 10. summano 180. & moltiplicate le minutie incroce con li denominatori; la prima summaria 240. & la seconda 72. quale sottratta dalla prima restano 168. & leuando 9. da 23. restano $14\frac{1}{8}$.

Quan

56 Sottrattione de numeri rotti Trat. II.

Quando poi occorre sottraere vno numero minore con minutia minore, da vno numero maggiore con minutia maggiore, all'hora si fa facilmente; Aduertendo però sempre di ridurre le minutie sotto eguale denominatore, conforme più volte si è detto.

La proua di detta sottrattione, si fa per l'additione, cioè aggiungendo la minutia rimasta nella sottrattione, alla minutia sottratta, che renderà l'istessa minutia, dalla quale è stata fatta la sottrattione, se però non si è fatto errore; come v. g. sottraendo da $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ restarà $\frac{5}{12}$ a quali aggiungendoui $\frac{3}{4}$ summano $\frac{9}{12}$ $\frac{8}{12}$ che è l'istesso che $\frac{2}{3}$ così ancora da $\frac{3}{4}$ lenate $\frac{7}{8}$ restarà questa minutia $\frac{1}{8}$ alla quale aggiungendo $\frac{3}{4}$ summaranno $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{4}$ che è l'istesso, che $\frac{3}{4}$

Multiplicatione de numeri rotti.

Cap. IV.

La multiplicatione de detti numeri rotti facilmente si fa con multiplicare frà di se detti numeri, ouero li numeratori, & il simile si fa con li denominatori, come v. g. $\frac{5}{8}$ per $\frac{6}{9}$ summano $\frac{30}{72}$ ma quando si hauesse da fare detta multiplicatione per qualche numero integro, v. g. vno proponesse douersi multiplicare $\frac{3}{4}$ per 6. all'hora si pareria vno sotto al 6. facendo di detto 6. minutie di modo, che si haueriano a porre in questo modo $\frac{6}{1}$ $\frac{3}{4}$ & multiplicato il 6. con il 3. summano 18. & li denominatori sono 4. perche vno via 4. fa 4. & si a dette minutie vi fossero numeri integri di detti numeri, si fariano minutie, v. g. 7. per 4. si faria in questo modo 7. per $\frac{1}{4}$ multiplicando poi li 7. per 14. summano 98. & multiplicati li denominatori vno via 3. fa 3. di modo, che la multiplicatione saria a questo modo $\frac{98}{3}$ cioè 32 $\frac{2}{3}$ il simile si fa in

que-

quest'altro esempio v. g. $4\frac{2}{3}$ per $3\frac{2}{3}$ ma adesso tutti detti integri si fariano minutie, & verriano in questo modo $\frac{14}{3}$ per $\frac{17}{3}$ & moltiplicate insieme, summariano $\frac{238}{9}$ cioè $15\frac{1}{3}$.

La pruoua di detta multiplicatione, si fa per la diuisione, cioè diuiso detto moltiplicato per vno numero rotto moltiplicante, necessariamente nel cotiente darà l'altra minutia, per la quale si è fatta la multiplicatione, v. g. $\frac{1}{2}$ moltiplicato per $\frac{4}{3}$ farà $\frac{4}{3}$, quale summa se si diuide per $\frac{1}{2}$ darà al cotiente $\frac{4}{3}$ ouero diuiso per $\frac{4}{3}$ darà $\frac{1}{2}$ conforme diremo nel seguente capo.

Diuisione de numeri rotti.

Cap. V.

Detta diuisione, si farà facilmente, facendo a punto, conforme si è fatto nella multiplicatione, cioè moltiplicando tanto li numeratori, quanto li denominatori frà di se, ma con questa differentia, che il diuisore si pone al contrario, cioè il numeratore di sotto, & il denominatore di sopra, come v. g. $\frac{2}{3}$ per $\frac{2}{7}$ se poneriano a questo modo $\frac{2}{7}$ per $\frac{2}{3}$ & moltiplicato il 2. con il 7. fanno 14. & moltiplicato il 2. con il 3. che stanno di sotto, fanno 6. è fatta dunque la diuisione, & viene a questo modo $\frac{14}{6}$ cioè $2\frac{2}{3}$ & det'o numero è il cotiente; Così similmente si fa, quando si fa diuisione de integri per minutie, con porre vno sotto l'intero, così similmente si fa la diuisione quando si ha da fare da integri con minutie per integri, & minutie, conforme si può vedere nella presente tabella, douo si pongono tutti li modi da fare detta diuisione.

| | | | Cotienti |
|----------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| 8 | per $\frac{3}{4}$ | $\frac{8}{1}$ | $\frac{5}{3}$ cioè $13\frac{1}{3}$ |
| 7 | per $\frac{3}{2}$ | $\frac{7}{1}$ | $\frac{3}{11}$ cioè $1\frac{10}{11}$ |
| $\frac{4}{7}$ | per 5 | $\frac{4}{7}$ | $\frac{3}{4}$ cioè $\frac{4}{34}$ |
| $\frac{3}{4}$ | per $6\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{13}{1}$ cioè $\frac{39}{4}$ |
| $6\frac{2}{3}$ | per $\frac{4}{6}$ | $\frac{20}{1}$ | $\frac{6}{2}$ cioè 12 |
| $5\frac{1}{2}$ | per $3\frac{2}{4}$ | $\frac{11}{2}$ | $\frac{5}{17}$ cioè $1\frac{6}{34}$ |
| $6\frac{1}{2}$ | per $5\frac{2}{7}$ | $\frac{13}{2}$ | $\frac{7}{35}$ cioè $1\frac{4}{18}$ |
| $\frac{4}{9}$ | per $\frac{2}{3}$ | $\frac{4}{9}$ | $\frac{3}{2}$ cioè $\frac{32}{18}$ |

Così si pongono gli esempi.

Si può fare ancora detta diuisione senza mutare il diuifore; ma basteria moltiplicare il numeratore della minutia diuidenda, con il denominatore della minutia del diuifore, che faria l'istesso; ma conforme al modo detto, sta più chiaro.

La proua di detta operatione, si fa per la moltiplicatione, cioè con moltiplicare le minutie del cotiente con il diuifore, & renderà l'istessa minutia diuisa, come v. g. il cotiente di detta diuisione fatta nel primo esempio è $3\frac{4}{3}$, detto cotiente si moltiplica con il diuifore, che è $\frac{3}{4}$ & fanno la summa di 120. minutie, & il denominatore sarà 15. di modo, che verria a questo modo $\frac{120}{15}$ cioè 8. che è il numero diuiso, & però sta ben fatta la diuisione.

Così ancora moltiplicati li $\frac{21}{18}$ del cotiente con li $\frac{21}{18}$ del

del diuifore, $\text{summano } \frac{2}{3} \frac{3}{3}^1$ che è l'istesso, che 7. quali habbiamo diuifi, & così sono tutti l'altri, & questo è quanto occorre circa la diuisione.

Dal detto modo di diuidere dette minutie, ne nasce subito vno dubbio alle persone principianti, & è, che fatta la diuisione, si vedono essere maggiore le parti, che non il numero diuiso, cosa assai contraria di quello si vede nel diuidere li numeri integri, & la ragione stessa dimostra, che le parti non possono essere maggiori del tutto, & il contrario nondimeno si vede in dette minutie, v. g. diuiso $\frac{1}{3}$ per $\frac{3}{7}$ sarà il cotiente $\frac{7}{9}$ che è maggiore de $\frac{1}{3}$ l'istesso dubbio aduiene nella multiplicatione di detta minutie, poiche il multiplicato, viene minore delle parti multiplicati, come v. g. multiplicati $\frac{2}{3}$ per $\frac{3}{4}$ sarà il multiplicato $\frac{6}{12}$, quale è minore delle parti moltiplicate, nondimeno a questo dubbio si risponde facilmente, cioè, che è differente la natura dell'integri, da quella delle minutie, l'integri quanti più sono, tanto più summa costituiscono; ma le minutie, quanto più si moltiplicano, ò diuidono, tanto più picciole vengono, v. g. vn mezzo scuto, in quante più parti si moltiplica, ò diuide, tanto più minore parti rende, & così ancora hauendosi da diuidere venti minutie a dieci, tanto più parte maggiore toccherà a ciascheduno, & se si diuidessero a cinque, sempre più anderanno crescendo dette parti di modo, che non è rarauiglia alcuna; benché questo caso occorre, quando le operationi si fanno fra minutie, & minutie, ouero fra integri assoluti, & minutie absolute; ma quando dette operationi si fanno fra numeri integri, & numeri integri con minutie, ouero fra numeri integri con minutie, & altri numeri integri con minutie, non occorre detta difficoltà per causa di detti numeri integri, v. g. si se moltiplica 3. per $4\frac{2}{3}$ sarà il mul

60 Diuisione de numeri rotti Trat. II.

moltiplicato $4\frac{2}{3}$ cioè 14. integri, di modo, che il moltiplicato è maggiore per causa dell' integri, così ancora moltiplicati $3\frac{2}{3}$ per $4\frac{2}{3}$ faranno $19\frac{8}{9}$ cioè $16\frac{6}{9}$ ouero $1\frac{5}{3}$ doue si vede che il moltiplicato è maggiore; nella diuisione similmente diuisi 6. per $3\frac{1}{2}$ farà al cotiète $1\frac{2}{7}$ cioè $1\frac{5}{7}$ che è minore del numero diuiso; così ancora $4\frac{2}{3}$ per $2\frac{1}{3}$ darà al cotiente $2\frac{2}{3}$ che son due integri, minore similmete numero del diuiso.

Minutie de minutie. Cap. VI.

HAuendo già detto delli numeri intieri, & delle loro minutie; adesso è di bisogno dire qualche cosa delle minutie de minutie, quale nõ sono altro, che minutie fatte ouero, che prouengono da altre minutie sceplici rimaste nelli numeri intieri, v.g. restano in vno numero integro $\frac{4}{7}$ si di detto 4 si faceßero otto parti eguali, & di dette otto parti, se ne pigliassero tre, detti tre si chiameriano minutie de minutie, & si anco di dette tre minutie, se ne faceßero sei parti eguali, delle quali se ne pigliassero tre, detti tre si dimanderiano minutie de minutie, & si pronuntiariano tre sestis, di tre oitauae, di quattro settime, & si scriueriano in questo modo $\frac{3}{8} \frac{3}{8} \frac{4}{7}$ l'ultima minutia, cioè la prima fatta, se scriue con la linea solamente, acciò si cognosca, che prouiene dall'altre minutie antecedenti, conforme similmente si vede in questo esempio $\frac{3}{4} \frac{2}{4} \frac{3}{6} \frac{1}{2}$ & si pronuntia, vno terzo de due quarti, da tre sestis, di vno dimidio, che vuol dire di detto dimidio essersi fatto 6. parti eguali, & pigliatone tre, de quali se sono fatte 5. parti eguali, & pigliatone due, delle quali se ne sono fatte tre parti, e se ne piglia vna, che stà sotto la linea.

Dette minutie de minutie; per sapere il loro valore, ò per hauerle da moltiplicare, ò farne altra operatione, se

riducono ad vna minutia semplice in questo modo; si moltiplicano li numeratori fra di se, cioè il primo con il secondo, & il secondo con il terzo, & così di mano in mano sino a l'ultimo, & il simile si fa nelli denominatori, come v.g. $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}$ se ridurrà a questa minutia $\frac{2}{3}$, & quest'altra $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4}$ se ridurrà a questa $\frac{6}{6}$ così ancora $\frac{2}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6}$ se ridurrà questa $\frac{8}{60}$ & che ciò sia vero, se questa minutia de minutia $\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6}$ prouenisse dalla diuisione di vno scuto, certo è, che $\frac{3}{4}$ sono 6. giulij, delli quali fattone tre parti, & pigliatone due, sono 4. giulij, de quali pigliatone tre parti, sono tre giulij, di modo, che si vede, che l'ultima minutia di minutia contiene tre giulij, & ridotte dette minutie ad vna semplice, verria in questo modo $\frac{1}{6} \cdot \frac{6}{6}$ & habbbono l'istesso valore, che prima.

Della Insitione. Cap. VII.

Perche li Aritmetici nelle sopradette minutie si sogliono seruire di questa regola chiamata insitione, però acciò detto trattato sia compito, hò giudicato esser necessario dichiarare, che cosa sia detta insitione. Dico dunque, che insitione non vuol dire altro, che essendo proposte due ò più minutie, quale vna sia frattione, ò di tutte l'altre, che li seguitano appresso, ouero di vna parte di quella; lo aggiungere dette minutie iusieme, se chiama insitioae, come v.g. $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}$ dette tre quarte possono essere, ò minutie di tutte le $\frac{2}{3}$ de quali se fossero fatte 4. parti, & poi pigliatone tre, ouero dette tre quarte possono essere minutie di vna parte sola di dette $\frac{2}{3}$ che saria $\frac{2}{3}$ del quale si fariano 4. parte eguali, de quali se ne fossero pigliate tre, lo aggiungere poi dette tre quarte a $\frac{2}{3}$ si chiama insitione.

Similmente ancora venendo proposte più minutie, v.g. $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{3}{7}$ le dette prime fatte, cioè due terzi $\frac{2}{3}$ possono essere minutie di $\frac{1}{4}$ de $\frac{1}{5}$ de $\frac{1}{7}$ cioè, che dette $\frac{2}{3}$ contenghino in se due parti del seguente $\frac{1}{4}$ quale prouenghi da $\frac{1}{4}$ & detto prouenghi da $\frac{1}{5}$ si che da $\frac{1}{7}$ si sono fatte cinque parti eguali, & pigliatone vna, che è $\frac{1}{7}$ se ne fa 4. parti, de quali similmente si piglia vna, & si fa $\frac{1}{4}$ quale spartito in 3. parti eguali, se ne pigliano 2. & si fa $\frac{2}{3}$ di modo, che due terzi $\frac{2}{3}$ contengono in se due parti di vno quarto, di vno quinto, di vno settimo, ouero può essere, che dette $\frac{2}{3}$ siano minutie di $\frac{3}{4}$ di $\frac{2}{5}$ di $\frac{3}{7}$ cioè, che di dette $\frac{2}{3}$ se siano fatte 5. parti eguali, & pigliatone 2. & fatto $\frac{2}{5}$ & è di dette $\frac{2}{3}$ fattone 4. parti, & pigliatone 3. per fare $\frac{3}{4}$ de quali fattone 3. parti eguali, se ne siano pigliate 2. per farne $\frac{2}{5}$ & così dette $\frac{2}{3}$ conteneriano in se due terzi di 3. quarte, di due quinte, de tre settime, & l'aggiungere dette minutie insieme, se chiama insitione.

Si caua da questo, che di due modi può essere detta insitione, ò di vna minutia, quale sia minutia di vna parte di tutte l'altre minutie, che gli seguitano appresso, ouero minutia di tutte dette minutie, conforme habbiamo dichiarato, & benché il primo modo sia quello, che serue grandemente alli Aritmetici, poiche con quelle diuidono facilmente li numeri, che contengono in se minutie, conforme mostreremo appresso; nondimeno quiui dichiareremo tutti due modi di detta insitione, per quelli, che desiderano caminare auanti in questa scientia.

Diciamo dunque, che detta insitione pigliata nel primo modo, si fa in questa maniera, v.g. $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ in questo caso se moltiplica il numeratore 3. della seconda minutia fatta con il denominatore 3. della prima minutia, al quale moltiplicato si aggiunge il numeratore 2. della prima minu-

ria, di modo, che fariano 11. a quali si faria il suo denominatore, con multiplicare essi denominatori frà se, che fariano 12. di modo, che inserite dette minutie verria l' esempio a questo modo $\frac{1}{1} \frac{1}{2}$ il che si proua con la regola dell' additione di sopra detta. Riducendo prima $\frac{2}{3} \frac{1}{4}$ faranno $\frac{2}{12}$ quali aggiunti a $\frac{3}{4}$ faranno $\frac{4}{4} \frac{4}{12}$ cioè $\frac{1}{1} \frac{1}{3}$ conforme prima.

Quando poi si hanno da inserire più minutie insieme, quali siano minutie similmente di una parte di tutte l'altre seguenti, si fa in questo modo, si multiplica il numeratore dell'ultima minutia con il denominatore della penultima, al quale multiplicato si aggiunge il numeratore di detta penultima, poi tutto detto num. si multiplica con il denominatore della terza minutia, & poi detto numero si multiplica con il denominatore della quarta minutia, & così di mano in mano sino al fine, v.g. queste minutie $\frac{2}{3} \frac{3}{4} \frac{2}{5} \frac{4}{7}$ si inseriscono in questo modo, si multiplica il 4. numeratore prima da mano destra con il 5. denominatore secondo, & summano 20. a quali aggiuntoui il 2. che sta sopra a detto 5. fanno 22. detti 22. si multiplicano con il 4. denominatore terzo, che faranno 88. & aggiuntoui il 3. di sopra a detto 4. fanno 91. quali multiplicati per 3. denominatore ultimo, faranno 273. a quali giunto 2. numeratore ultimo, fanno 275. quali numeri costituiscono vno numeratore, & il denominatore sarà il multiplicato de tutti li detti denominatori frà se; si che multiplicati 3. in 4 sono 12. & 12. in 5. sono 60. & il 60. in 7. sono 420. di modo, che dette minutie inserite insieme, verriano in questo modo $\frac{275}{420} \frac{5}{7}$ ouero $\frac{5}{84}$.

E che ciò similmente sia vero, si proua per l' istessa regola di additione, poiche ridotte prima dette minutie ad una sola semplice come le già sopradette $\frac{2}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{3}{7}$ si ridu-

riano a queste $\frac{2}{4} \frac{2}{6}$ così similmente ridotte $\frac{3}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{7}$ fariano $\frac{2}{1} \frac{2}{6}$ & ultimamente ridotte $\frac{2}{4} \frac{1}{7}$ fariano $\frac{2}{3} \frac{1}{5}$ a dette tre summe aggiunte $\frac{4}{7}$ fariano $\frac{2}{1} \frac{4}{4} \frac{2}{6} \frac{5}{6} \frac{0}{6} \frac{0}{6}$ che è l'istesso, che $\frac{2}{1} \frac{7}{2} \frac{5}{6}$ ouero $\frac{5}{8} \frac{5}{4}$ quale summa si è ritrouata più facilmente per le regola dell'insitione.

Potrà dunque facilmente cognoscere ciascheduno, che cosa sia insitione, & che sia assai differente dalla riduzione di minutie de minutie ad vna minutia semplice, della quale habbiamo detto nel capitolo antecedente, poiche con questa riducendosi, v. g. $\frac{2}{3} \frac{3}{4}$ se riducono a questa $\frac{6}{1} \frac{1}{2}$ ma se se inserissero verriano a questo modo $\frac{1}{1} \frac{1}{2}$ se però dette $\frac{2}{3}$ fossero minutie di vna parte delle $\frac{3}{4}$ conforme habbiamo trattato sino adesso; perche se le $\frac{2}{3}$ fossero minutie di tutte le $\frac{3}{4}$ verriano inserite in questo modo $\frac{1}{1} \frac{5}{2}$ conforme diremo appresso.

Si è quiui similmente da aduertire, che in detta prima insitione, non bisogna ridurre le minutie de minutie in minori numeri, se non doppò fatta detta insitione, perche altrimenti si farà errore, come v. g. si se fossero da inserire queste minutie de minutie $\frac{2}{4} \frac{5}{1} \frac{5}{6}$ certo è, che verriano a questo modo $\frac{2}{4} \frac{2}{6}$ ma si se riduceessero a minori numeri v. g. $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$ verriano $\frac{3}{4}$ quale minutia è assai diuersa dalla prima; ma fatta poi l'operatione, si possono ridurre a minori numeri, come dette $\frac{1}{2} \frac{2}{6}$ a questi $\frac{1}{2} \frac{1}{6}$.

E da sapere similmente, che detta operatione de insitione, della quale sin' adesso habbiamo parlato, qualsiuoglia summa, che si collige da dette minutie de minutie, mai può arriuare al valore de vno integro, poiche tutte le minutie prouengono da vna minutia semplice, ouero da vna parte di essa, & così inserite tutte dette minutie, benché fossero mille, mai faranno di più valore, della detta minutia, dalla quale prouengono.

E per

E perche detta regola de infitione serue per sapere facilmente diuidere li numeri integri, che contengono minutie, per altri numeri integri, per questo, acciò si veda l' eccellenza di detta regola lo dimostreremo con esempj, si hà v. g. da diuidersi $30\frac{1}{4}$ per 8. certo è, che diuisi li 30. ad 8. darà al cotiente $3\frac{6}{8}$ si hà poi da diuidere il $\frac{1}{4}$ per 8. & aggiungere al detto cotiente, & diuiso detto $\frac{1}{4}$ faria $\frac{1}{4}$ di una ottaua, a punto come se si diuidesse 1. per 8. faria $\frac{1}{8}$ inserite poi le dette due minutie $\frac{1}{4}$ con le $\frac{6}{8}$ faranno $\frac{3\frac{5}{2}}$ di modo, che verria detta diuisione, fatta in questo modo $3\frac{3\frac{5}{2}}$ & per farla più facilmente si pone il diuisore 8. sotto al 30. & auanti detto 30. si pone $\frac{1}{4}$ in questo modo $\frac{1}{4}\frac{30}{8}$ inseriti detti due numeri insieme faranno $\frac{1\frac{3}{2}}{3\frac{3\frac{5}{2}}{2}}$ cioè $3\frac{3\frac{5}{2}}$ conforme prima, si che resta detta diuisione fatta facilmente, & si proua, che sia vero, per l' istessa regola della diuisione, poiche deuisi $30\frac{1}{4}$ per 8. darà al cotiente $\frac{1\frac{3}{2}}{3\frac{3\frac{5}{2}}{2}}$ cioè $3\frac{3\frac{5}{2}}$ che è l' istesso.

Diuidiamo similmente $200\frac{2}{7}$ per 12. & diuisi prima li 200 per 12. darà al cotiente $16\frac{8}{12}$ diuisi poi $\frac{2}{7}$ per 12 faranno $\frac{2}{7}$ di uno duodecimo, inserite poi dette $\frac{2}{7}$ con le $\frac{8}{12}$ faranno $\frac{16\frac{2}{6}}$ di modo, che la diuisione verria in questo modo $16\frac{16\frac{2}{6}}$ ma più facilmente si farà con porre li 12. sotto alli 200. & le $\frac{2}{7}$ auanti in questo modo $\frac{2}{7}\frac{200}{12}$ inseriti detti numeri insieme, faranno $\frac{1\frac{0}{6}}{16\frac{16\frac{2}{6}}{6}}$ cioè $16\frac{16\frac{2}{6}}$ che è l' istesso, il simile riesce per la regola della diuisione, poiche diuisi detti $200\frac{2}{7}$ per 12. darà al cotiente $\frac{1\frac{0}{6}}{16\frac{16\frac{2}{6}}{6}}$.

Così ancora diuidiamo $100\frac{2}{7}$ per 10. diuisi li 100. alli 10. farà al cotiente 10 diuisi poi $\frac{2}{7}$ per 10. faranno $\frac{2}{7}$ di una decima, qual $\frac{2}{7}$ inserite a $\frac{0}{10}$ faranno $\frac{2}{70}$ doue nota, che non essendo restate minutie, nel diuidere li 100. a 10. però inserendo le $\frac{2}{7}$ alli 10. si farà al detto 10. uno ze-

ro di sopra, denotando non hauere minutie, & detto Zero si vnisce con il 7, che fanno 70. & verria il contiente In questo modo $10\frac{2}{57}$ & per farla più facilmente poniamoll 10. sotto il 100. & li $\frac{2}{7}$ auanti in questo modo $\frac{2}{7}\frac{100}{10}$ quali inseriti insieme, faranno $7\frac{100}{70}$ cioè $10\frac{2}{70}$ che è l'istesso, il che si proua similmente per la regola della diuisione, poiche diuisi 100 $\frac{2}{7}$ per 10. darà al cotiente $7\frac{100}{70}$ cioè $10\frac{2}{70}$.

Siche si vede quanto sia eccellente detta regola per diuidere numeri integri con minutie per altri numeri integri.

L'altro modo di fare detta infittione, quando vna minutia de minutie è tale a rispetto di tutte l'altre minutie, che gli succedono, si fa in questa maniera, proposte due di dette minutie, v.g. $\frac{2}{3}$ & $\frac{3}{4}$ si moltiplica il numeratore 3. con il 5. denominatore della seguente minutia, che summano 15. poi si moltiplicano li numeratori frà di essi, che fanno 6. quali si aggiungono alli 15. che fanno 21. quali seruono per numeratore; poi se gli fa il denominatore, con moltiplicare li detti denominatori frà di se, che summano 35. di modo, che dette minutie vengono inserite a questo modo $\frac{21}{35}$ & che ciò sia vero, si proua per la regola dell'additione, poiche ridotte prima dette minutie $\frac{2}{3}$ & $\frac{3}{4}$ faranno $\frac{6}{12}$ conforme la regola della riduzione di dette minutie di minutie, cioè con moltiplicare solamente li numeratori frà di se, & poi li denominatori; gionti poi $\frac{6}{12}$ a $\frac{3}{4}$ faranno $\frac{14}{12}$ che è l'istesso, che $\frac{21}{35}$ conforme già si era fatto.

Quando vi sono più minutie di quest'istessa qualità da inserire, v.g. $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{4}{7}$ all'hora si moltiplica il 4. numeratore con il 5. seguente denominatore, che fariano 20. poi moltiplicati li due numeratori, cioè il 4. con il 2. anteceden-

dente fanno 8. quali aggiunti alli 20. fanno 28. detti 28.
 si multiplicano con il terzo denominatore, cioè con il 4.
 seguente, che summano 112. alli quali si aggiunge il mul-
 tiplicato da farsi dell tre numeratori, cioè 3. 2. 4. che
 fanno 24. & giunti a detti 112. summano 136. quali
 multiplicati per il 3. ultimo denominatore, fanno 408.
 a quali aggiunto il multiplicato da farsi de tutti li nume-
 ratori, 2. 3. 2. 4. che sono 48. summano 456. quali ser-
 uono per numeratore, & il loro denominatore sarà il mul-
 tiplicato da farsi di tutti detti denominatori frà di se,
 3. 4. 5. 7. quali fanno 420. di modo, che inserite $\frac{2}{3}$ di $\frac{3}{4}$
 di $\frac{2}{5}$ di $\frac{4}{7}$ viene detta infitione in questo modo $\frac{456}{420}$ cioè
 $1\frac{36}{420}$ ouero $\frac{3}{5}$ & si proua parimente per la regola del-
 l'additione, poiche ridotte primieramēte dette minutie de
 minutie, cioè $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{4}{7}$ ad vna minutia sēplice, verria in
 questo modo $\frac{48}{420}$ & ridotte similmente queste $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{4}{7}$ fa-
 ranno $\frac{24}{420}$ & poi $\frac{2}{5}$ $\frac{4}{7}$ fanno ancora $\frac{8}{175}$ dette dunque tre
 minutie $\frac{48}{420}$ $\frac{24}{420}$ $\frac{8}{175}$ se si aggiungono a $\frac{4}{7}$ si farà questa
 minutia $\frac{15640800}{14406000}$ cioè $1\frac{1234800}{14406000}$ quali ridotti a
 minori numeri è l'istesso, che $1\frac{3}{5}$ benche con molta più
 facilità se sia fatta detta operatione per la infitione.

Si è da aduertire, che in questa seconda regola de infi-
 tione, si possono ridurre dette minutie de minutie a mino-
 ri numeri auanti, che si facci l'operatione, perche essendo
 vna minutia, minutia de tutte le minutie, che gli seguo-
 no appresso, ne viene, che sempre detta minutia è dell'
 istesso valore, v.g. si hà da inserire $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{8}$ verriano $\frac{2}{3}$ $\frac{8}{2}$ cioè
 $\frac{7}{8}$ dell'istesso modo sarà, si se douesse inserire $\frac{3}{4}$ a $\frac{1}{2}$ poiche
 fariano $\frac{7}{8}$ come prima, il che non aduiene nella prima re-
 gola, perche essendo vna minutia, minutia solamēte d'una
 parte della minutia subseguente, si variaria il valore, po-
 che cosa differente è essere minutia di vna ottava, che di

68 Pratica de numeri integri, e rotti Tr. II.
vuo d' midio, conforme già si è dimostrato.

Pratica de numeri integri, & minutie ;
Cap. VIII.

H Auendo già detto delli numeri integri & minutie & delle minutie de minutie, acciò la persona si possa essercitare in detti numeri, però andare mo proponendo alcuni dubbij pratici de numeri integri, & minutie, acciò dall' essercitio di questi si possino facilmente sciogliere gl'altri nell' occorrenze.

Dub. 1. Si dimanda, quale sia quel numero, dal quale sottratto $39.$ habbiano da restare $105.$ & quale sia quello dal quale sottratto $\frac{2}{3}$ habbia da restare $12\frac{2}{3}$ detti, & simili dubbij, si sciogliono per la regola dell' additione ; si che aggiunti $39.$ a $105.$ fanno $144.$ quali sono il numero, che si cercaua, poiche da detto numero, leuati $39.$ restano $105.$ al secondo si farà dell' istesso modo, giunto $\frac{2}{3}$ a $12\frac{2}{3}$ (conforme habbiamo detto trattando delle minutie) & faranno $1\frac{6}{3}$ cioè $1\frac{1}{1}$ quale aggiunto a $12.$ sono $13\frac{1}{1}$ & questo è il numero, dal quale leuato $\frac{2}{3}$ restano $12\frac{2}{3}.$

Dub. 2. Si dimanda qual numero si può sottraere da $85.$ acciò resti $37.$ & da quel numero si può sottraere $2\frac{1}{3}$ acciò restino $\frac{3}{7}$ simili questioni si sciogliono per la sottrattione, poiche sottratti $37.$ da $85.$ restano $8.$ che sarà il numero, il quale sottratto da $85.$ restaranno $37.$ così ancora sottratto $\frac{3}{7}$ da $2\frac{1}{3}$ restara $1\frac{2}{7}$ quale è il numero del quale sottratto $2\frac{1}{3}$ restarà $\frac{3}{7}.$

Dub. 3. Si dimanda qual numero sia quello al quale giunto $38.$ facci $142.$ & qual sia quello, al quale giunto $7\frac{2}{7}$ facci $18\frac{1}{2}$ simili dubbij si sciogliono per la sottrattione.

ne,

ne, poiche sottraendo da 142. li 38. restando 104. al quale numero, giunto 38. fanno 142. di modo, che detti 104. sono il numero quesito. Così ancora sottratti $7\frac{2}{7}$ da $18\frac{1}{2}$ restano $11\frac{3}{4}$ a quale numero se si aggiunge $7\frac{2}{7}$ faranno $18\frac{1}{2}$ si che detto numero di $11\frac{3}{4}$ è il numero quesito.

Dub. 4. Si dimanda, che differentia sia fra 93. & 185. & fra $8\frac{2}{5}$ & $26\frac{1}{8}$ detti dubbij ancora si sciogliono con la sottrattione, poiche sottratti 93. da 185. restano 92. quali sono la differentia fra 93. & 185. così ancora sottratti $8\frac{2}{5}$ da $26\frac{1}{8}$ restano $18\frac{1}{4}\frac{1}{5}$ che è il numero di differentia fra $8\frac{2}{5}$ & $26\frac{1}{8}$.

Dub. 5. Si dimanda qual sia quel numero, che diuiso per 8. facci al cotiente 57. & quale quello, che diuiso per $5\frac{2}{3}$ facci al cotiente $4\frac{1}{5}$ detti dubbij si sciogliono per la multiplicatione, cioè multiplicare il detto cotiente 57. per il diuisore 8. che faranno 456. detto numero è quello, che diuiso per 8. darà al cotiente 57. così similmente multiplicati $4\frac{1}{5}$ per $5\frac{2}{3}$ summano $21\frac{5}{15}$ quali diuisi per $5\frac{2}{3}$ danno al cotiente $4\frac{1}{5}\frac{1}{3}$ cioè $4\frac{1}{15}$ si che detti $21\frac{5}{15}$ sono al numero quesito.

Dub. 6. Si dimanda qual numero contenghi $\frac{3}{7}$ di 49. & quale contenghi $\frac{3}{7}$ de $12\frac{2}{3}$ simili dubbij si sciogliono ancora con la multiplicatione, poiche multiplicati 49. per $\frac{3}{7}$ summano $21\frac{4}{7}$ cioè 21. che sono $\frac{3}{7}$ de 49. di modo, che li 21. sono il numero quesito, così ancora multiplicati $12\frac{2}{3}$ per $\frac{3}{7}$ sono $7\frac{1}{7}\frac{4}{7}$ cioè $7\frac{9}{7}$ che sono le $\frac{3}{7}$ de $12\frac{2}{3}$.

Dub. 7. Si dimanda, perche numero si possono diuidere 56. acciò sia il cotiente dodici. & perche numero si possono diuidere $\frac{4}{9}$ che dia al cotiente $\frac{3}{4}$ simili dubbij si sciogliono con la diuisione, cioè con diuidere detti numeri proposti per li cotienti assignati, v.g. diuisi 56. per 12.

70 Pratica de numeri integri, e tutti Tr. II.

daranno al cotiente $4\frac{8}{12}$ & questo è il numero, che si cercava, poiche diuisi 56. per detti $4\frac{8}{12}$ daranno al cotiente dodici, così ancora diuisi $\frac{4}{9}$ per $\frac{3}{4}$ darà al cotiente $\frac{1}{2}\frac{6}{7}$ per li quali se si diuidono detti $\frac{4}{9}$ faranno al cotiente $\frac{1}{4}\frac{0}{4}$ che è l'istesso che $\frac{3}{4}$ di modo, che detti $\frac{1}{2}\frac{6}{7}$ sono il numero, che si cercava.

Dub. 8. Si dimanda, che numero si può moltiplicare per 15. che il suo moltiplicato sia 120. è, che numero si può moltiplicare per $6\frac{2}{7}$ & il moltiplicato sia $\frac{1}{4}$ detti dubbj si sciogliono similmente cō la diuisione diuisi 120. per 15. darà al cotiente 8. & detti 8. sono il numero quesito, perche moltiplicati 8. per 15. fanno 120. così ancora diuiso $\frac{1}{4}$ per $6\frac{2}{7}$ darà al cotiente $\frac{1}{7}\frac{7}{8}$ quali sono il numero, che si dimandaua, poiche moltiplicati detti $\frac{1}{7}\frac{7}{8}$ per $6\frac{2}{7}$ darà il moltiplicato $\frac{3}{2}\frac{0}{2}$ cioè $\frac{1}{2}$ che è l'istesso.

Dub. 9. Si dimanda, quali siano due numeri, quali moltiplicati frà di se faccino 81. & quali sono quelli, che faccino $\frac{3}{4}$ ouero $15\frac{2}{3}$ detti dubbj similmente si sciogliono per la diuisione, con moltiplicare poi il diuisore, con il quale si farà la diuisione con il suo cotiente, sicche diuisi detti numeri, che si cercano, v.g. diuisi 81. per 9. darà al cotiente 9. moltiplicati detti 9. del cotiente con li 9. del diuisore, faranno 81. che sono il numero proposto, così ancora diuisi $\frac{3}{4}$ per $\frac{1}{3}$ darà al cotiente $\frac{9}{4}$ quali moltiplicati per $\frac{1}{3}$ fanno $\frac{3}{4}$ cioè $\frac{3}{4}$ & diuisi, v.g. detti $15\frac{2}{3}$ per 3. daranno al cotiente $\frac{4}{7}$ quali moltiplicati per 3. fanno $14\frac{2}{3}$ cioè $15\frac{2}{3}$.

Dub. 10. Si dimanda, quali siano quelli due numeri, che vno diuiso per l'altro diano al cotiente 24. ouero $\frac{3}{4}$ detti dubbj si sciogliono con la multiplicatione, cioè moltiplicato il già cotiente dato per qualsiuoglia numero, che detto numero insieme con detto cotiente, faranno li nu-

meri, che si dimandano, v.g. moltiplicati 24. per 4. summano 96. quali diuisi per detti 4. danno al cotiente 24. così ancora moltiplicati $\frac{3}{8}$ per $\frac{2}{7}$ summano $\frac{6}{56}$ quali diuisi a $\frac{2}{7}$ daranno al cotiente $\frac{3}{8}$ cioè $\frac{3}{8}$.

Dub. 11. Si dimanda, che numero si può moltiplicare per 6. & poi diuiso il moltiplicato per 4. facci al cotiente 5. ouero, che numero si può moltiplicare per $\frac{1}{2}$ quale poi diuiso per $\frac{2}{3}$ dia al cotiente $\frac{2}{7}$ simili dubbj si sciogliono con la multiplicatione, & diuisione, cioè moltiplicando il cotiente dato con il diuifore, similmente dato, & poi detto moltiplicato, diuiso per il numero moltiplicando, v.g. moltiplicato detto 4. per 5. fanno 20. quali diuisi per 6. darà al cotiente $3\frac{2}{3}$ che sono il numero, si dimandaua, poiche moltiplicati detti 6. per $3\frac{2}{3}$ faranno 20 cioè 20 qual diuisi per 4. daranno al cotiente 5. conforme si è dimandato; così ancora moltiplicati li $\frac{2}{7}$ diuifore dato, con le $\frac{2}{3}$ similmente cotiente dato, fanno $\frac{4}{21}$ quali diuisi per il numero moltiplicante $\frac{1}{2}$ fanno $\frac{8}{21}$ che è il numero si dimanda, poiche moltiplicati detti $\frac{8}{21}$ per $\frac{1}{2}$ sono $\frac{8}{42}$ cioè $\frac{4}{21}$ quali diuisi per $\frac{2}{3}$ danno al cotiente $\frac{1}{2}$ cioè $\frac{1}{2}$ conforme si dimanda.

Dub. 12. Così ancora si se dicesse, che numero si può moltiplicare per 12. quale poi diuiso per 9. dia al cotiente 8. ouero, che numero si potria moltiplicare per $\frac{3}{4}$ quale poi diuiso per $\frac{2}{3}$ desse al cotiente $\frac{1}{7}$ si moltiplica, come si è detto il dato numero diuifore 9. con il dato cotiente 8. che fanno 72. quali diuisi per li 12. numero moltiplicante daranno al cotiente 6. quale è il numero, che si dimandaua, poiche moltiplicati detti 6. per 12. fanno 72. quali diuisi per 9. daranno al cotiente 8. così ancora moltiplicato li $\frac{2}{3}$ diuifore dato per $\frac{1}{7}$ cotiente similmente dato faranno $\frac{2}{21}$ quali diuisi per il numero moltiplicando $\frac{3}{4}$ da-

72 Pratica de numeri integri, e rotti Tr. II.

daranno al cotiente $\frac{8}{6}$ quale è il numero, che si dimanda, poiche multiplicati detti $\frac{8}{6}$ per $\frac{3}{4}$ faranno $\frac{24}{4}$ cioè $\frac{2}{1}$ quali diuisi per $\frac{2}{3}$ faranno $\frac{6}{1}$ cioè $\frac{1}{1}$.

Dub. 13. Si dimanda, otto, che parte sia di questo numero 62 ouero quale parte siano le $\frac{2}{7}$ de $\frac{2}{3}$ simili dubbj si sciogliono per la diuisione, poiche diuisi 62 per 8. daranno al cotiente $7\frac{6}{8}$ di modo, che 8. sono la settima parte, & sei ottauae del numero 62. così ancora diuisi $\frac{2}{7}$ per $\frac{2}{3}$ darà al cotiente $\frac{6}{14}$ si che dette $\frac{2}{7}$ sono sei quattredecime di questo numero $\frac{2}{3}$ ouero possiamo dire in minori numeri $\frac{3}{7}$ cioè, che dette $\frac{2}{7}$ siano $\frac{3}{7}$ di questo numero $\frac{2}{3}$ di modo, che $\frac{2}{7}$ contengono $\frac{3}{7}$ di questo numero $\frac{2}{3}$ è, che ciò sia vero, multiplicato il cotiente $\frac{3}{7}$ con il diuifore $\frac{2}{3}$ darà vera operatione, poiche summano $\frac{6}{21}$ cioè $\frac{2}{7}$.

Dub. 14. Si dimanda questo numero 7. di che numero sarà la nona parte, ouero $\frac{3}{4}$ de che numero contenerà $\frac{1}{5}$ & $\frac{3}{7}$ & di quale contenerà $\frac{2}{3}$ detti dubbj si sciogliono con la diuisione, poiche diuisi 7. per vna parte, cioè per $\frac{1}{5}$ darà al cotiente $6\frac{3}{5}$ di modo, che 7. sono la nona parte de 63. similmente diuisi $\frac{3}{4}$ per $\frac{1}{5}$ darà al cotiente $2\frac{1}{4}$ di modo, che $\frac{3}{4}$ faranno $\frac{1}{4}$ di $2\frac{1}{4}$ così ancora diuisi $\frac{3}{7}$ per $\frac{2}{3}$ daranno al cotiente $\frac{9}{14}$ si che $\frac{3}{7}$ sono $\frac{2}{3}$ de $\frac{9}{14}$.

Dub. 15. Si dimanda 8. quante noue parte contiene di vno numero integro, così ancora $\frac{2}{3}$ quante ottauae partitene di vno integro. Et $\frac{1}{4}$ quante decime tiene di vno integro. Detti dubbj si sciogliono con la multiplicatione, si che multiplicati 8. per 9. summano 72. di modo, che 8. sono la nona parte de 72. multiplicati poi $\frac{2}{3}$ per 8. faranno $\frac{16}{3}$ cioè $5\frac{1}{3}$ il numero dunque $\frac{2}{3}$ contengono $\frac{1}{3}$ & $\frac{1}{3}$ de vno integro, & sia vero, diuisi $5\frac{1}{3}$ per 8. daranno al cotiente $\frac{16}{64}$ cioè $\frac{1}{4}$ così ancora multiplicato $\frac{1}{4}$ per 10. faranno $\frac{10}{4}$ cioè $2\frac{1}{2}$ si che $\frac{1}{4}$ contiene due decime, & vno di

midio da vno intero, & che sia vero diuisi $2\frac{1}{2}$ per 10. faranno al cotiente $\frac{1}{2}$, cioè $\frac{1}{2}$.

TRATTATO TERZO della Regola del Tre.

Della Regola del Tre, come si facci.

Cap. I.

Essendo già detto di tutte le sorte de numeri, al presente diremo di molte regole, nelle quali scorge-remo le gr in virtù, che contengono in se detti numeri, & la prima di dette regole, è quella del Tre, la virtù della quale è tanto grande, che viene chiamata dalli Aritmetici, regola Aurea, cioè regola d'oro, & viene similmente chiamata, regola de proportioni, poiche in essa si pigliano tre numeri noti, dalli quali si caua il quarto non noto con debita proportionione, cioè, che quell'istessa proportionione, che è fra il primo, & secondo numero, sia ancora fra il terzo, & quarto.

Detti numeri noti se dispongono in questo modo; nel terzo loco si pone quel numero, che porta in se la difficoltà, & nel primo loco si pone il suo simile, e nel secondo loco si pone l'altro numero, alla somiglianza del quale si ha da cauare il quarto, conforme il tutto se dichiarirà con esem. ij. v. g. si è spejo da qualcheduno giulij 25. in sei libbre di pepe, quanto dunque ne haueria hauuto per giulij 100. doue si vede, che li 100. portano con se la difficoltà, & però si hanno da porre nel terzo loco, il suo simile sono li 25. quali si hanno da porre nel primo loco, &

E nel

nel secondo le libre di pepe, & il simile di detto secondo si hà da cauare per il quarto loco, conforme vedi messo in questo esempio.

| Giulij | Libre | Giulij | Libre |
|--------|-------|--------|-------|
| 25 | 6 | 100 | 24 |

Per ritrouare detto quarto numero, se multiplica il secondo, con il terzo frà di se, & il multiplicato si diuide al primo; come in detto esempio multiplicati li 100. per 6. summano 600. quali diuisi à 25. renderà nel cotiente 24. che si pone per 4. numero, doue si vede parimente, che quella proportionone, che è frà il primo, & secondo, sia ancora nel terzo, & quarto, poiche quattro volte cape il 6. in 25. & quattro volte ancora cape il 24 in 100. come si vede similmente nel seguente esempio.

E vno forastiero, che hà speso scuti 95. in 7. mesi nell'alloggiamento, e perche è necessitato starci altri mesi 16. dimanda quanti scuti gli bisognano; doue vedi, che li 16. portano la difficultà, & però si hanno da porre nel 3. loco, & il 7. suo simile nel primo, & il 95. nel 2. in questo modo.

| Mesi | Scuti | Mesi | Scuti |
|------|-------|------|-------|
| 7 | 95 | 16 | 217½ |

Doue si vede parimente, che quell'istessa proportionone, che è frà il primo, & secōdo sia ancora frà il 3. & 4. & la regola per cognoscere si sono giuste dette proportioni, & si è ben fatta l'operatione, si può multiplicare il primo numero con il 4. & con il 2. & con il 3. che tutti due numeri multiplicati faranno eguali.

Da altri ancora viene fatta la proua in questo modo, cioè pongono il primo numero nel 3. loco, & il numero del 3. nel primo loco, così ancora il 4. nel 2. loco, & il 2. nel 4. & operando conforme la regola, renderanno li numeri dell'istessa maniera, se non vi è errore, v.g. il sopradetto esempio si porria in questo modo.

| Mesi | Scuti | Mesi | Scuti |
|------|-------------------|------|-------|
| 16 | 217 $\frac{1}{2}$ | 7 | 95 |

Mà è da aduertire, che molte volte li esempi da decidersi per detta regola del Tre si propongono al riuerso, come v.g. vno hà comprato sei libre di cannella per giulij 25. quanto viene la libra? detto esempio si pone in questo modo.

| Libre | Giulij | Libra | Giulij |
|-------|--------|-------|-----------------|
| 6 | 25 | 1 | 4 $\frac{1}{2}$ |

Ouero vno hà comprato trenta libre di Zuccaro per dieci scuti, quanto viene vna libra? in simili esempi è necessario ridurre detti scuti à giulij, ouero à baiocchi per facilitare l'operatione, di modo, che detto esempio staria in questo modo.

| Libre | Giulij | Libra | Giulij |
|-------|--------|-------|-----------------|
| 30 | 100 | 1 | 3 $\frac{1}{2}$ |

In detti esempi si opera similmente dell'istesso modo, cioè, se moltiplica il 2. con il 3. & detto moltiplicato se diuide al primo, & si caua il 4. con l'istesse proportioni come di sopra.

Così ancora vi è uno Mercante, che hà comprato

E 2 250

250. Canne di drappo per scuti 380. desidera sapere quanto gli viene la canna, detto esempio per facilitarlo, si deuono ridurre li scuti in giulij, & poi si pone l'esempio in questo modo.

| Canne | Giulij | Canne | Giulij |
|-------|--------|-------|------------------|
| 250 | 3800 | 1 | 15 $\frac{1}{4}$ |

Suole occorre qualche esempio, non solo con diuersità di moneta, ma ancora di peso; all' hora similmente si deuere ridurre non solo la moneta, ma ancora il peso ad vn' istessa qualità di moneta, & peso, come v.g. vno Mercante ha speso scuti 55. & giulij 6. in libre 60. de Cannella, & onze 5. desidera sapere quanto viene l'oncia, in detto esempio per più facilità bisogna ridurre tutti li scuti, & giulij in baiocchi, & le libre in onze, che detto esempio si porria in questo modo.

| Onze | Baiocchi | Onza | Baiocchi |
|------|----------|------|--|
| 725 | 5560 | 1 | 7 $\frac{4}{7}$ $\frac{5}{2}$ cioè $\frac{97}{14}$ |

Similmente vi è vno forastiero, che ha dato scuti 40 $\frac{3}{4}$ per suo vitto all'alloggiamento, & doppo giorni 58. gli viene detto, che dia più denari, si vuole più vitto, desidera sapere, quanto ha hauuto de vitto il giorno, quui ancora ridotti li scuti a giulij, si pone l'esempio a questo modo.

| Giorni | Giulij | Giorno | Giulij |
|--------|--------|--------|--------|
| 58 | 406 | 1 | 7 |

L'istessa regola si osserua occorrendo esempio de minuria, operando però conforme si deue operare in dette minurie, il che già habbiamo detto nel secondo trattato, si
cha

che se uno hauesse comprato $\frac{2}{3}$ di canna di drappo d'oro scuti 3. quanto haueria speso in $\frac{7}{8}$ dell'istesso drappo, detto esemplo si porra in questo modo.

| | | | |
|---|-------|---|------------------------|
| 2 | Scuti | 7 | 63 |
| 3 | 3 | 8 | 16 cioè $3\frac{1}{2}$ |

Così ancora hà da mantenere uno padre di famiglia, il suo figlio nell' Studij per anni 5. & doppo mesi 8. & giorni 12. vede hauere speso scuti 65. & giulij 6. desidera sapere, quanto vorrà di spesa in anni 5. in detto esemplo se riducono prima tutti li scuti in giulij, ò à baiocchi, & li mesi, & anni in giorni, & poi si porra l'esemplo in questo modo, supponendo 5. anni essere giorni 1825. & li scuti sono giulij 656. se dice dunque.

| | | | |
|--------|--------|--------|--------------------|
| Giorni | Giulij | Giorni | Giulij |
| 252 | 656 | 1825 | 4721 $\frac{1}{2}$ |

Dico de più si sono venduto canne 520. di tela per scuti 75. quanto si sariano venduto canne 400. & detto esemplo si pone in questo modo.

| | | | |
|-------|-------|-------|---------------------------------------|
| Canne | Scuti | Canne | Scuti |
| 520 | 75 | 400 | 57 $\frac{3}{4}$ cioè $57\frac{3}{4}$ |

Quero diciamo, si detto Mercante hà comprato canne 520. di tela per scuti 75. quante ne haueria hauuto per scuti 100. detto esemplo si pone in questo modo.

| | | | |
|-------|-------|-------|---|
| Scuti | Canne | Scuti | Canne |
| 75 | 520 | 100 | 693 $\frac{3}{4}$ cioè $693\frac{3}{4}$ |
| | | E 3 | Così |

Così ancora Pietro ha comprato da Antonio scuti 75. di tela, & dell'istessa tela Francesco, ne ha comprato da Antonio scuti 100. & ne ha hauuto canne 130 $\frac{1}{2}$ quante dunque ne hauerà hauuto Pietro per scuti 75.

| Scuti | Canne | Scuti | Canne |
|-------|-------------------|-------|-------|
| 100 | 133 $\frac{1}{2}$ | 75 | 100 |

E si se desiderasse sapere, quanto viene la canna di detta tela; riducendo li scuti a giulij, si porria detto esemplo a questo modo.

| Canne | Giulij | Canna | Giulij |
|-------------------|--------|-------|-----------------|
| 133 $\frac{1}{2}$ | 1000 | 1 | 7 $\frac{1}{2}$ |
| Canne | Giulij | Canna | Giulij |
| 100 | 750 | 1 | 7 $\frac{1}{2}$ |

Da tutti detti esempj si può la persona regolare, & cauare il modo si deue tenere in tutte l'altri esempj.

Regola del Tre euerfa. Cap. II.

SIn' adesso habbiamo esplicato la regola del Tre, con dire, che in detta regola bisogna che sia la debita proportionone frà li quattro numeri, di modo, che quella proportionone, e frà il primo, & 2. sino frà il 3. & 4. & se il primo è maggiore, o minore del 3. così sia similmente il 2. rispetto al 4. ma per li molte volte accade, che quanto è più maggiore il primo del 3. tanto più minore deue essere il 2. del 4. però se è trouata, quasi'altra regola del Tre euerfa, che uol dire donersi procedere al contrario, di

di quello si è fatto nella prima, poiche si hà da multiplicare il primo numero con il 2. & il muloiplicato deuiderfi al 3. il coriente del quale sarà il 4. numero, quando poi si habbia da usare detta regola, l' istessa ragione naturale lo detta, & dall' infrascritti esempj si cauerà benissimo.

Dodeci canne di drappo largo tre palmi è stato giudicato volerci per uno apparato, quante canne ci vorranno de vn' altro drappo largo due palmi, & quante se fosse due palmi, & mezzo, detti esempj si pongono in questo modo.

| Larghezza palmi | Canne | Larghezza palmi | Canne |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 3 | 12 | 2½ | 14½ |
| Item | | | |
| Larghezza palmi | Canne | Larghezza palmi | Canne |
| 3 | 12 | 2 | 18 |

Nelli quali esempj si vede, che quanto più largo è il drappo, tanto meno robba ci vuole, & così, benchè il primo numero sia maggiore del 3. non per questo il 2. è maggiore del 4. mà si bene si vede, che quella proportionè è fra il primo, & 3. è similmente fra il 2. & 4. & però se multiplica il primo con il 2. & il moltiplicato se deuide al 3. mà volendo multiplicare detti esempj, conforme la prima regola, veneriano in questo modo.

| Larghezza de palmi | Larghezza de palmi | Cane | Cane |
|--------------------|--------------------|------|------|
| 2 | 3 | 12 | 18 |

La prona similmente di questa regola è multiplicare il primo con il 3. & il 3. con il 4. che daranno l' istesso numero.

80 **Regola del Tre euerſa Trat. III.**

Pietro hà dato a Fràſceſco ſcuti 2500. per impreſto per due anni, quali finiti furno reſtituti con l'interèſſe debito; mà Pietro non voſſe detto interèſſe, dicendo volerne vna ſumma de danaro impreſto & gli furno dati da Fràſceſco ſcuti 6000. ſe dimanda per quanto tempo ſi può ſeruire Pietro di detti denari per faſi buono il ſuo interèſſe? ridotti li anni a giorni, ſi pone l'eſempio a queſto modo.

| Scuti | Giorni | Scuti | Giorni |
|-------|--------|-------|--|
| 2500 | 730 | 6000 | $304\frac{1}{8}\% \%$ cioè $\frac{1}{8}$ |

Donc ſi vede, che quanto è più groſſa la ſumma de denari, tanto meno tempo biſogna tenerlo, & volendo operare detto eſempio, conforme la prima regola diretta, ſi porria in queſto modo.

| Scuti | Scuti | Giorni | Giorni |
|-------|-------|--------|--|
| 2500 | 6000 | 730 | $304\frac{1}{8}\% \%$ cioè $\frac{1}{8}$ |

A giudicio di Architetto con la fatica di trenta huomini in due anni, ſi può condurre vno canale d'acqua dentro la terra; ſi dimanda in quanto tempo ſe condurrà con la fatica de 50. huomini? detto eſempio ſi pone in queſto modo.

| Huomini | Giorni | Huomini | Giorni |
|---------|--------|---------|--------|
| 30 | 730 | 50 | 438 |

Vi è ordine, che quando il grano coſta ſei ſcuti il rubio, ſi debbia fare la pagnotta de onze 10. & andarla creſcendo, ò minuendo, conforme creſcerà, ò mancherà il prezzo del grano, poniamo, che il grano vadi ſcuti quattro

tro, quante dene essere la pagnotta.

| Scuti | Onze | Scuti | Onze |
|-------|------|-------|------|
| 6 | 10 | 4 | 15 |

Et valendo il grano scuti 8. si fa in questo modo:

| Scuti | Onze | Scuti | Onze |
|-------|------|-------|-----------------|
| 6 | 10 | 8 | 7 $\frac{1}{2}$ |

Così ancora andando il vino scuti 10. la botta, la foglietta debbia essere grossa de 6. bicchieri; se dimanda, andando il vino scuti 12. quanto sarà la foglietta.

| Scuti | Bicchieri | Scuti | Bicchieri |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 10 | 6 | 12 | 5 |

Vi sono Soldati 3000. in vn' assedio di vna fortezza, & hanno il vitto per mesi 7. & gli è data nona, che per mesi 12. non possono hauere soccorso; quanti Soldati si hanno da tenere nell' assedio, acciò il vitto basti per 12. mesi.

| Mesi | Soldati | Mesi | Soldati |
|------|---------|------|---------|
| 7 | 3000. | 12 | 1750. |

Si deuono dunque tenere Soldati 1750. & altri 1250. licenciarli, da quali esempi, si vede la natura di detta regola, & il modo di usarla.

Regola del Tre Composita.

Cap. III.

Perche suole accadere, che in detta regola del Tre, si propongono non solo tre numeri certi, ma a detti vi sono aggiunti altri tre numeri; per il che detta regola uiene chiamata composta, poiche messi detti 3. numeri composti, si caua il 4. numero, conforme si vedrà nell' infrascritti esempj, & si propongono con diuersità di tempo, di guadagno, & danno, come v. g.

Si pagano scuti 9. al mese per Soldato di qualche fortezza, si dimanda, quanti scuti ci vorranno per Soldati 50. in vn' anno? detto esempio si pone in questo modo.

| Soldato | Mese | Scuti | Soldati | Mesi | Scuti |
|---------|------|-------|---------|------|-------|
| 1 | 1 | 9 | 50 | 12 | 5400 |

Donc è da aduertire, che questa regola composta nelli esempj, ò si può fare, la regola ordinaria del Tre due, ò tre volte; ouero moltiplicare il numero principale con il numero aggiunto, & poi formare detta regola come nel sopra detto esempio si farria in questo modo.

| Soldato | Scuti | Soldati | Scuti |
|---------|-------|---------|-------|
| 1 | 9 | 50 | 450 |
| Dipoi | | | |
| Mese | Scuti | Mesi | Scuti |
| 1 | 450 | 12 | 5400 |

Nondimeno più breue sarà moltiplicare li due primi numeri fra di se, & il simile fare con li due terzi, di modo.

Regola del Tre composta Tr. III. 83.
do che detta regola verria in questo modo.

| | | |
|-------|-----|-------|
| Scuti | | Scuti |
| 1 | 600 | 3400 |
| 2 | | |

Due moltiplicato il primo numero con il 4. fa l'istessa somma, che moltiplicando il 2. con il 3.

Si sono portate dal procaccio libre 50. per 100. miglia con prezzo de giulij 12. quanto si pagara per libre 120. & per miglia 250. detto esempio si pone in questo modo.

| | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Libre | Miglia | Giulij | Libre | Miglia | Giulij |
| 50 | 100 | 12 | 120 | 250 | 72 |

Moltiplicati li primi numeri fra di se, & li terzi similmente, quale moltiplicato del 3. moltiplicato per il 2. numero, & diviso al primo, verria in questo modo.

| | | |
|--------|----|--------|
| Giulij | | Giulij |
| 5000 | 12 | 30000 |
| | | 72 |

Overo si fa la regola del 3. duplicata in questo modo?

| | | | |
|-------|--------|-------|------------------|
| Libre | Giulij | Libre | Giulij |
| 50 | 12 | 120 | 28 $\frac{4}{5}$ |

| | | | | |
|-------|--------|------------------|--------|--------|
| Dipoi | Miglia | Giulij | Miglia | Giulij |
| | 100 | 28 $\frac{4}{5}$ | 250 | 72 |

Sono 30. Religiosi, quali in un' anno mangiano 60. rubbij di grano comprati scuti 360. se dimanda quanto ciascheduno habbia mangiato il giorno? in detto esempio

pio

72 Pratica de numeri integri, e rotti Tr. II.

daranno al cotiente $\frac{8}{3}$ quale è il numero, che si dimanda, poiche multiplicati detti $\frac{8}{3}$ per $\frac{3}{4}$ faranno $\frac{2}{1}$ cioè $\frac{2}{1}$ quali diuisi per $\frac{2}{3}$ faranno $\frac{3}{2}$ cioè $\frac{3}{2}$.

Dub. 13. Si dimanda, otto, che parte sia di questo numero 62 ouero quale parte siano le $\frac{2}{7}$ de $\frac{2}{3}$ simili dubbj si sciolgono per la diuisione, poiche diuisi 62 per 8. daranno al cotiente $7\frac{6}{8}$ di modo, che 8. sono la settima parte, & sei ottaue del numero 62. così ancora diuisi $\frac{2}{7}$ per $\frac{2}{3}$ darà al cotiente $\frac{6}{7}$ si che dette $\frac{2}{7}$ sono sei quattredime di questo numero $\frac{2}{3}$ ouero possiamo dire in minori numeri $\frac{3}{7}$ cioè, che dette $\frac{2}{7}$ siano $\frac{3}{7}$ di questo numero $\frac{2}{3}$ di modo, che $\frac{2}{7}$ contengono $\frac{3}{7}$ di questo numero $\frac{2}{3}$ è, che ciò sia vero, multiplicato il cotiente $\frac{3}{7}$ con il diuifore $\frac{2}{3}$ darà vera operatione, poiche summano $\frac{6}{7}$ cioè $\frac{6}{7}$.

Dub. 14. Si dimanda questo numero 7. di che numero sarà la nona parte, ouero $\frac{3}{4}$ de che numero contenerà $\frac{1}{4}$ & $\frac{3}{4}$ & di quale contenerà $\frac{2}{3}$ detti dubbj si sciolgono con la diuisione, poiche diuisi 7. per vna parte, cioè per $\frac{1}{6}$ darà al cotiente $6\frac{3}{4}$ di modo, che 7. sono la nona parte de 63. similmente diuisi $\frac{3}{4}$ per $\frac{1}{3}$ darà al cotiente $2\frac{1}{4}$ di modo, che $\frac{3}{4}$ faranno $\frac{1}{4}$ di $2\frac{1}{4}$ così ancora diuisi $\frac{3}{4}$ per $\frac{2}{3}$ daranno al cotiente $\frac{9}{4}$ si che $\frac{3}{4}$ sono $\frac{2}{3}$ de $\frac{9}{4}$.

Dub. 15. Si dimanda 8. quante noue parte contiene di vno numero integro, così ancora $\frac{2}{3}$ quante ottaue partit tiene di vno integro. Et $\frac{1}{4}$ quante decime tiene di vno integro. Detti dubbj si sciolgono con la multiplicatione, si che multiplicati 8. per 9. summano 72. di modo, che 8. sono la nona parte de 72. multiplicati poi $\frac{2}{3}$ per 8. faranno $\frac{1}{3}$ cioè $5\frac{1}{3}$ il numero dunque $\frac{2}{3}$ contengono $\frac{1}{3}$ & $\frac{1}{3}$ de vno integro, & sia vero, diuisi $5\frac{1}{3}$ per 8. daranno al cotiente $\frac{1}{2}$ cioè $\frac{2}{4}$ così ancora multiplicato $\frac{1}{4}$ per 10. faranno $\frac{1}{2}$ cioè $2\frac{1}{2}$ si che $\frac{1}{4}$ contiene due decime, & vno di-

midio da vno intero, & che sia vero diuisi $2\frac{1}{2}$ per 10. faranno al cotiente $\frac{1}{2}$, cioè $\frac{1}{2}$.

TRATTATO TERZO della Regola del Tre.

Della Regola del Tre, come si facci.

Cap. I.

Essendo già detto di tutte le sorte de numeri, al presente diremo di molte regole, nelle quali scorge-remo le gran virtù, che contengono in se detti numeri, & la prima di dette regole, è quella del Tre, la virtù della quale è tanto grande, che viene chiamata dalli Aritmetici, regola Aurea, cioè regola d'oro, & viene similmente chiamata, regola de proportioni, poiche in essa si pigliano tre numeri noti, dalli quali si caua il quarto non noto con debita proportionione, cioè, che quell'istessa proportionione, che è fra il primo, & secondo numero, sia ancora fra il terzo, & quarto.

Detti numeri noti se dispongono in questo modo; nel terzo loco si pone quel numero, che porta in se la difficoltà, & nel primo loco si pone il suo simile, e nel secondo loco si pone l'altro numero, alla somiglianza del quale si ha da cauare il quarto, conforme il tutto se dichiarirà con esem. ij. v. g. si è spejo da qualcheduno giulij 25. in sei libbre di pepe, quanto dunque ne haueria hauuto per giulij 100. doue si vede, che li 100. portano con se la difficoltà, & però si hanno da porre nel terzo loco, il suo simile sono li 25. quali si hanno da porre nel primo loco, &

E nel

nel secondo le libbre di pepe, & il simile di detto secondo si hà da cauare per il quarto loco, conforme vedi messo in questo esempio.

| Giulij | Libre | Giulij | Libre |
|--------|-------|--------|-------|
| 25 | 6 | 100 | 24 |

Per ritrouare detto quarto numero, se multiplica il secondo, con il terzo frà di se, & il multiplicato si diuide al primo; come in detto esempio multiplicati li 100. per 6. summano 600. quali diuisi à 25. renderà nel cotiente 24. che si pone per 4. numero, doue si vede parimente, che quella proportionone, che è frà il primo, & secondo, sia ancora nel terzo, & quarto, poiche quattro volte cape il 6. in 25. & quattro volte ancora cape il 24 in 100. come si vede similmente nel seguente esempio.

E vno forastiero, che hà speso scuti 95. in 7. mesi nell'alloggiamento, e perche è necessitato starci altri mesi 16. dimanda quanti scuti gli bisognano; doue vedi, che li 16. portano la difficoltà, & però si hanno da porre nel 3. loco, & il 7. suo simile nel primo, & il 95. nel 2. in questo modo.

| Mesi | Scuti | Mesi | Scuti |
|------|-------|------|-------|
| 7 | 95 | 16 | 217½ |

Doue si vede parimente, che quell'istessa proportionone, che è frà il primo, & secòdo sia ancora frà il 3. & 4. & la regola per cognoscere si sono giuste dette proportioni, & si è ben fatta l'operatione, si può multiplicare il primo numero con il 4. & con il 2. & con il 3. che tutti due numeri multiplicati faranno eguali.

Da altri ancora viene fatta la proua in questo modo, cioè pongono il primo numero nel 3. loco, & il numero del 3. nel primo loco, così ancora il 4. nel 2. loco, & il 2. nel 4. & operando conforme la regola, renderanno li numeri dell'istessa maniera, se non vi è errore, v.g. il sopradetto esempio si porria in questo modo.

| Mesi | Scuti | Mesi | Scuti |
|------|-------------------|------|-------|
| 16 | 217 $\frac{1}{2}$ | 7 | 95 |

Mà è da aduertire, che molte volte li esempi da decidersi per detta regola del Tre si propongono al riuerso, come v.g. vno hà comprato sei libre di cannella per giulij 25. quanto viene la libra? detto esempio si pone in questo modo.

| Libre | Giulij | Libra | Giulij |
|-------|--------|-------|-----------------|
| 6 | 25 | 1 | 4 $\frac{1}{2}$ |

Ouero vno hà comprato trenta libre di Zuccaro per dieci scuti, quanto viene vna libra? in simili esempi è necessario ridurre detti scuti à giulij, ouero à baiocchi per facilitare l'operatione, di modo che detto esempio stia in questo modo.

| Libre | Giulij | Libra | Giulij |
|-------|--------|-------|-----------------|
| 30 | 100 | 1 | 3 $\frac{1}{2}$ |

In detti esempi si opera similmente dell'istesso modo, cioè, se moltiplica il 2. con il 3. & detto moltiplicato se diuide al primo, & si caua il 4. con l'istesse proportioni come di sopra.

Così ancora vi è vno Mercante, che hà comprato

E 2 250

250. Canne di drappo per scuti 380. desidera sapere quanto gli viene la canna, detto esempio per facilitarlo, si deuono ridurre li scuti in giulij, & poi si pone l'esempio in questo modo.

| Canne | Giulij | Canne | Giulij |
|-------|--------|-------|-----------------|
| 250 | 3800 | 1 | $15\frac{1}{2}$ |

Suole occorre qualche esempio, non solo con diuersità di moneta, mà ancora di peso; all' hora similmente si deuere ridurre non solo la moneta, mà ancora il peso ad vn' istessa qualità di moneta, & peso, come v.g. vno Mercante hà speso scuti 55. & giulij 6. in libre 60. de Cannella, & onze 5. desidera sapere quanto viene l'oncia in detto esempio per più facilità bisogna ridurre tutti li scuti, & giulij in baiocchi, & le libre in onze, che detto esempio si porria in questo modo.

| Onze | Baiocchi | Onza | Baiocchi |
|------|----------|------|--|
| 725 | 5560 | 1 | $7\frac{4}{7}\frac{8}{7}\frac{5}{7}$ cioè $\frac{97}{147}$ |

Similmente vi è vno forastiero, che hà dato scuti 40³ per suo vitto all'alloggiamento, & doppo giorni 58. gli viene detto, che dia più denari, si vuole più vitto, desidera sapere, quanto hà hauuto de vitto il giorno, quui ancora ridotti li scuti a giulij, si pone l'esempio a questo modo.

| Giorni | Giulij | Giorno | Giulij |
|--------|--------|--------|--------|
| 58 | 406 | 1 | 7 |

L'istessa regola si osserua occorrendo esempio de minutia, operando però conforme si deue operare in dette minutie, il che già habbiamo detto nel secondo trattato, si
cha

che se vno hauesse comprato $\frac{3}{7}$ di canna di drappo d'oro scuti 3. quanto baueria speso in $\frac{7}{7}$ dell'istesso drappo, detto esemplo si porra in questo modo.

| | | | |
|---|-------|---|------------------------|
| 2 | Scuti | 7 | 63 |
| 3 | 3 | 8 | 16 cioè $3\frac{1}{2}$ |

Così ancora hà da mantenere vno padre di famiglia, il suo figliu nelli studi per anni 5. & doppo mesi 8. & giorni 12. vede hauere speso scuti 65. & giulij 6. desidera sapere, quanto vorrà di spesa in anni 5. in detto esemplo se riducono prima tutti li scuti in giulij, ò à baiocchi, & li mesi, & anni in giorni, & poi si porra l'esemplo in questo modo, supponendo 5. anni essere giorni 1825. & li scuti sono giulij 656. se dice dunque.

| | | | |
|--------|--------|--------|--------------------|
| Giorni | Giulij | Giorni | Giulij |
| 252 | 656 | 1825 | 4721 $\frac{1}{2}$ |

Dico de più si sono venduto canne 520. di tela per scuti 75. quanto si fariano venduto canne 400. & detto esemplo si pone in questo modo.

| | | | |
|-------|-------|-------|---------------------------------------|
| Canne | Scuti | Canne | Scuti |
| 520 | 75 | 400 | 57 $\frac{3}{4}$ cioè $57\frac{3}{4}$ |

Quero diciamo, si detto Mercante hà comprato canne 520. di tela per scuti 75. quante ne baueria hauuto per scuti 100. detto esemplo si pone in questo modo.

| | | | |
|-------|-------|-------|---|
| Scuti | Canne | Scuti | Canne |
| 75 | 520 | 100 | 693 $\frac{2}{3}$ cioè $693\frac{2}{3}$ |
| | | E 3 | Così |

Così ancora Pietro ha comprato da Antonio scuti 75. di tela, & dell'istessa tela Francesco, ne ha comprato da Antonio scuti 100. & ne ha hauuto canne 130 $\frac{1}{2}$ quante dunque ne hauera hauuto Pietro per scuti 75.

| Scuti | Canne | Scuti | Canne |
|-------|-------------------|-------|-------|
| 100 | 133 $\frac{1}{2}$ | 75 | 100 |

E si se desiderasse sapere, quanto viene la canna di detta tela; riducendo li scuti a giulij, si porria detto esemplo a questo modo.

| Canne | Giulij | Canna | Giulij |
|-------------------|--------|-------|-----------------|
| 133 $\frac{1}{2}$ | 1000 | 1 | 7 $\frac{1}{2}$ |
| ouero | | | |
| Canne | Giulij | Canna | Giulij |
| 100 | 750 | 1 | 7 $\frac{1}{2}$ |

Da tutti detti esempj si può la persona regolare, & cauare il modo si deue tenere in tutte l'altri esempj.

Regola del Tre euerfa. Cap. II.

SIn' adesso habbiamo esplicato la regola del Tre, con dire, che in detta regola bisogna che sia la debita proportionone fra li quattro numeri, di modo, che quella proportionone, e fra il primo, & 2. sino fra il 3. & 4. & se il primo è maggiore, o minore del 3. così sia similmente il 2. rispetto al 4. ma per l e molte volte accade, che quanto è più maggiore il primo del 3. tanto più minore deue essere il 2. del 4. però si è trouata, quasi'altra regola del Tre euerfa, che vuol dire donersi procedere al contrario,

di quello si è fatto nella prima, poiche si hà da multiplicare il primo numero con il 2. & il muloiplicato deuiderfi al 3. il cotiente del quale sarà il 4. numero, quando poi si habbia da usare detta regola, l' istessa raggione naturale lo detta, & dall' infra scritti esempj si cauerà benissimo.

Dodeci canne di drappo largo tre palmi è stato giudicato volerci per uno apparato, quante canne ci vorranno de vn' altro drappo largo due palmi, & quante se fosse due palmi, & mezzo, detti esempj si pongono in questo modo.

| Larghezza palmi | Canne | Larghezza palmi | Canne |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 3 | 12 | 2½ | 14½ |
| Item | | | |
| Larghezza palmi | Canne | Larghezza palmi | Canne |
| 3 | 12 | 2 | 18 |

Nelli quali esempj si vede, che quanto più largo è il drappo, tanto meno robba ci vuole, & così, benchè il primo numero sia maggiore del 3. non per questo il 2. è maggiore del 4. mà si bene si vede, che quella proportionè è fra il primo, & 3. è similmente fra il 2. & 4. & però se moltiplica il primo con il 2. & il moltiplicato se deuide al 3. mà volendo moltiplicare detti esempj, conforme la prima regola, veneriano in questo modo.

| Larghezza de palmi | Larghezza de palmi | Cāne | Cāne |
|--------------------|--------------------|------|------|
| 2 | 3 | 12 | 18 |

La prona similmente di questa regola è moltiplicare il primo con il 3. & il 3. con il 4. che daranno l'istesso numero.

80 Regola del Tre euerfa Trar. III.

Pietro hà dato a Fràncesco scuti 2500. per impreſto per due anni, quali finiti furno reſtituti con l'interſſe debito; mà Pietro non volſe detto interſſe, dicendo volerne una ſumma de danaro impreſto & gli furno dati da Fràncesco ſcuti 6000. ſe dimanda per quanto tempo ſi può ſervire Pietro di detti denari per faſi buono il ſuo interſſe & ridotti li anni a giorni, ſi pone l'eſempio a queſto modo.

| Scuti | Giorni | Scuti | Giorni |
|-------|--------|-------|--------------------------------------|
| 2500 | 730 | 6000 | 304 $\frac{1}{8}$ cioè $\frac{1}{8}$ |

Donc ſi vede, che quanto è più groſſa la ſumma de denari, tanto meno tempo biſogna tenerlo, & volendo operare detto eſempio, conforme la prima regola diretta, ſi porria in queſto modo.

| Scuti | Scuti | Giorni | Giorni |
|-------|-------|--------|--------------------------------------|
| 2500 | 6000 | 730 | 304 $\frac{1}{8}$ cioè $\frac{1}{8}$ |

A giudicio di Architetto con la fatica di trenta huomini in due anni, ſi può condurre uno canale d'acqua dentro la terra; ſi dimanda in quanto tempo ſe condurrà con la fatica de 50. huomini? detto eſempio ſi pone in queſto modo.

| Huomini | Giorni | Huomini | Giorni |
|---------|--------|---------|--------|
| 30 | 730 | 50 | 438 |

Vi è ordine, che quando il grano coſta ſei ſcuti il rubio, ſi debbia fare la pagnotta de onze 10. & andarla creſcendo, o minueno, conforme creſcerà, o mancherà il prezzo del grano, poniamo, che il grano vadi ſcuti i quattro

tro, quante deue essere la pagnotta.

| Scuti | Onze | Scuti | Onze |
|-------|------|-------|------|
| 6 | 10 | 4 | 15 |

Et valendo il grano scuti 8. si fa in questo modo.

| Scuti | Onze | Scuti | Onze |
|-------|------|-------|-----------------|
| 6 | 10 | 8 | 7 $\frac{1}{2}$ |

Così ancora andando il vino scuti 10. la botta, la foglietta debbia essere grossa de 6. bicchieri; se dimanda, andando il vino scuti 12. quanto sarà la foglietta.

| Scuti | Bicchieri | Scuti | Bicchieri |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 10 | 6 | 12 | 5 |

Vi sono Soldati 3000. in vn' assedio di vna fortezza, & hanno il vitto per mesi 7. e gli è data nona, che per mesi 12. non possono hauere soccorso; quanti Soldati si hanno da tenere nell' assedio, acciò il vitto basti per 12. mesi.

| Mesi | Soldati | Mesi | Soldati |
|------|---------|------|---------|
| 7 | 3000. | 12 | 1750. |

Si deuono dunque tenere Soldati 1750. & altri 1250. licenciarli, da quali esempi, si vede la natura di detta regola, & il modo di usarla.

Regola del Tre composta Tr. III. 83
do, che detta regola verria in questo modo.

| | | | |
|--------------|---|--------------|------------|
| Scuti | | Scuti | |
| 1 | 9 | 600 | fanno 5400 |

Due multiplicato il primo numero con il 4. fa l'istessa somma, che multiplicando il 2. con il 3.

Si sono portate dal procaccio libbre 50. per 100. miglia con prezzo de giulij 12. quanto si pagara per libbre 120. & per miglia 250. detto esempio si pone in questo modo.

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Libbre | Miglia | | Giulij | | Libbre | Miglia | Giulij |
| 50 | 100 | | 12 | | 120 | 250 | 72 |

Multiplicati li primi numeri fra di se, & li terzi similmente, quale multiplicato del 3. multiplicato per il 2. numero, & diuiso al primo, verria in questo modo.

| | | | |
|---------------|----|---------------|----|
| Giulij | | Giulij | |
| 5000 | 12 | 30000 | 72 |

Ouerosi fa la regola del 3. duplicata in questo modo?

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Libbre | Giulij | Libbre | Giulij |
| 50 | 12 | 120 | 28 $\frac{4}{5}$ |

Dipoi

| | | | |
|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Miglia | Giulij | Miglia | Giulij |
| 100 | 28 $\frac{4}{5}$ | 250 | 72 |

Sono 30. Religiosi, quali in un' anno mangiano 60. rubbij di grano comprati scuti 360. se dimanda quanto ciascheduno habbia mangiato il giorno? in detto esempio

84 Regola del Tre composta Tr. III.

pio messi li scuti in baiocchi, o quattrini, si faria in questo modo.

| Persone | Giorni | baiocchi | Persona | Giorno |
|---------|--------|----------|---------|--------|
| 30 | 365 | 36000 | 1 | 1 |

fanno baiocchi $3\frac{3150}{10910}$

| Persone | Giorni | quattrini | Persona | Giorno |
|---------|--------|-----------|---------|--------|
| 30 | 365 | 180000 | 1 | 1 |

fanno quattrini $16\frac{5700}{10910}$

In detto esempio sono moltiplicati li primi numeri fra di se, & li terzi similmente, quali moltiplicati per il numero di mezzo, & spartito al primo rendouo detti numeri, quali si possono ridurre alle semplice regole del Tre, replicando detta regola due volte in questo modo.

| Persone | Baiocchi | Persona | Baiocchi |
|---------|----------|---------|-------------------|
| 30 | 36000 | 1 | 1200 |
| doppo | | | |
| Giorni | Baiocchi | Giorno | Baiocchi |
| 365 | 1200 | 1 | $3\frac{105}{81}$ |

Si che in simili esempi, si possono usare diuersi modi, ma il primo e il migliore, & più breue.

Così adora vno ha guadagnato in vn' anno scuti 30. con scuti 120. se dimanda, quanto haueria guadagnato in un anno con scuti 200. detto esempio si pone similmente in questo modo.

| | | | | | | | |
|-------|------|--|-------|--|-------|------|-------|
| Scuti | Anni | | Scuti | | Scuti | Anni | Scuti |
| 110 | 1 | | 30 | | 200 | 3 | 150 |

ouero

| | | | |
|-------|------------------|-------|------------------|
| Scuti | Scuti acquistati | Scuti | Scuti acquistati |
| 120 | 30 | 200 | 50 |

& poi

| | | | |
|------|-------|------|-------|
| Anni | Scuti | Anni | Scuti |
| 1 | 50 | 3 | 150 |

Ouero diciamo vno hà guadagnato scuti 15. con scuti 100. in mesi 8. in quanto tempo hauera guadagnato scuti 600 in detto esempio, perche è solamente questione del tempo, però non si pone nell'esempio, la summa de denari, con la quale si è fatto il guadagno, si pone dunque in questo modo.

| | | | |
|-------|------|-------|------|
| Scuti | Mesi | Scuti | Mesi |
| 15 | 8 | 600 | 320 |

Ma si fosse, che con scuti 150. hauesse guadagnato scuti 40. in vn'anno, & se dimandasse quanto hauera guadagnato con scuti 500, adesso, perche non è in questione il tempo, però nō si pone, ma si faria in questo modo.

| | | | |
|-------|------------------|-------|---------------------------|
| Scuti | Scuti acquistati | Scuti | Scuti acquistati |
| 150 | 40 | 500 | $133\frac{5}{8}$ cioè 133 |

Hà comprato vn Mercante scuti 140. di mercantie, poi l'hà venduta 153. desidera sapere quanto hà guadagnato per cento; ouero in caso l'hauesse vèduta scuti 136. quanto hauera perso per cento, detti esempi, si pongono in

86 Regola del Tre composta Tr. III.

in questo modo.

| Scuti | Scuti acquistati | Scuti | Scuti acquistati |
|-------|------------------|-------|--|
| 140 | 13 | 100 | $9\frac{1}{4}\frac{4}{5}$ cioè $\frac{7}{8}$ |

| Scuti | Scuti persi | Scuti | Scuti persi |
|-------|-------------|-------|--|
| 140 | 4 | 100 | $2\frac{1}{4}\frac{0}{5}$ cioè $\frac{1}{4}$ |

Done vedi, che nel secondo esempio si pone il guadagno, o perdita, quale moltiplicato con il 100. & diuiso al primo numero, da il numero conforme si vede.

Stà considerando vno Mercante vna mercantia, quale sà non poterla vendere più, che scuti 260. desidera sapere quanto vi può spendere, con hauerci da guadagnare 8. per cento.

| Scuti | Scuti | Scuti | Scuti |
|-------|-------|-------|--|
| 216 | 300 | 260 | $240\frac{1}{2}\frac{6}{8}$ cioè $\frac{3}{4}$ |

Done si vede nel primo loco 216. che prouengo da 200. del 2. loco per li 8. per 100. desidera guadagnare il Mercante, si che si da 200. vengono 216. li 260. proueniranno da $240\frac{1}{2}\frac{6}{8}$ conforme si vede.

Si lamenta vn Mercante, che hauendo venduta certa mercantia scuti 300. vi habbia perso 10. per 100. quanto dunque spese detto Mercante in detta mercantia si vede in detto esempio, che ogni cento diuenta 90. si pone dunque l'esempio in questo modo.

| Scuti | Scuti | Scuti | Scuti |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 90 | 100 | 300 | 333 $\frac{1}{3}$ |

Regola del Trecomposita Tr. III. 87

Vn Mercante hà venduto certo drappo scuti 560. & ci hà guadagnato scuti 12. per cento, quanto dunque spese detto Mercante, in detta mercantia?

| Scuti | Scuti | Scuti | Scuti |
|-------|-------|-------|-------|
| 112 | 100 | 560 | 500 |

Dice vno Droghiero, che con vendere certe sue droghe à baiocchi 75. la libra, guadagna 30. per 100. quanto dunque viene la libra à detto Droghiero, & quanto guadagnaria per cento, con venderle à baiocchi 22. la libra? in detto esempio si hà prima da ritrouare, quanto viene la libra à detto Mercante, però si pone l'esempio in questo modo.

| | | | |
|-----|-----|----|--------------------|
| 130 | 100 | 25 | $19\frac{21}{135}$ |
|-----|-----|----|--------------------|

Costa dunque al Droghiero la libra baiocchi $19\frac{21}{135}$ & si la vendita si farà à baiocchi 22. la libra, per sapere quanto verria per cento, si faria in questo modo.

| | | | | |
|--------------------|-----|----|----|-----------------------|
| $19\frac{21}{135}$ | 100 | 22 | da | $117\frac{512}{1441}$ |
|--------------------|-----|----|----|-----------------------|

Done si vede, che si veramente il Droghiero hauesse comprato la libra di dette mercantie baiocchi $19\frac{21}{135}$ & tanto similmente l' hauesse vendute non guadagnaria cosa alcuna, vendendola poi à baiocchi 22. verria à guadagnare scuti $17\frac{512}{1441}$ per cento come si vede.

Vn Mercante hà comprato libre 3000. di zucchero per scuti 1590. desidera sapere quanto gli viene la libra, & poi quanto lo può vendere per guadagnarci 15. per 100. detto esempio si pone in questo modo.

88 Regola del Tre composta Tr. III.

| | | | | |
|-------|--------|-------|----------------------|-------------|
| Libre | Giulij | Libra | Giulij | che sono |
| 3000 | 25900 | 1 | 5 $\frac{900}{1000}$ | baiocchi 3. |

| | | | |
|-------|-------|-------|--------------------|
| Scuti | Scuti | Scuti | Scuti |
| 100 | 115 | 1590 | 1828 $\frac{1}{2}$ |

Deue nel primo esempio si vede, che la libra costa al Mercante baiocchi 53. & nel 2. che per guadagnarci 15. per cento; bisogna, che cani da tutto detto Zuccaro scuti 1828 $\frac{1}{2}$ cioè $\frac{1}{2}$ & per sapere quanto bisogna venderlo la libra si fa in questo modo.

| | | | |
|-------|--------------------|-------|----------------------|
| Libre | Giulij | Libra | Giulij |
| 3000 | 1828 $\frac{1}{2}$ | 1 | 6 $\frac{285}{1000}$ |

Et si detto Mercante hauesse venduto solamente detto Zuccaro per scuti 1500. quanto haueria perso per 100. si fa in questo modo.

| | | | |
|-------|-------|-------|-----------------------|
| Scuti | Scuti | Scuti | Scuti |
| 1590 | 1500 | 100 | 94 $\frac{540}{1000}$ |

Si che hauerebbe perso detto Mercante 6. meno $\frac{540}{1000}$ per cento, come si vede, & si se dimandasse in tal caso quanto haueria venduto la libra, si faria in questo modo.

| | | | |
|-------|--------|-------|--------|
| Libre | Giulij | Libre | Giulij |
| 3000 | 15000 | 1 | 5 |

Hauerebbe dunque venduto 50. baiocchi la libra in detto caso 3. baiocchi meno della prima volta, dove può
cias-

ciascheduno scorgere la magnificenza di detta regola, & quanto sia de bisogno.

TRATTATO QUARTO Della Società.

Che cosa sia Società. Cap. Vnico.

Detto Trattato della Società è il più usato, & necessario di qualsivoglia altro, tanto per Mercanti, quanto per qualsivoglia sorte di negoziante, & detto Trattato sta tutto fondato nella regola del Tre, & non vuol dire altro, che vnione di più negotianti, quali pongono diuerse quantità di denari in guadagno, o perdita comune, detta regola poi si usa in questo modo.

Si redunano tutte le quantità di denari in vna summa, quale summa si pone nel primo loco per la regola del Tre, nel secondo loco si pone il guadagno, o danno comune, nel 3. loco si pongono tutte le partite di denari vna sopra l'altra conforme la quantità, che da ciascheduno è stata messa, di modo, che tante volte si replica detta regola del Tre, quante sono le partite di detti denari, & se ci occorre diuersità di tempo in porre detti denari, se moltiplica ciascheduna partita con il suo tempo, & poi si pongono in detto 3. loco vna sotto l'altra, il che fatto si caua facilmente il numero per il 4. loco conforme habbiamo detto nella regola del Tre, & il tutto si renderà chiaro cō l'infra scritti esempj.

Dub. 1. Sono tre Mercanti, quali hanno da spartirsi

F. scu.

scuti 2600. che hanno guadagnato in uno negotio, nel quale uno vi pose scuti 860. l'altro 1240. & il 3. 650. se dimanda quanto tocca a ciascheduno di detta summa 2600. primieramente si assummano le tre partite di denari messi da detti Mercanti, che sono scuti 2750. & si pongono nel primo loco per la regola del Tre, poi nel 2. loco si pongono li 2600. guadagnati, & nel 3. loco si pone la summa di ciascheduno Mercante, come si vede in questo esempio.

| Scuti | Scutiguad. | Scuti | Scuti guad. |
|-------|------------|--|--|
| 2750 | 2600 | $\left\{ \begin{array}{l} 860 \\ 1240 \\ 650 \end{array} \right\}$ | $813 \frac{25}{2740}$ al 1.
$1172 \frac{1000}{2740}$ al 2.
$614 \frac{1500}{2740}$ al 3. |
| summa | | | $2599 \frac{75}{2740}$ cioè 1. |

si che sono — 2600

Multiplicato dunque il secondo numero 2600. per la prima summa di 860. che stà nel 3. loco & diuersi à 2750 tocca al primo Mercante $813 \frac{25}{2740}$. & fatto il simile con la seconda, tocca al 2. $1172 \frac{1000}{2740}$ & così similmente fatto con la 3. toccherà al 3. $614 \frac{1500}{2740}$.

La proua, si detta operatione se sia ben fatta è multiplicare tutti detti numeri diuersi, & vedere si fanno la summa in comune guadagnata, che altrimenti non stà ben fatta.

Mà se li sopradetti Mercanti con detta summa di scuti 2750. haueffero perso in detto negotio scuti 300. quanti scuti si diria hauere perso ciascheduno, detto esempio si pone in questo modo.

Scuti

| Scuti | Scuti per il dāno | Scuti | |
|-------|-------------------|-------|---------------------------------|
| | | 860 | 766 $\frac{500}{1778}$ |
| 2750 | 2450 | 1240 | 1104 $\frac{2000}{2750}$ |
| | | 650 | 579 $\frac{250}{2750}$ |
| <hr/> | | | |
| | | summa | 2449 $\frac{2750}{2750}$ cioè 3 |

si che sono giusti. — 2450

Dub. 2. Sono tre Mercanti, quali si vogliono spartire libbre 2000. di Cannella, che costano scuti 1500. ma uno ne vuole libbre 1200. l'altro libbre 300. & il 3. libbre 500. se dimanda quanto deue pagare ciascheduno? detto esempio si pone in questo modo.

| Libre | Scuti | Libre | Scuti |
|-------|-------|-------|-----------|
| | | 1200 | 900 al 1. |
| 2000 | 1500 | 300 | 215 al 2. |
| | | 500 | 375 al 3. |
| <hr/> | | | |
| | | | 1500 |

Dub. 3. Tre Mercanti in due anni hanno guadagnato scuti 2000. in uno negotio nel quale il primo vi pose scuti 1000. per mesi quindici, il 2. vece pose 800. per mesi dodeci, & il 3. vi pose 600. per tutto il tempo di due anni, quale partite summano 2450. in detto tempo perche vrè la diuersità di tempo, se multiplica detto tempo con la summa di denari di ciascheduno, & poi tutte dette summe si raccolgono in vna, & detta vna summa si pone nel primo loco per la regola del Tre, come v. g. in detta

esempio multiplicati li scuti 1000. per 15. mesi, summano 15000. & multiplicati li 800. del 2. Mercante per 12. mesi, summano 9600. così ancora multiplicati li 650 del 3. Mercante per 24. mesi, summano 15600. & radunate insieme dette partite summano 40200. quale numero si pone nel primo loco per la regola del 3. che verria in questo modo.

| Scuti | Scuti guad. | Scuti | |
|-------|-------------|--|---|
| 40200 | 2000 | $\left\{ \begin{array}{l} 15000 \\ 9600 \\ 15600 \end{array} \right\}$ | $\begin{array}{r} 746 \overset{1}{\underset{0}{0}} \overset{8}{\underset{0}{0}} \overset{0}{\underset{0}{0}} \\ 477 \overset{2}{\underset{0}{0}} \overset{6}{\underset{0}{0}} \overset{0}{\underset{0}{0}} \\ 776 \overset{8}{\underset{0}{0}} \overset{0}{\underset{0}{0}} \overset{0}{\underset{0}{0}} \\ \hline 40200 \end{array}$ |

Dnb. 4. Sono tre Mercanti, quali hanno caricato una naue con scuti 10000. di mercantie, nelli quali uno ha uenuto messo scuti 4400. il 2. 3000. & il 3. 2600. & mossa tempesta si perdono scuti 40000 sicche si hanno da spartir, fra detti Mercanti scuti 6000. se dimanda quanto toccherà per ciascheduno? detto esempio si pone in questo modo.

| Scuti | Scuti per il dano | Scuti | Scuti |
|-------|-------------------|--|---|
| 10000 | 6000 | $\left\{ \begin{array}{l} 4400 \\ 3000 \\ 2600 \end{array} \right\}$ | $\begin{array}{r} 2640 \text{ al } 1. \\ 1800 \text{ al } 2. \\ 1560 \text{ al } 3. \\ \hline 6000 \end{array}$ |

Dub. 5. Quattro Mercanti in una società di anni 2. uno ha messo scuti 1000. dal principio, ma poi doppo me-

si 16. si pigliò scuti 400. il 2. vi pose scuti 800. mà 6. mesi
dopò, che cominciassè la società, il 3. vi pose scuti 1200. per
tutti li 2 anni, & il 4. hà messo scuti mille, mà dopò 7. me-
si se pigliò scuti 500. & sei mesi auarissinse la società di 2
anni, vi pose scuti 800. & finiti li 2 anni ritrouano hauere
guadagnato scuti 2000. si dimāda, come si hāno a spartire
detti denari a questi 4. Mercanti, & cōforme habbiamo
detto in tali casi bisogna multiplicare li denari cō il tēpo,
di tutte poule partite, farne vna summa, v. g. in questo
esempio il primo Mercante viene ad hauere messo scuti
1000. per mesi 16. & scuti 6000. per mesi 8. che sum-
mano 20800. per il primo Mercante, & multiplicati li
800. per 18. mesi del 2. Mercante, summano 14400. co-
si ancora multiplicati li 1200. del 3. Mercante per mese
24. summano 28800. il 4. Mercante viene ad hauere
messo scuti 1000. per mesi 7. & 500. per mesi 11. &
800. per mesi 6. quali multiplicati frā di se, summano
17300. & dette 4. partite assummate insieme fanno
81300. da porsi nel primo loca per la regola del 3. con-
forme quini si ueda.

Lucrum

| | | | | | | |
|-------|------|---|-------|-------|-----|-------|
| 81300 | 2000 | { | 20800 | fanno | 511 | al 1. |
| | | | 14400 | | 354 | |
| | | | 28800 | | 708 | |
| | | | 17300 | | 425 | |

summano 81298

& due de minutie, che fanno — 81300

Mà poniamo caso, che detti Mercanti habbiano per-

se scuti 1000. in detta società, all' hora similmente si fa l' operatione di multiplicare la quantità di denari con il tempo, conforme già si è fatto prima, & detto esempio verria in questo modo:

| danno | | | |
|-------|------|-----------|----------------------------|
| 81300 | 1000 | { 20800 } | 255 $\frac{85}{11}$ al 1. |
| | | { 14400 } | 177 $\frac{99}{11}$ al 2. |
| | | { 28800 } | 354 $\frac{198}{11}$ al 3. |
| | | { 17300 } | 212 $\frac{64}{11}$ al 4. |

Dub. 6. In una società tre Mercanti hanno guadagnato scuti 1000. il primo vi pose scuti 300. per dieci mesi, il 2. vi pose scuti 700. & il 3. scuti 800. il primo riceue scuti 500. il 2. 300. & il 3. 200. di guadagno; quanto tempo dunque li denari del 2. & 3. furono in detta società? per ciò sapere, bisogna multiplicare li denari del primo con il suo tempo, quali multiplicati, summano 3000. & per sapere da che numero multiplicato prouenghi il guadagno dell' altri due, si forma la regola del 3. in questo modo.

| Scuti | Scuti guad. | |
|-------|-------------|-------------|
| 500 | 3000 | { 300 } |
| | | { 200 } |
| | | 1800 del 2. |
| | | 1200 del 3. |

Di modo, che si scuti 500. prouengono dal multiplicato 3000. li scuti 300. del 2. Mercante prouengono dal multiplicato 1800. & li 200. del 3. dal multiplicato 1200. per sapere adesso quanto è il tempo, che multiplicato con li scuti 700. del secondo Mercante, facci detta somma de 1800. si diuide detto numero a 700. & se ritrouerà,

rà, che darà al cotiente $2\frac{4}{7}$ si che per due mesi, & $\frac{4}{7}$ sterno li quattrini del 2. nella società, & diuisi li 1200. per 800 che sono li denari del 3. darà al cotiente $1\frac{1}{2}$ cioè vn mese, & mezzo, sterno li denari del 3. Mercante in società. Et che ciò sia vero, multiplicato di nuouo li 300. scuti per mesi 10. che faranno 3000. & multiplicati li 700. per $2\frac{4}{7}$ summano 1800. & li 800. del 3. Mercante per $1\frac{1}{2}$ che faranno 1200. & tutte dette summe, fanno numero di 6000. quali messi nel primo loco per la regola del 3. si fa in questo modo.

Scutigrad.

| | | | |
|------|------|------------------------|-----------------|
| 6000 | 1000 | } 3000
1800
1200 | 500 al 1. |
| | | | fanno 300 al 2. |
| | | | 200 al 3. |

Si vede dunque, che sono bene spartiti detti denari, conforme la qualità de loro tempi.

Dub. 7. Sono tre Mercanti, che in vna società di vn' anno, hanno guadagnato scuti 1000. nella quale società vno vi pose scuti 1500. per mesi 8. il 2. vi pose scuti 800 per tutto l'anno, & il 3. non hauendo denari vi pose nna quantità d'argenteria per mesi dieci, & diuisi scuti mille al primo si è dato scuti $434\frac{2}{7}\frac{1}{8}$ al 2. scuti $347\frac{2}{7}\frac{8}{8}$ & al 3. scuti $217\frac{1}{7}\frac{8}{8}$ se dimanda, quanta sù la quantità di denari del 3. Mercante, & per ciò sapere, bisogna vedere da che quantità multiplicata prouenghino dette parti di denari, & il multiplicato del primo bisogna sia stato 12000. perche multiplicati scuti 1500. di detto primo per li suoi mesi 8. faranno detta summa, & così il 2. farà la summa de 9600. perche multiplicati li scuti 800. per li suoi dodici mesi; fanno similmente detta summa piglia-

mo dunque una di detta summa, v. g. la prima de 12000
 & diciamo per la regola del 3. li scuti 434²/₁₆ prouen-
 gono da 12000. da che summa proueniranno li scuti
 217¹/₈ del 3. Mercante, conforme in questo esempio si
 vede.

Scuti

434²/₁₆

12000

Scuti

217¹/₈

6000

Di modo, che il multiplicato del 3. Mercante già si ue-
 de essere stato 6000. si può sapere dunque facilmente,
 quanto fosse il prezzo dell'argento, poichè diuiso detti
 6000. a dieci mesi, che fu il tempo, di detto 3. Mercan-
 te, darà al cotiente 600. si che 600. scuti furono le argen-
 tarie di detto Mercante, & che ciò sia vero, multiplicati
 di nuouo le summe de tutti 3. Mercanti con li loro tem-
 pi, già si vede, che il primo summa 12000. il 2. 9600. &
 il 3. 6000. quale partite unite insieme, fanno la summa
 de 27600. diciamo dunque, si 27600. hanno dato 1000
 quanti daranno, ciascheduna partita da se sola, conforme
 vedi in questo esempio.

Scuti

27600

1000

12000
 9600
 6000

daranno

434²/₁₆
 347¹/₈
 217¹/₈

Si vede dunque, che sono stati bene ritrouati li scuti
 600. dell'argenteria del 3. Mercante.

Dub. 8. Sono quattro, che in una società di due anni,
 uno ha messo scuti 2000. per tutti li due anni, il 2. dop-
 po mesi 6. po, e non so, che quantita di denari, il 3. doppo

mesi 12. vi pose similmente non sò, che altra quantità di denari, & il 4. anco pose non sò, che quantità di denari, doppò 4. mesi. & poi finiti li due anni, riceuono tutti 4. eguale guadagno; se dimanda quanti b.ogna siano stati li denari di questi tre ultimi Mercanti.

Detto dubbio si sa facilmente dal multiplicato delli denari del primo Mercante con il suo tempo, & è 48000 quali diuisi per li mesi 18. del 2. Mercante, dāno 2666 $\frac{2}{3}$ cioè $\frac{2}{3}$ che sono la quantità delli denari incogniti del 2. Mercante. & poi diuisi detti 48000. per li mesi 12. del 3. Mercante, daranno al cotiente 4000. & è la summa incognita di detto 3. Mercante; & diuisi similmente detti 48000. per mesi 20. del 4. Mercante daranno al cotiente 2400. che è la summa incognita del 4. Mercante, & che ciò sia vero, multiplicate dette summe per li loro tempi; la prima darà 48000. la 2. darà 48000. la 3. 48000. & la 4. 48000. quali 4. partite tutte insieme summano 192000. ne è marauiglia se tutti hanno hauuto eguale guadagno, come si può vedere ancora in questo esempio.

Scuti guad.

| | | | | | |
|--------|------|---|-------|---------|-----|
| 192000 | 2000 | { | 48000 | daranno | 500 |
| | | | 48000 | | 500 |
| | | | 48000 | | 500 |
| | | | 48000 | | 500 |

Dub. 9. Tre Mercanti hanno guadagnato scuti 240. quali diuisi fra di se, il primo ha hauuto una parte triplicata rispetto al 2. & quadruplicata rispetto al 3. il 1. ha messo scuti 600. per mesi 12. il 2. ha messo li suoi denari per mesi 8. & il 3. per mesi 6. si dimanda, quanti de-

denari ha'l bino meſſo queſti due ultimi, & quanto è toc-
cato per ciaſcheduno.

Per ciò ſaperè ſi multiplicano li denari del primo con
il ſuo tempo di meſi 12. che faranno 7200. & il ſuo 4. ſa-
rà 1800. & il 3. ſarà 2400. quale 4. & 3. biſogna, che
ſiano il multiplicato delli denari, & tempo delli due ulti-
mi Mercanti, acciò il guadagno del 3. ſia il 4. riſpetto
al primo, & il guadagno del 2. ſia il 3. riſpetto al primo,
~~& il guadagno del 2. ſia il 3. riſpetto ſimilmente al pri-~~
mo, dette 3. partite radunate inſieme, ſummano 11400
diciamo dunque ſi 114000. hanno dato 240. quanto da-
rà ciaſcheduna partita, conforme qui vedi.

| Scuti | | | |
|-------|-----|--|----------------------|
| 11400 | 240 | $\left\{ \begin{array}{l} 7200 \\ 2400 \\ 1800 \end{array} \right\}$ | daranno |
| | | | 151 $\frac{66}{114}$ |
| | | | 50 $\frac{60}{114}$ |
| | | | 37 $\frac{11}{114}$ |

E per ſapere quanti denari poſero li due Mercanti, ſe
diuidono li 2400, del 2. Mercante per li ſuoi 8. meſi, che
daranno al cotiente 300. & faranno li denari di detto 2.
Mercante; poi diuiſi li 1800. per li 6. meſi del 3. Mer-
cante, daranno ſimilmente al cotiente 300. che ſono li
denari di detto 3. Mercante.

Dub. 10. Sono 4. Mercanti, quali con ſcuti 2600.
hanno guadagnato ſcuti 1600. & diuiſi conforme la
quantità di denari di ciaſcheduno; toccorno al primo
 $492 \frac{8}{6}$ al 2. 400. al 3. $373 \frac{2}{6}$ & al 4. $369 \frac{6}{6}$ ſe dimā-
da quanti ſurno li denari, che ciaſcheduno poſe nella ſo-
cietà? In queſto caſo aſſumate dette tre partite di de-
neri diuiſi, già ſummano 600. Diciamo dunque ſi ſcuti
1600. prouengono da ſcuti 2600. da che ſumma proue-
nirà

nirà ciascheduna di dette partite diuise, conforme si vede in questo esempio.

| Scuti | da Scuti | | |
|-------|----------|--|--------------------------|
| | | $\left\{ \begin{array}{l} 492 \frac{1}{2} \\ 400 \\ 338 \frac{1}{2} \\ 369 \frac{1}{2} \end{array} \right\}$ | 800
650
550
600 |
| 1600 | 2600 | vengono | |

Dub. II. Tre in una società hanno guadagnato scuti 600. con scuti 2800. il primo ha riceuto li suoi denari una con il guadagno, & ha hauuto scuti $1411 \frac{1}{2}$ il 2. similmente ha hauuto scuti $1176 \frac{1}{2}$ & il 3. ha riceuto scuti $705 \frac{1}{2}$ se dimanda, quanti denari ciascheduno di detti Mercanti pose in detta società, & quanto ha guadagnato ciascheduno in questo caso? Si vnisce tutta la quantità di denari messi da detti Mercanti insieme con il guadagno, che fariano scuti 3400, & doppò si dice; se 3400. prouengono da scuti 2800, da che numero proueniranno scuti $1411 \frac{1}{2}$ & da che numero scuti $1176 \frac{1}{2}$ & così similmente scuti $705 \frac{1}{2}$ conforme vedi in questo esempio.

| Scuti | da Scuti | | |
|-------|----------|---|---------------------|
| | | $\left\{ \begin{array}{l} 1411 \frac{1}{2} \\ 1176 \frac{1}{2} \\ 705 \frac{1}{2} \end{array} \right\}$ | 1200
1000
600 |
| 3400 | 2800 | da Scuti | |

Da dette partite, sottratte le quantità di denari, che ciascheduno pose nella società; se vederà, che il primo ha guadagnato scuti $211 \frac{1}{2}$ il 2. scuti $176 \frac{1}{2}$ & il 3. scuti $105 \frac{1}{2}$.

Dub 12. Due Mercanti con scuti 1500. hanno guadagnato scuti 1200. il primo pose scuti 900. & il 2. scuti 600 con promessa al Fattore di detta società, di darli 10. per 100. se dimanda quanto tocca per ciascheduno? si leuano primieramente li 10. per cento, & restaranno scuti 1180. & poi si dice se scuti 1500. hanno guadagnato scuti 1180. quanti ne haneranno guadagnato li 900. & quanti li 600. conforme si vede in questo esempio.

| Scuti | Scuti guad. | Scuti | Scuti |
|-------|-------------|--|---|
| 1500 | 1180 | $\left\{ \begin{array}{l} 900 \\ 600 \end{array} \right\}$ | $\begin{array}{l} 708 \\ 472 \end{array}$ |

Dub. 13. Tre in vna società hanno guadagnato scuti 1520. il primo vi ha messo scuti 1080. il 2. 360. & il 3. ha messo tanti denari, che ha riceuto di guadagno scuti 240. si dimanda, quanto hanno guadagnato li due Mercanti primi, & quanto ha messo nella società il 3. Mercante? si leuano prima li scuti 240. del 3. Mercante da scuti 1520 che è il comune guadagno, & restano tutti 1280 di poi se dice, si scuti 1440. che è la summa delli due primi Mercanti, hanno guadagnato scuti 1280: quanti ne guadagnaranno scuti 1080. & quanti 360. conforme si vede in questo esempio.

| Scuti | Scuti guad. | | |
|-------|-------------|---|---|
| 1440 | 1280 | $\left\{ \begin{array}{l} 1080 \\ 360 \end{array} \right\}$ | $\begin{array}{l} \text{daranno } 960 \\ 320 \end{array}$ |

Poi per sapere quanti furono li denari, che ha messo il 3. Mercante, delli quali gli sono peruenuti scuti 240. si fa questo modo, dicendo, se scuti 1280. peruencono da scuti

ti 1440. da che numero perueniranno scuti 240. confor-
me si vede in questo esempio.

| Scuti | da Scuti | Scuti | da Scuti |
|-------|----------|-------|----------|
| 1280 | 1440 | 240 | 270 |

Dub. 14. Quattro Mercanti hanno messo scuti 500. per ciascheduno in una società di anni due, nella quale hanno guadagnato scuti 1400. mà uno vi pose li suoi denari per tutti li mesi 24. il 2. per mesi 18. il 3. per mesi dodeci, & il 4. per mesi 10. se dimanda quanto tocca per Mercante in detto caso, perche tutti hanno messo parte eguale di denari, però non occorre multiplicare li denari con il suo tempo, mà basta assumere tutti detti mesi insieme, & faranno la summa de mesi 64. & si dice, se mesi 64. hanno dato scuti 1400 quanti ne daranno mesi 24. quanti, mesi 18. quanti, mesi 12. & quanti mesi dieci, come vedi in questo esempio.

| Mesi | Scuti | Mesi | | |
|------|-------|--------|---------------------|--------------------|
| | | { 24 } | 525 | |
| | | { 18 } | 393 $\frac{48}{64}$ | |
| 64 | 1400 | { 12 } | 262 $\frac{32}{64}$ | cioè $\frac{1}{2}$ |
| | | { 10 } | 218 $\frac{48}{64}$ | |

Dub. 15. Sono 4. Mercanti, quali hanno guadagnato scuti 656. in una società, & hauendo riguardo alla quantità di denari, che ciascheduno ha messo, si hanno spartiti detti denari in modo, che quante volte è toccato al primo 5. scuti, tante volte è toccato al 2. scuti 9 & al 3. scuti 12. & al 4. scuti 15. & il primo Mercante ha messo in questa società scuti 1000. se dimanda quanti de-
na-

nari sono toccati per ciascheduno, & quanti denari hanno messo li tre ultimi Mercanti in detta Società? per ciò sapere, si assummano tutte le quattro partite insieme, cioè li 5. dati al primo, li 9. dati al 2. li 12. dati al 3. & li 15. dati al 4. che sono in tutto 41. poi si vede quante volte cape detto 41. nel numero delli denari guadagnati, che sono 656. & diuisi conforme la regola, se ritrouerà nel cotiente 16. di modo, che subito si sa, il primo hauere hauuto 16. volte 5. scuti, che fanno 80. il 2. 16. volte 9. che fanno 144. il 3. 16. volte 12. che sono 192. & il 4. 16. volte 15. che sono 240 quale summe unite insieme fanno 656. di modo, che sono bene diuisi detti denari. Per sapere poi quanti denari hanno messo li 3. ultimi Mercanti, si dice, se scuti 80. peruengono da scuti 1000. del primo Mercante, da doue peruenneranno scuti 147. del 2. 192. del 3. & 240. del 4. conforme si vede in questo esempio.

| Scuti | da Scuti | Scuti | |
|-------|----------|--|--|
| 80 | 1000 | $\left. \begin{array}{l} 144 \\ 192 \\ 240 \end{array} \right\}$ | 1800 del 2.
da 2400 del 3.
3000 del 4. |

Ouero diciamo più breuemente, radunate insieme li 4. partite 5. 9. 12. & 15. fanno 41. doppo si dice se 41. danno 656. quanti daranno 5. 9. 12. & 15. conforme si vede in questo esempio.

| Scuti | | | |
|-------|-----|--|---------|
| 41 | 656 | $\left\{ \begin{array}{c} 5 \\ 9 \\ 12 \\ 15 \end{array} \right\}$ | daranno |
| | | | 80 |
| | | | 144 |
| | | | 192 |
| | | | 240 |

Quanti denari poi habbino messo li Mercanti, già l' habbiamo detto di sopra.

Dub. 16. Sono dieci Capitani, 6. Alfieri, & 300. Soldati, quali in vno sacco dato ad vna Terra, hanno trouato scuti 20720. quali sono stati diuisi frà essi, in modo, che quante volte li Capitani hanno hauuto 10. per ciascheduno, tante volte li Alfieri haueuano similmente 6. scuti per vno, & li Soldati 3 per vno, se dimanda quanti scuti hanno hauuto li Capitani, quanti l' Alfieri, & quanti li Soldati? per ciò sapere facilmente, radunate insieme li 10. scuti di 10. Capitani sono 100. poi li 6. scuti de 6. Alfieri, sono 36. & li 3. scuti per Soldato sono 900. assummate insieme dette partite, sono 1036. poi se due se 1036. hanno dato 20720. quanti daranno 100. 36. & 900. conforme si vede in questo esempio.

| Scuti | | | |
|-------|-------|--|---------|
| 1036 | 20720 | $\left\{ \begin{array}{c} 100 \\ 36 \\ 900 \end{array} \right\}$ | daranno |
| | | | 2000 |
| | | | 720 |
| | | | 18000 |
| <hr/> | | | |
| | | | 20720 |

Si vede dunque, che li Capitani hanno hauuto scuti 2000. quali diuisi frà di essi tocca per ciascheduno scuti 200.

200. & li Alfieri hanno hauuto scuti 720. quali similmente diuisi, tocca a ciascheduno scuti 120. così ancora, li Soldati hanno riceuuto scuti 8100. & tocca a ciascheduno scuti 60. conforme si caua facilmente da detto esempio.

Dub. 17. Uno Mercante venendo a morte, & facendo testamento, lascia che sia dato a sua moglie $\frac{2}{3}$ della sua robba, che erano scuti 18088. & alla figlia $\frac{1}{3}$ & perche haueua uno figlio nella guerra, che pensaua fosse morto; nondimeno lascia, che in caso venisse, gli fosse dato $\frac{2}{3}$ della sua robba; more il Mercante, & si fa il caso, che viene il figlio dalla guerra; se dimanda come si deuè spartire detta robba, poiche se si dà $\frac{2}{3}$ alla moglie, & $\frac{1}{3}$ alla figlia, non vi resta cosa alcuna, bisogna dunque andare interpretando la volontà del Testatore, & così dicono li Aritmetici douersi dare alla figlia vna parte, & alla moglie vn' altra, che contenghi due volte quella della figlia, & al figlio vna parte, che contenghi due volte le parti della moglie di modo, che di detta robba si hà da fare 7. pa te, vna alla figlia, due alla moglie, & 4. al figlio, & per sapere quanto tocca a ciascheduno si dice 7. danno 1888. che cosa daranno 4. 2. & 1. conforme si vede in questo esempio.

$$\begin{array}{rcl}
 7 & 18088 & \left\{ \begin{array}{l} 4 \\ 2 \\ 1 \end{array} \right\} \text{ daranno} \\
 & & \begin{array}{l} 10336 \text{ al figlio.} \\ 5168 \text{ alla moglie.} \\ 2584 \text{ alla figlia.} \end{array} \\
 \hline
 & & 18088
 \end{array}$$

Dub. 18. Sono tre compagni, quali si hanno da spartire scuti 1500. in modo tale, che vno habbia d' hauere $\frac{1}{2}$ & il

$\frac{2}{3}$ & il secondo, $\frac{2}{3}$ & il terzo $\frac{4}{7}$ di detti denari 1500. Se dimanda quanto tocca per ciascheduno. In detto, & simili casi, dove si tratta de minutie, bisogna prima ridurre dette minutie sotto vno denominatore, conforme habbiamo detto nel Trattato II. di modo, che in detto caso, dette minutie se ridurranno a questo modo $\frac{75}{225}$, $\frac{90}{225}$, $\frac{60}{225}$ assummati poi detti numeratori fanno 225, poi si dice se 225 danno 1500. quanti daranno 75. 90. & 60. conforme si vede in questo esempio.

Scuti

| | | | | |
|-----|------|--|---------|-----------|
| 225 | 1500 | $\left\{ \begin{array}{l} 75 \\ 90 \\ 60 \end{array} \right\}$ | daranno | 500 al 1. |
| | | | | 600 al 2. |
| | | | | 400 al 3. |

1500

Dub. 19. M^a si se dicesse, che il primo ha da ricercare $\frac{2}{3}$ & dieci scuti di più, il 2. $\frac{2}{3}$ & dieci meno, & il 3. $\frac{4}{7}$ & 15. de più, & li scuti da spartirsi fossero 1515. in simili casi, si assummano quelli scuti, che si hanno a dare oltre le parti, che in questo caso, sarebbono 25. & si leuano da tutta la summa da diuidersi, & si aggiungeno a detta summa quelli scuti, che si hanno a dare meno delle parti, che in questo caso sono 10. di modo, che restariano li scuti da diuidersi in scuti 1500 quali si diuidono, come si è fatto di sopra, poi leuati scuti 10. dal 2. & aggiunti al primo, verrà ad hauere il primo scuti 510. & il 2. scuti 590. aggiunto poi 15. al 3. verrà ad hauere scuti 415 quale partite assummate insieme fanno 1515.

Dub. 20. Vi è vna botte grande, quale tiene tre buchi nel fondo ineguali, di modo, che aperto il maggiore, si verseria tutto il vino in bore 4. & si se aprisse il più piccolo.

G

ciolo.

siolo, si verferia il vino in hore 6. & il minimo, in hore 12. dato caso si aprissero tutti tre detti buchi, in quanto tempo si verferia detta botta di vino? se piglia il tempo del minimo buco, che è 12. & se dice; se hora 4. del buco maggiore versa una botte, quante ne verferà in hore 12? saranno 3. & se in hore 6 il buco minore versa una botte, quante ne verferà in hore 12. saranno 2. & il buco minimo in hore 12. una, di modo, che detti tre buchi verferanno in hore 12. botte 6. diciamo dunque si botte 6. in hore 12. botta una in quanto tempo si verferà, conforme si vede in questo esempio.

| Botte | Hore | Botta | Hore |
|-------|------|-------|------|
| 6 | 12 | 1 | 2. |

Da tutti li sopradetti esempij facilmente si può cauare il modo di sciogliere, simili, & altri dubbj, che possono occorrere in questa regola della Società.



TRATATTO QVINTO

Delle Allegationi.

Che cosa sia Allegationi, & come si facci.

Cap. Vnico.

P Erchè è cosa assai usata fra Mercanti comprare diuersità di mercantie tutte insieme con uno prezzo solo, benchesiiano in se di diuerso prezzo, però li Aritmetici hanno ritrouato la regola dell' allegatione, che non vuole dire altro, se non che una compra si fa di diuersi mercantie con uno prezzo solo, benchè ciascheduna di esse mercantie habbia diuerso prezzo, & detto prezzo solo se chiama prezzo medio, come v. g. compra uno Mercante 1000. canne di drappo, de quali 500. vagliono 6. scuti la canna, & altre 500. a 4. scuti, nondimeno perche questo Mercante non ha più che 5000. scuti vorria mille canne di detti drappi, cioè parte dell' uno, & parte dell' altro. Desidera dunque sapere quante canne gli tocca del primo drappo di 6. scuti la canna, & quante di quello de 4. scuti la canna, questo modo, si chiama regola d' allegatione, conforme con esempi dichiararemo, & diremo il modo come si fa, & per cominciare dall' esempio proposto; si pone detto esempio in questo modo.

Dub. 1. Il primo 6. significa il drappo primo di 6. scuti la canna, & il 4. di sotto significa il secondo drappo di 4. scuti la canna, il 5. significa il prezzo medio, che vuole spendere il Mercante, poi si fa l' allegatione fra li 6. & 4. con il prezzo medio, dicendo, che differentia è fra

G 2 6. &

6. & 5. ritroueremo, che sia 1. si fa detto 1. incontro al 4. di sotto, dopod si dice, che differentia è fra il 4. & 5. & se ritroua similmente, che sia 1. si pone detto 1. incontro al 6. di sopra, conforme il tutto si vede in detto esempio; si assummano poi

| | Prezzo | Differentia |
|--------------|----------------------|-------------|
| Prezzo medio | 6 | 1 |
| | 5 | |
| | 4 | 1 |
| | Summa de differentie | |
| | | 2 |

dette differentie sotto la linea, che sono due conforme similmente si vede in detto esempio, dove si nota, che quando si allega il primo prezzo con il medio, si pone la differentia di esso incontro a l'ultimo prezzo, & allegandosi l'ultimo con detto medio, si pone la differentia in contro al primo, conforme habbiamo fatto in detto esempio.

Doppo, che si è ritrouata la summa delle differentie, come in questo esempio sono 2. si fa la regola del 3. due volte, primieramente se dice, se due (che sono le differentie) danno una canna, quante ne daranno 1. & 1. conforme vedi in questo esempio.

$$\begin{array}{rcl}
 2 & 1 & \{1\} \\
 & & \frac{1}{2} \quad \text{del primo} \\
 & & \frac{1}{2} \quad \text{del secondo}
 \end{array}$$

Doue multiplicato l' uno del 2. loco con il primo del 3. loco, fa similmente 1. quale diuiso al primo numero 2.

fa

fà $\frac{1}{2}$ cioè vno dimidio da porsi nel 4. loco, & così similmente operando con l'altro 1. fa l'istesso effetto, di modo, che si vede, che al Mercante tocca mezza canna del primo drappo, & mezza del 2. si che con scuti 5000. gli toccheriano canne 500. del primo drappo, & altre canne 500 del 2. drappo, poiche si canna 1. vale 6. del primo drappo, quanto valeranno canne 500. & si canna 1. del 2. drappo vale scuti 4. quanto anderanno canne 500. conforme vedi in questo esemplo.

| Canna | Scuti | Canne | Scuti |
|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 6 | 500 | 3000 |

| Canna | Scuti | Canne | Scuti |
|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 4 | 500 | 2000 |

| ouero diciamo si scuti | Canne | Scuti | Canne |
|------------------------|---------------------|-------|------------|
| 5 | $\frac{1}{2}$ del 1 | 5000 | 500 del 1. |
| | $\frac{1}{2}$ del 2 | | 500 del 2. |

Dub. 2. Vi è vno Mercante, che hà due sorte di vino; vno di scuti 20. la botte l'altro de scuti 12. vi è chi ne voglia botte 300. dell'vno, & dell'altro per scuti 4500. che verria a scuti 15. la botte; se dimanda quante botte gli toccano del primo vino, & quante del 2. & fatto l'esemplo in questo modo, se dice, quante sono le differentie, fra li 20. & 15. sono 5. se pongono detti 5. incontro al 12. & le differentie fra le 12. & 15. sono 3.

spengono detti
3. incôtro al 20.
assumate det-
te differentie, so-
no 8. poi si fa
più volte la re-
gola del Tre per-
che questa rego-
la ogni cosa risol-
ue con detta re-
gola del Tre, si
dice dunque se
8. che sono le
differentie, dan-
no una botte,

| | Prezzo | Differentie |
|--------------|----------------------|-------------|
| Prezzo medio | 20 | 3 |
| | 15 | |
| | 12 | 5 |
| | | 8 |
| | Summa de differentie | |

quante ne daranno 3. & quante 5. conforme vedi in que-
sto esempio.

| | | | | |
|---|---|---|---------------|-------------|
| 8 | 1 | 3 | $\frac{3}{8}$ | del primo |
| | | 5 | $\frac{5}{8}$ | del secondo |

Si che si vede, che in una botte toccheriano 3. ottave
del primo vino, & 5. ottave del secondo di modo, che es-
sendo la botte di 8. barili conforme le Romane che toc-
cheriano 3. barili del primo vino, & 5. del secondo per
scuti 15. poi per sapere quante botte de vino toccheria-
no del primo, & quante del 2. si due. se scuti 15. hanno
dato $\frac{3}{8}$ del primo, & $\frac{5}{8}$ del 2. quanto ne daranno scuti
4500. conforme vedi in questo esempio.

| Scuti | Botte | Scuti | Botte |
|-------|--|-------|--|
| 15 | $\frac{3}{8}$ del 1.
$\frac{5}{8}$ del 2. | 4500 | 112 $\frac{1}{2}$ del 1.
187 $\frac{1}{2}$ del 2. |

Si

Si che per scuti 4500. toccheriano botte 112. & mezz
20 del primo vino. & botte 187½ del secondo vino.

E per sapere quādo dette operationi siano bene fatte, se
vede, cōforme habbiamo detto a farsi nella regola del 3.
cioè si moltiplica il primo numero con il 4. & il 2. con il
3. che daranno l'istesso numero, & si vede ancora dalla
proportionione, che tiene il primo con il 2. & il 3. con il 4.

Dub. 2. Sono due sorte di tela, una, che va giulij 7½
la canna, l'altra giulij 12. la canna, & i è vnc Mercante,
che desidera 500. canne di dette tele, si dimanda quanto
canne gli tocca della prima tela, & quante della seconda
per scuti 500. che verriano 10. giulij la canna? se ritro-
uano le differen-
tie di detti prez-
zi, che sono 45.
cōforme habbia-
mo fatto nell' al-
tri esempi, poi
si formano le re-
gole del Tre con
porre sempre le
differētie nel pri-
mo loco, & si di-
ce se 45. danno
una canna, quā-
te ne darāno 20.
& quante 25. cō
forme vedi in questo esempio, & nota, che li giulij sono
fatti baiocchi.

| | Prezzo | Differentie |
|--------------|----------------------|-------------|
| Prezzo medio | 75 | 20 |
| | 100 | |
| | 120 | 25 |
| | | 45 |
| | Summa de differentie | |

45 1 20 daranno $\frac{20}{45}$ cioè $\frac{4}{9}$ della 1.
25 25 $\frac{25}{45}$ cioè $\frac{5}{9}$ della 2.

Doue si vede, che di una canna con farne noue parti,
 ne toccariano 4. parte della prima tela, & 5. della 2. per
 giulij 10. è per sapere poi quante canne toccariano della
 prima, & quante della seconda per scuti 500. se diria se
 giulij 10. hanno dato $\frac{4}{5}$ della prima, & $\frac{5}{5}$ della 2. quan-
 te ne daranno scuti 500 conforme vedi in questo esem-
 pio.

| Giulij | Canne | Giulij | Canne |
|--------|---------------|--------|----------------------------|
| 10 | $\frac{4}{5}$ | 5000 | 222 $\frac{2}{5}$ della 1. |
| | $\frac{5}{5}$ | | 277 $\frac{7}{5}$ della 2. |

Dub. 4. Sono tre sorte di panno di diuerso prezzo,
 vno costa 5. scuti la canna, il 2. costa scuti 7. & il 3. scu-
 ti 10. vi è vno Mercante, che con scuti 1500. vuole
 canne 200. di detti panni; se dimanda quante canne gli
 tocca per ciascheduno panno? In detto, & simili casi, si
 hà da ritrouare primieramente il prezzo quanto vuole
 pagare le canne di detti panni, quale prezzo è di bisogno
 non sia minore di 5. scuti, ne maggiore di 10. scuti la can-
 na, poiche si con diuidere detti scuti 1500. venisse quat-
 tro scuti la canna, costui non potria hauere ne anco dell'
 infimo panno canne 200. & così ancora se con detta di-
 uisione venisse 15. scuti la canna, gli toccariano più di
 200. canne etiam del panno maggiore, di moao, che il
 prezzo si offerisce, bisogna sia prezzo medio per sapere
 dunque si detta offerta sia ben fatte, & quanto verrà
 canna di detti panni, si cognoice per la regola del 3. poi-
 che si canne 200. danno 1500. canna una quanto darà?
 come si vede in questo esempio.

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| Canne | Scuti | Canna | Scuti |
| 300 | 1500 | 1 | 7½ |

Si vede dunque detta offerta essere ben fatta, perche da uno prezzo fra il primo prezzo di scuti 5. & fra l'ultimo de scuti 10. per sapere poi quante canne gli tocchiano di tutte tre sorte di panno; se ritrouano prima le sue differentie in questo modo; si fa prima l'allegatione fra il primo 5. con il 10. ouero fra il 7. & il dieci perche detti 7½ è prezzo medio dell'uno, & dell'altro; doppo si dice, che differentia è fra il 7. & 7½ si vede, che è ½ si pone detto dimidio incontro al dieci & la differentia si à il 10. con detti 7½ sono 2½ quali si pongono incontro al 7. di mezzo; poi si fa l'allegatione fra il 5. & dieci, & si vede, che fra det

to 5. con il prezzo medio de 7½ vi è differentia 2½ quali si pongono incontro al 10. appresso del ½ è da 10. al 7½ vi è anco differentia 2½ & si pongono incontro al 7 poi si assummano dette differentie, è fanno 8. conforme

| Prezzo medio | Prezzo | Differentie |
|--------------|----------------------|-------------|
| | 5 | 2½ |
| | 7 | 2½ |
| | 7½ | 10 |
| | 10 | ½ |
| | | 2½ |
| | | 8 |
| | Summe de differentie | |

il tutto vedi fatto in questo esempio, & ciò fatto; se ritroua per la regola del 3. quante canne tocca di ciascheduno

pan-

114 Delle Allegationi Trattato V.

panno a detto Mercante per scuti 1500. mà prima si dice, se 8. differentie danno una canna, quante ne daranno $2\frac{1}{2}$ & $2\frac{1}{2}$ & 3. conforme si vede in questo esempio.

$$8 \quad 1 \quad \left\{ \begin{array}{l} 2\frac{1}{2} \\ 2\frac{1}{2} \\ 3 \end{array} \right\} \quad \text{daranno} \quad \begin{array}{l} \frac{5}{16} \text{ del 1.} \\ \frac{5}{16} \text{ del 2.} \\ \frac{3}{8} \text{ del 3.} \end{array}$$

Doue si vede, che in una canna toccariano palmi $2\frac{1}{2}$ del primo $2\frac{1}{2}$ del 2. & 3. palmi del 3. quante canne dunque daranno di tutte tre sorte di panno scuti 1500. si vede da questo esempio.

| Scuti | Canne | Scuti | Canne |
|----------------|---|-------|------------------------|
| | $\left\{ \begin{array}{l} \frac{5}{16} \\ \frac{5}{16} \\ \frac{3}{8} \end{array} \right\}$ | | $62\frac{1}{2}$ del 1. |
| $7\frac{1}{2}$ | | 1500 | $62\frac{1}{2}$ del 2. |
| | | | 75 del 3. |
| | | | <hr/> |
| | | | 200 |

Dub. 5. Sono tre sorte d'argento uno, che vale 30. scuti la libra, il 2. 26. & il 3. 24. vi è uno, che ne vuole libre 100. di tutte tre le sorti per scuti 2600. quali usati per la regola del 3. si vedè, che verria la canna scuti 26. conforme vedi in questo esempio.

| Libre | Scuti | Libra | Scuti |
|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 2600 | 1 | 26 |

Ritrouato il prezzo medio si pigliano le differentie, conforme si è fatto di sopra, & conforme si vede fatto in questo esempio; & allegando il 30. con il 24. si vede, che fra il 30. con il 26. prezzo medio, vi sono 4. de diffe-

ferentia, quali si pongono incontro al 24. & le differentie frà 24. & 26. prezzo medio, sono 2 & si pongono incontro al 30. doppò si fa l'allegatione frà il 26. & 24. ouero con il 30. di sopra, ma fatto nel primo modo, conforme sta fatto in detto

| Prezzo | | Differentie | |
|----------------------|-------|-------------|---|
| Prezzo medio | 30 | 2 | |
| | 26 | 2 | |
| | 24 | 4 | 0 |
| | <hr/> | | 8 |
| Summa de differentie | | | |

esempio, si vede, che non è differentia alcuna frà il 26. cò prezzo medio, che è similmente 26. però si fa zero incontro al 24. è doppò il primo 4. di differentia, & ritornando a pigliare le differentie frà li 24. & 26 sono 2. quali si pongono incontro al 26. assummate poi dette differentie, sono 8. & si dice, per la regola del 3. si 8. differentie danno una canna, che daranno 2, 2. & 4. conforme vedi in questo esempio.

$$8 \quad 1 \quad \left\{ \begin{array}{l} 2 \\ 2 \\ 4 \end{array} \right\} \quad \text{daranno} \quad \begin{array}{l} \frac{2}{3} \text{ del } 1. \\ \frac{2}{3} \text{ del } 2. \\ \frac{4}{3} \text{ del } 3. \end{array}$$

Di modo, che per scuti 26. haueria $\frac{2}{3}$ del primo argento $\frac{2}{3}$ del 2. & $\frac{4}{3}$ del 3. per sapere poi quante libbre gli toccherà di ciascheduno di detti argenti, si dice similmente per la regola del 3. si scuti 26. hanno dato $\frac{2}{3}$ del primo $\frac{2}{3}$ del

116 Delle Allegationi Trattato V.

del 2. & $\frac{1}{2}$ del 3 quanto ne daranno scuti 2600. conforme vedi in questo esempio.

| Scuti | Libre | Scuti | Libre |
|-------|---------------|-------|-----------|
| 26 | $\frac{2}{3}$ | 2600 | 25 del 1. |
| | $\frac{2}{3}$ | | 25 del 2. |
| | $\frac{1}{3}$ | | 50 del 3. |

Mà perche habbiamo detto, che il prezzo del secondo argèto si poteva allegare tãto cõ il prezzo del 1. quãto cõ il prezzo del 3. all' hora saria venuto l' esempio a questo modo, & le differentie sariano 10. si diria dunque, se differentie 10. danno una libra, quanto ne daranno le differentie

| | Prezzo | Differentie |
|--------------|----------------------|-------------|
| Prezzo medio | 30 | 2 0 |
| | 26 | 4 |
| | 24 | 4 |
| | | 10 |
| | Summa di differentie | |

2. 4. & 4. conforme si vede in questo esempio.

10 1 $\left\{ \begin{matrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{matrix} \right\}$ daranno $\frac{2}{10}$ cioè $\frac{1}{5}$ del 1.
 $\frac{4}{10}$ cioè $\frac{2}{5}$ del 2.
 $\frac{4}{10}$ cioè $\frac{2}{5}$ del 3.

Per sapere poi quante libbre ne gli toccherà di ciascuna sorte d' argento, se diria, se scuti 26. hanno dato $\frac{2}{5}$ del

del 1. $\frac{2}{7}$ del 2. $\frac{2}{7}$ del 3. che cosa daranno scuti 2600.
conforme vedi in questo esempio.

| Scuti | Libre | Scuti | Libre |
|-------|---|-----------|-------------------------------------|
| 26 | $\left\{ \begin{smallmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{smallmatrix} \right\}$ | 2600 | 20 del 1.
40 del 2.
40 del 3. |
| | | <hr/> 100 | |

Dub. 6. Sono quattro sorte d'Aromati, cioè pepe, che
val 4. giulij la libra; garofali, che vale a 2. giulij la li-
bra, cannella, che vale a 6. giulij la libra, & Zaffarano,
che vale 10. giulij la libra; desidera un Mercante libre
100. di detti Aromati per scuti 70. che viene a 7 giulij
la libra; desidera sapere quante libre gli toccano di cias-
cheduno di detti Aromati, se ritrouano primieramente
le differentie, cō-

forme si è fatto
nell' altri esem-
pij; mà in questo
esempio si alle-
gano prima li 4.
con li 10. & poi
il 3. con l' istesso
10. & similmen-
te il 6. con detto
10. assummate
poi tutte le diffe-
rentie sono 17. si
dice dunque per
la regola del 2.

| Prezzo | | Differentie | |
|-------------------|----|----------------------|--|
| Prezzo medio
7 | 4 | 3 | |
| | 3 | 3 | |
| | 6 | 3 | |
| | 10 | 3. 4. 1 | |
| | | <hr/> 17 | |
| | | Summa di differentie | |

118 Delle Allegationi Trattato V.

se differentie 17 danno una libra, quante ne daranno 3.
3. 3. & 8. conforme si vede in questo esempio.

| | | | | |
|----|---|---|---------|--|
| 17 | 1 | $\left\{ \begin{array}{c} 3 \\ 3 \\ 3 \end{array} \right\}$
$\left\{ \begin{array}{c} 3 \\ 8 \end{array} \right\}$ | daranno | $\frac{3}{17}$
$\frac{3}{17}$
$\frac{3}{17}$
$\frac{3}{17}$
$\frac{8}{17}$ |
|----|---|---|---------|--|

Per sapere poi quante libbre ne gli toccaria per ciasche-
duno di detti Aromati per scuti 70. si dice per l'istessa
regola del 3. se giulij 7. hanno dato $\frac{3}{17}$ del 1. $\frac{3}{17}$ del 2.
 $\frac{3}{17}$ del 3. & $\frac{8}{17}$ del 4. che cosa daranno giulij 700. con-
forme vedi in questo esempio.

| Giulij | | Giulij | |
|--------|----------------|--------|----------------------------|
| | $\frac{3}{17}$ | | $17 \frac{77}{119}$ del 1. |
| | $\frac{3}{17}$ | | $17 \frac{77}{119}$ del 2. |
| 7 | $\frac{3}{17}$ | 700 | $17 \frac{77}{119}$ del 3. |
| | $\frac{8}{17}$ | | $47 \frac{7}{119}$ del 4. |

In questo esempio si è da notare, che il prezzo medio
di 7. si pone in mezzo del 6. & 10. per significare, che
tutti li prezzi di detto esempio, si devono allegare con l'
ultimo, cioè con il 10. poi che detto 7. non si può chia-
mare prezzo medio del 4. & 3. né di 3. & 6. però si pig-
liano le differentie fra il primo 4. & 7. che sono 3. &
si pongono incontro al 10. poi si pigliano le differentie
del 10. con il 7. che sono 3. & si pongono incontro al 7.
poi

poi si pigliauo le differentie del secondo prezzo 3. in 7. che sono 4. & si pongono al 10. doppo le prime differentie 3. & si pigliano di nouo le differentie del 10. con il 7. che sono 3 & si pongono incontro al secondo prezzo 3. con il quale si è fatta l'allegatione, doppo si pigliano le differentie del 6. con 7. che è vno, & si pone al 11. nel 3. 10. delle differentie del 10. & di nouo pigliando le differentie del 10. che sono 3. si pongono incontro al 6. con il quale si è fatta l'allegatione; di modo, che il 10. viene ad hauere tre sorte di differentie, perche si è fatta l'allegatione con tre numeri, conforme il tutto vedi nel detto esemplo.

Mà se il 2. o 3. prezzo fosse stato 8. o 7. all'hora toc-

cava porfi il prezzo medio in mezzo fra in 2. & 3. prezzo, conforme vedi in questo esemplo, & se fariano le operationi con le differentie, le quali sono 11. conforme si è fatto di sopra.

| | Prezzo | Differentie |
|--------------|----------------------|-------------|
| Prezzo medio | 4 | 3 |
| | 3 | 1 |
| | 8 | 4 |
| | 10 | 3 |
| | | 11 |
| | Summa di differentie | |

Così ancora si detti Aromati fossero de cinque sorti, cioè pepe, garofali, cannella, zaffarano, & noce muscata, & li prezzi fossero 4. 3. 6. 10. & 8. è detto Mercante di tutti, ne volesse libbre 100. per scuti 70. in tal caso l'esemplo verria in questo modo, poi si pigliano le dif-

differentie fra il
4. & 7. che sono
3. quale si pon-
gono incontro l'
otto, & così an-
cora le differen-
tie fra 8 & 7 so-
no vno, si pone
incontro al 4 ap-
pressi. si pigliano
le differentie del
3. con detto 7.
che sono 4. quali
si pongono incon-
tro al 10. & le

differentie di detti 10. con 7. che sono 3. & si pongono
incontro al 3. poi si fa l' allegatione fra il 6. & 8. & se
potria fare ancora con il 10. perche detto 7. è prezzo
medio dell' vno, & l' altro la differentia dunque del 6. è
vno, & si pone incontro l' otto come vedi essere fatto, &
la differentia similmente di 8. con il 7. è vno, quale si
pone incontro al 6. & Summate tutte dette differentie,
sono 3. dipoi si forma la regola del 3. due volte, pri-
mamente si dice, se le differentie 13. daranno vna li-
bra, che cosa darà 1. 3. 1. 4. & 4. conforme vedi in que-
sto esempio.

| Prezzo | | Differentie |
|----------------------|----|-------------|
| 7 | 4 | 1 |
| | 3 | 3 |
| | 6 | 1 |
| | 10 | 4 |
| | 8 | 3. 1. |
| <hr/> | | <hr/> |
| | | 13 |
| <hr/> | | |
| Summa di differentie | | |

| | | | |
|-------|---|---|-----------------------|
| 13 | I | I | $\frac{1}{11}$ del 1. |
| | | 3 | $\frac{3}{11}$ del 2. |
| | | I | $\frac{1}{11}$ del 3. |
| | | 4 | $\frac{4}{11}$ del 4. |
| | | 4 | $\frac{4}{11}$ del 5. |
| Dipoi | | | |

Delle Allegationi Trattato V. 121

Dipoi si dice se giulij 7. danno $\frac{1}{11}$ del 1. $\frac{3}{11}$ del 2. $\frac{7}{11}$ del 3. $\frac{4}{11}$ del 4. & $\frac{4}{11}$ del 5. che cosa daranno giulij 700. conforme vedi in questo esempio.

Giulij

7

$\frac{1}{11}$
 $\frac{3}{11}$
 $\frac{7}{11}$
 $\frac{4}{11}$
 $\frac{4}{11}$

Giulij

700

$7\frac{63}{11}$ del 1.
 $23\frac{7}{11}$ del 2.
 $7\frac{63}{11}$ del 3.
 $30\frac{70}{11}$ del 4.
 $30\frac{70}{11}$ del 5.

In questo esempio è similmente da notare, che il 4. primo conforme si è allegato con l'otto, si poteua ancora allegare cō il 10. come habbiamo detto di sopra, così ancora il 3. conforme si è allegato con il 10. si poteua allegare con l'otto, & si ancora il 6 si poteua allegare con il 10. di modo, che quando occorrono diuersi prezzi, sempre si possono allegare

l'uno con l'altro, purchè detto prezzo medio, si possi dire medio, a rispetto di detti 2. prezzi, che si bāno d'allegare, di modo, che questo esempio allegato a quest'altro modo, saria venuto di quest'altra maniera.

Poi si saria pi-

| Prezzo | | Differentie | |
|--------------|----|----------------------|---|
| Prezzo medio | 4 | 3 | |
| | 3 | 1 | |
| | 6 | 3 | |
| | 10 | 3 | 1 |
| | 8 | 4 | |
| | | 15 | |
| | | Summa di differentie | |

H. glia-

gliato la summa delle differentie, che sono 15. & facte l'operationi, conforme si è fatto di sopra; cioè se differentie 15. danno una libra, che daranno 3. 1. 3. 4. & 4. conforme si vede fatto in questo esempio.

| | | | | | |
|----|---|---|---------|----------------|--------|
| | | 3 | | $\frac{3}{15}$ | del 1. |
| | | 1 | | $\frac{1}{15}$ | del 2. |
| 15 | 1 | 3 | daranno | $\frac{3}{15}$ | del 3. |
| | | 4 | | $\frac{4}{15}$ | del 4. |
| | | 4 | | $\frac{4}{15}$ | del 5. |

Et se giulij 7. hanno dato $\frac{3}{15}$ $\frac{1}{15}$ $\frac{3}{15}$ $\frac{4}{15}$ & $\frac{4}{15}$ di detti Aromati, che cosa daranno giulij 700. conforme si vede in questo esempio.

| Giulij | | Giulij | |
|--------|----------------|------------------|--------|
| | $\frac{3}{15}$ | 20 | del 1. |
| | $\frac{1}{15}$ | $6\frac{7}{10}$ | del 2. |
| 7 | $\frac{3}{15}$ | 20 | del 3. |
| | $\frac{4}{15}$ | $26\frac{7}{10}$ | del 4. |
| | $\frac{4}{15}$ | $26\frac{7}{10}$ | del 5. |

Si può nondimeno questo esempio allegarsi di vn'altro modo, cioè, allegando prima il 4. con l'otto, & poi di nuovo con il 10. così ancora il 3. con l'otto, & con il 10. similmente il 6. con il 10. & con l'otto di modo, che detto esempio verria in questo modo, & pigliando le differentie, che saranno 28. si fanno l'operationi, conforme di sopra, formando prima la regola del 3. che verria nel seguente modo.

| Prezzo | | Differentie | | |
|----------------------|----|-------------|---|---|
| Prezzo medio | 4 | 1 | 3 | |
| | 3 | 1 | 3 | |
| | 6 | 3 | 5 | |
| | 10 | 3 | 4 | 1 |
| | 8 | 3 | 4 | 1 |
| | | 18 | | |
| Summa di differentie | | | | |

$$28 \text{ } 1 \left\{ \begin{array}{l} 4 \\ 4 \\ 4 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} 8 \\ 8 \end{array} \right\} \text{ daranno } \begin{array}{l} \frac{4}{31} \text{ del } 1. \\ \frac{4}{31} \text{ del } 2. \\ \frac{4}{31} \text{ del } 3. \\ \frac{8}{31} \text{ del } 4. \\ \frac{8}{31} \text{ del } 5. \end{array}$$

Dipoi si dice, se giulij 7. danno una libra così diuiſa, che daranno giulij 700. conforme quini vedi.

| Giulij | | Giulij | |
|--------|--|--------|---|
| 7 | $\frac{4}{31}$
$\frac{4}{31}$
$\frac{4}{31}$
$\frac{8}{31}$
$\frac{8}{31}$
$\frac{8}{31}$ | 700 | $14\frac{5}{16}$ del 1.
$14\frac{5}{16}$ del 2.
$14\frac{5}{16}$ del 3.
$28\frac{1}{16}$ del 4.
$28\frac{1}{16}$ del 5. |

Prob. 7. Vno Mercante con 600. ſcuti vuole com-
H 2 pra.

124 Delle Allegationi Trattato V.

prare 6. sorte de Aromati, & ne desidera 600. libre, il primo è il pepe, che costa 8. giulij la libra, il 2. sono garofali, che costano 6. giulij la libra, il 3. è zaffarano, che costa 9. giulij la libra il 4. è noce moscata, che costa 11. giulij la libra; il 5. è cinnamomo, che vale 12. giulij la libra, & il 6. sono spetie, che vanno 14. giulij la libra; se dimanda quante libre, di ciascheduno di detti Aromati hauerà detto Mercante, per 600. scuti, & già si vede, che il prezzo medio è 10. giulij si possono, poi fare le allegationi frà il

pepe, & spetie, di poi frà li garofali, & cinnamomo & ultimamente frà il zaffarano, & noce mascato, perche, frà tutti questi prezzi, il 10. è prezzo medio, le differentie dunque tra l'otto con il 10. sono 2. si pongono dette 2. incontro al 14.

| | | Prezzo | Differentie |
|--------------|----|----------------------|-------------|
| Prezzo medio | 10 | Pepe | 8 4 |
| | | Garofali | 6 2 |
| | | Zaffarano | 9 1 |
| | | Noce mos. | 11 1 |
| | | Cinnam. | 12 4 |
| | | Spetie | 14 2 |
| | | 14 | |
| | | Summe di differentie | |

& le differentie delli 14. con dieci, sono 4. & si pongono l'otto, le differentie del 6. delli garofali sono 4. con il 10 & le differentie di 12. al cinnamomo sono 2. le 4. si pongono incontro al 12. & le 2. incontro al 6. per la terza allegatione, la differentia del 9. con li 10. è uno, che si pone incontro li 11. & la differentia delli 11. con 10. è similmente 1. & si pone incontro al 9. si potrebbe ancora fare la prima allegatione frà l'otto, & li 11. la secon-
da

da frà il 6 & 12
& la terza frà il
9. & 14. & ver
ria l' esempio in
questo modo, poi
si fanno le opera
zioni due volte
per la regola del
tre conforme hab
biamo detto far
si in tutti l' altri
esempij già det
ti, il che può ba
stare per dette al
legationi.

| Prezzo | | Differentie |
|--------------------|----|----------------------|
| Prezzo medio
10 | 8 | 1 |
| | 6 | 2 |
| | 9 | 4 |
| | 11 | 2 |
| | 12 | 4 |
| | 14 | 1 |
| | | 14 |
| | | Summa de differentie |



TRATTO SESTO

Delle false positioni.

Che cosa sia falsa positione, & come si facci
detta regola. Cap. I:

Falsa positione, non è altro, che uno numero, il quale si piglia a per sodisfare à qualche dubbio proposto. & benchè con tale numero non si sodisfi, per ritrouarsi falsamente pigliato, nondimeno da detto numero falso, le viene in cognitione della verità del dubbio proposto. Detta positione può essere di due modi, cioè semplice, ò doppia; la semplice è, quando al dubbio si sodisfa con pigliare uno numero solo qual si sia; che per ciò, si dice regola del falso semplice, la doppia è, quando per sodisfare à qualche dubbio proposto, si pigliano 2. numeri, li quali benchè falsi, fanno nondimeno venire in cognitione della verità, & questa suole chiamarsi regola del falso doppio, conforme il tutto chiariremo con esempi.

Differiscono queste due regole frà di se, in quanto, che con la seconda regola si possono sodisfare à tutti li dubbj, quali si sciogliono per la prima regola; mà non già quelli, che si sciogliono per la seconda, si possono sciogliere per la prima; quelli poi dubbj si sciogliono per la prima regola, quali hanno l' istessa proportionè in qualsiuoglia numero, grande, ò picciolo, che sia; come $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ così ancora li numeri duplicati, triplicati, quadruplicati, &c. di modo, che essendo assai dubbj, che si possono sciogliere per detta prima regola con più facilità, che si se sciogliessero per la
secon-

seconda; per tanto in questo primo capitolo diremo solo delli dubbij, che si sciogliono con questa prima regola, & nel 2. diremo della seconda regola.

Di modo, che essendo proposto qualche dubbio, si piglia qual numero si sia, & si con quello si sodisfa bene, & quando non si sodisfa, si viene in cognitione della verita per la regola del tre, conforme mostreremo con esempj.

Dub. 1. Tre Mercanti hanno caricato uno vascello con 7200. scuti di mercantie, con questo ordine, che il secondo Mercante vi ha messo il doppio di quello ha messo il primo, & il 3. ha messo triplicatamente di quello ha messo il 2. è fatta tempesta nel mare, si perdono tutte dette mercantie; se dimanda quanto ciascheduno ha perso in detta tempesta? poniamo, che il primo habbi messo scuti 500. & per consequenza quelli del 2. sariano 1000. & quelli del 3. 3000. quali uniti insieme summano 4500. & noi habbiamo di bisogno, che summassero 7200. di modo, che la prima positione pigliata di scuti 500. è falsa, nondimeno da detta falsa haueremo la vera, si dice dunque per la regola del tre, si scuti 4500. prouengono da 500. da dove proueniranno scuti 7200. come questo esemplo dimostra.

4500 500 7200 800

Siche dunque la prima positione douea essere di scuti 800. per il primo Mercante, & per consequenza quelli del 2. sariano 1600. & quelli del 3. 4800. quali uniti insieme summano 7200. Si possono ancora ritrouare li denari del 2. & 3. Mercante con l'istesse loro positioni, dicendo, si 4500. prouengono da 1000. positione del 2. & 3000. positione del 3. da dove proueniranno li 7200.

116 Delle Allegationi Trattato V.

del 2. & $\frac{4}{5}$ del 3 quanto ne daranno scuti 2600. conforme vedi in questo esempio.

| Scuti | Libre | Scuti | Libre |
|-------|---|-------|-------------------------------------|
| 26 | $\left\{ \begin{array}{l} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{5} \\ \frac{4}{5} \end{array} \right\}$ | 2600 | 25 del 1.
25 del 2.
50 del 3. |

Mà perche habbiamo detto, che il prezzo del secondo argèto si poteva allegare tãto cõ il prezzo del 1. quãto cõ il prezzo del 3. all' hora saria venuto l' esempio a questo modo, & le differentie sariano 10. si diria dunque, se differentie 10 danno una libra, quanto ne daranno le differentie

| | Prezzo | Differentie |
|--------------|----------------------|-------------|
| Prezzo medio | 30 | 2 0 |
| | 26 | 4 |
| | 24 | 4 |
| | | 10 |
| | Summa di differentie | |

2. 4. & 4. conforme si vede in questo esempio.

10 1 $\left\{ \begin{array}{l} 2 \\ 4 \\ 4 \end{array} \right\}$ daranno $\frac{2}{15}$ cioè $\frac{1}{5}$ del 1.
 $\frac{4}{15}$ cioè $\frac{2}{5}$ del 2.
 $\frac{4}{15}$ cioè $\frac{2}{5}$ del 3.

Per sapere poi quante libre ne gli toccaria d. ciascheduna sorte d' argento, se diria, se scuti 26. hanno dato $\frac{2}{5}$ del

del 1. $\frac{2}{3}$ del 2. $\frac{1}{2}$ del 3. che cosa daranno scuti 2600.
conforme vedi in questo esempio.

| Scuti | Libre | Scuti | Libre |
|-------|--|-------|-----------|
| 26 | $\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} \end{array} \right\}$ | 2600 | 20 del 1. |
| | | | 40 del 2. |
| | | | 40 del 3. |
| | | | <hr/> 100 |

Dub. 6. Sono quattro sorte d'Aromati, cioè pepe, che vale 4. giulij la libra; garofali, che vale a 2. giulij la libra, cannella, che vale a 6. giulij la libra, & Zaffarano, che vale 10. giulij la libra; desidera vn Mercante libbre 100. di detti Aromati per scuti 70. che viene a 7 giulij la libra; desidera sapere quante libbre gli toccano di ciascheduno di detti Aromati, se ritrouano primieramente le differentie, cō-

forme si è fatto nell'altri esempi; mà in questo esempio si allegano prima li 4. con li 10. & poi il 3. con l'istesso 10. & similmente il 6. con detto 10. assummate poi tutte le differentie sono 17. si dice dunque per la regola del 3.

| Prezzo medio | Prezzo | Differentie |
|--------------|----------------------|-------------|
| | 4 | 3 |
| | 3 | 3 |
| | 6 | 3 |
| | 7 | 10 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | | 17 |
| | Summa di differentie | |

se differentie 17 danno una libra, quante ne daranno 3.
3. 3. & 8. conforme si vede in questo esempio.

$$\begin{array}{rcl}
 17 & 1 & \left\{ \begin{array}{l} 3 \\ 3 \\ 3 \\ 8 \end{array} \right\} \text{ daranno } \begin{array}{r} \frac{3}{17} \\ \frac{3}{17} \\ \frac{3}{17} \\ \frac{8}{17} \end{array}
 \end{array}$$

Per sapere poi quante libbre ne gli toccaria per ciasche-
duno di detti Aromati per scuti 70. si dice per l'istessa
regola del 3. se giulij 7. hanno dato $\frac{3}{17}$ del 1. $\frac{3}{17}$ del 2.
 $\frac{3}{17}$ del 3. & $\frac{8}{17}$ del 4. che cosa daranno giulij 700. con-
forme vedi in questo esempio.

| Giulij | | Giulij | |
|--------|----------------|--------|-------------------------|
| | $\frac{3}{17}$ | 17 | $\frac{77}{119}$ del 1. |
| | $\frac{3}{17}$ | 17 | $\frac{77}{119}$ del 2. |
| 7 | $\frac{3}{17}$ | 17 | $\frac{77}{119}$ del 3. |
| | $\frac{8}{17}$ | 47 | $\frac{7}{119}$ del 4. |
| | $\frac{8}{17}$ | 700 | |

In questo esempio si è da notare, che il prezzo medio
di 7. si pone in mezzo del 6. & 10. per significare, che
tutti li prezzi di detto esempio, si devono allegare con l'
ultimo, cioè con il 10. poi che detto 7. non si può chia-
mare prezzo medio del 4. & 3. né di 3. & 6. però si pig-
liano le differentie fra il primo 4. & 7. che sono 3. &
si pongono incontro al 10. poi si pigliano le differentie
del 10. con il 7. che sono 3. & si pongono incontro al 7.
poi

poi si pigliauo le differentie del secondo prezzo 3. in 7. che sono 4. & si pongono al 10. doppo le prime differentie 3. & si pigliano di nouo le differentie del 10. con il 7. che sono 3 & si pongono incontro al secondo prezzo 3. con il quale si è fatta l'allegatione, doppo si pigliano le differentie del 6. con 7. che è vno, & si pone al 1. nel 3. 10. & delle differentie del 10. & di nuouo pigliando le differentie del 10. che sono 3. si pongono incontro al 6. con il quale si è fatta l'allegatione; di modo, che il 10. viene ad hauere tre sorte di differentie, perche si è fatta l'allegatione con tre numeri, conforme il tutto vedi nel detto esempin.

Mà se il 2. ò 3. prezzo fosse stato 8. ò 7. all'hora toc-

cava porsi il prezzo medio in mezzo fra in 2. & 3. prezzo, conforme vedi in questo esempio, & se fariano le operationi con le differentie, le quali sono 11. conforme si è fatto di sopra.

| Prezzo | | Differentie |
|----------------------|----|-------------|
| Prezzo medio
7 | 4 | 3 |
| | 3 | 1 |
| | 8 | 4 |
| | 10 | 3 |
| | | 11 |
| Summa di differentie | | |

Così ancora si detti Aromati fossero de cinque

sorti, cioè pepe, garofali, cannella, Zaffarano, & noce muscata, & li prezzi fossero 4. 3. 6. 10. & 8. è detto Mercante di tutti, ne volesse libbre 100. per scuti 70. in tal caso l'esempio verria in questo modo, poi si pigliano le dif-

dis-

differentie fra il
4. & 7. che sono
3. quale si pon-
gono incontro l'
otto, & così an-
cora le differen-
tie fra 8 & 7 so-
no uno, si pone
incontro al 4 ap-
pressi: si pigliano
le differentie del
3. con detto 7.
che sono 4. quali
si pongono incon-
tro al 10. & le

| Prezzo | | Differentie |
|----------------------|----|-------------|
| Prezzo medio
7 | 4 | 1 |
| | 3 | 3 |
| | 6 | 1 |
| | 10 | 4 |
| | 8 | 3. 1. |
| | | 13 |
| Summa di differentie | | |

differentie di detti 10. con 7. che sono 3. & si pongono
incontro al 3. poi si fa l' allegatione fra il 6. & 8. & se
potria fare ancora con il 10. perche detto 7. è prezzo
medio dell' uno, & l'altro. la differentia dunque del 6. è
uno, & si pone incontro l'otto come vedi essere fatto, &
la differentia similmente di 8. con il 7. è uno, quale si
pone incontro al 6. & summate tutte dette differentie,
sono 3. dipoi si forma la regola del 3. due volte, pri-
mamente si dice, se le differentie 13. daranno una li-
bra, che cosa darà 1. 3. 1. 4. & 4. conforme vedi in que-
sto esempio.

| | | | |
|-------|---|-----------|-----------------------|
| 13 | I | I | $\frac{1}{13}$ del 1. |
| | | 3 | $\frac{3}{13}$ del 2. |
| | | I daranno | $\frac{1}{13}$ del 3. |
| | | 4 | $\frac{4}{13}$ del 4. |
| | | 4 | $\frac{4}{13}$ del 5. |
| Dipoi | | | |

Dipoi si dice se giulij 7. danno $\frac{1}{11}$ del 1. $\frac{3}{11}$ del 2. $\frac{1}{11}$ del 3. $\frac{4}{11}$ del 4. & $\frac{4}{11}$ del 5. che cosa daranno giulij 700. conforme vedi in questo esempio.

Giulij

Giulij

7

$\frac{1}{11}$
 $\frac{3}{11}$
 $\frac{1}{11}$
 $\frac{4}{11}$
 $\frac{4}{11}$

700

$7\frac{6}{11}$ del 1.
 $23\frac{7}{11}$ del 2.
 $7\frac{6}{11}$ del 3.
 $30\frac{7}{11}$ del 4.
 $30\frac{7}{11}$ del 5.

In questo esempio è similmente da notare, che il 4. primo conforme si è allegato con l'otto, si poteua ancora allegare cō il 10. come habbiamo detto di sopra, così ancora il 3. conforme si è allegato con il 10. si poteua allegare con l'otto, & si ancora il 6 si poteua allegare con il 10. di modo, che quando occorrono diuersi prezzi, sempre si possono allegare

l'uno con l'altro, purché detto prezzo medio, si possa dire medio, a rispetto di detti 2. prezzi, che si hanno d'allegare, di modo, che questo esempio allegato a quest'altro modo, saria venuto di quest'altra maniera.

| Prezzo | | Differentie | |
|----------------------|----|-------------|---|
| Prezzo medio | 4 | 3 | |
| | 3 | 1 | |
| | 6 | 3 | |
| | 10 | 3 | 1 |
| | 8 | 4 | |
| | | 15 | |
| Summa di differentie | | | |

Poi si saria pi-

122 Delle Allegationi Trattato V.

gliato la summa delle differentie, che sono 15. & facte l'operationi, conforme si è fatto di sopra; cioè se differentie 15. danno vna libra, che daranno 3. 1. 3. 4. & 4. conforme si vede fatto in questo esempio.

| | | | | | |
|----|---|---|---------|----------------|--------|
| | | 3 | | $\frac{3}{15}$ | del 1. |
| | | 1 | | $\frac{1}{15}$ | del 2. |
| 15 | 1 | 3 | daranno | $\frac{3}{15}$ | del 3. |
| | | 4 | | $\frac{4}{15}$ | del 4. |
| | | 4 | | $\frac{4}{15}$ | del 5. |

Et se giulij 7. hanno dato $\frac{3}{15}$ $\frac{1}{15}$ $\frac{3}{15}$ $\frac{4}{15}$ & $\frac{4}{15}$ di detti Aromati, che cosa daranno giulij 700. conforme si vede in questo esempio.

| Giulij | | Giulij | |
|--------|----------------|--------|---------------------------|
| | $\frac{3}{15}$ | | 20 del 1. |
| | $\frac{1}{15}$ | | $6\frac{70}{105}$ del 2. |
| 7 | $\frac{3}{15}$ | 700 | 20 del 3. |
| | $\frac{4}{15}$ | | $26\frac{70}{105}$ del 4. |
| | $\frac{4}{15}$ | | $26\frac{70}{105}$ del 5. |

Si può nondimeno questo esempio allegarsi di vn'altro modo, cioè, allegando prima il 4. con l'otto, & poi di nuovo con il 10. così ancora il 3. con l'otto, & con il 10. similmente il 6. con il 10. & con l'otto di modo, che detto esempio verria in questo modo, & pigliando le differentie, che saranno 28. si fanno l'operationi, conforme di sopra, formando prima la regola del 3. che verria nel seguente modo.

| Prezzo | | Differentie | |
|----------------------|----|-------------|---|
| Prezzo medio | 4 | 1 | 3 |
| | 3 | 1 | 3 |
| | 6 | 3 | 5 |
| | 10 | 3 | 4 |
| | 8 | 3 | 4 |
| | | 28 | |
| Summa di differentie | | | |

$28 \times \left\{ \begin{array}{l} 4 \\ 4 \\ 4 \end{array} \right\} \text{ daranno } \frac{4}{28} \text{ del } 1.$
 $\left\{ \begin{array}{l} 8 \\ 8 \end{array} \right\} \text{ daranno } \frac{4}{28} \text{ del } 2.$
 $\frac{4}{28} \text{ del } 3.$
 $\frac{8}{28} \text{ del } 4.$
 $\frac{8}{28} \text{ del } 5.$

Dipoi si dice, se giulij 7. danno una libra così di uisla, che daranno giulij 700. conforme quini vedi.

Giulij
 $7 \times \left\{ \begin{array}{l} \frac{4}{28} \\ \frac{4}{28} \\ \frac{4}{28} \\ \frac{8}{28} \\ \frac{8}{28} \end{array} \right\}$
Giulij
 $700 \times \left\{ \begin{array}{l} 14 \frac{5}{7} \text{ del } 1. \\ 14 \frac{5}{7} \text{ del } 2. \\ 14 \frac{5}{7} \text{ del } 3. \\ 28 \frac{11}{7} \text{ del } 4. \\ 28 \frac{11}{7} \text{ del } 5. \end{array} \right\}$

+ **Dub. 7.** Vno Mercante con 600. scuti vuole com-
 H 2 pra.

124 Delle Allegationi Trattato V.

prare 6. sorte de Aromati, & ne desidera 600. libre, il primo è il pepe, che costa 8. giulij la libra, il 2. sono garofali, che costano 6. giulij la libra, il 3. è zaffarano, che costa 9. giulij la libra il 4. è noce moscata, che costa 11. giulij la libra; il 5. è cinnamomo, che vale 12. giulij la libra, & il 6. sono spetie, che vanno 14. giulij la libra; se dimanda quante libre, di ciascheduno di detti Aromati hauerà detto Mercante, per 600. scuti, & già si vede, che il prezzo medio è 10. giulij si possono, poi fare le allegationi frà il

pepe, & spetie, di poi frà li garofali, & cinnamomo & ultimamente frà il zaffarano, & noce mascato, perche, frà tutti questi prezzi, il 10. è prezzo medio, le differentie dunque tra l'otto con il 10. sono 2. si pongono dette

2. incontro al 14

& le differentie delli 14. con dieci, sono 4. & si pongono l'otto, le differentie del 6. delli garofali sono 4. con il 10 & le differentie di 12. al cinnamomo sono 2. le 4. si pongono incontro al 12. & le 2. incontro al 6. per la terza allegatione, la differentia del 9. con li 10. è uno, che si pone incontro li 11. & la differentia delli 11. con 10. è similmente 1. & si pone incontro al 9. si potrebbe ancora fare la prima allegatione frà l'otto, & li 11. la seconda

| Prezzo | | Differentie | |
|----------------------|-----------|-------------|---|
| Prezzo medio
10 | Pepe | 8 | 4 |
| | Garofali | 6 | 2 |
| | Zaffarano | 9 | 1 |
| | Noce mos. | 11 | 1 |
| | Cinnam. | 12 | 4 |
| | Spetie | 14 | 2 |
| | | 14 | |
| Summe di differentie | | | |

da frà il 6 & 12
 & la terza frà il
 9. & 14. & ver
 ria l' esempio in
 questo modo, poi
 si fanno le opera
 zioni due volte
 per la regola del
 tre conforme hab
 biamo detto far
 si in tutti l' altri
 esempj già det
 ti, il che può ba
 stare per dette al
 legationi.

| Prezzo | | Differentie |
|--------------------|----|----------------------|
| Prezzo medio
10 | 8 | 1 |
| | 6 | 2 |
| | 9 | 4 |
| | 11 | 2 |
| | 12 | 4 |
| | 14 | 1 |
| | | 14 |
| | | Summa de differentie |



seconda; per tanto in questo primo capitolo diremo solo delli dubbj, che si sciogliono con questa prima regola, & nel 2. diremo della seconda regola.

Di modo, che essendo proposto qualche dubbio, si piglia qual numero si sia, & si con quello si sodisfa bene, & quando non si sodisfa, si viene in cognitione della verità per la regola del tre, conforme mostreremo con esempij.

Dub. 1. Tre Mercanti hanno caricato uno vascello con 7200. scuti di mercantie, con questo ordine, che il secondo Mercante vi ha messo il doppio di quello ha messo il primo, & il 3. ha messo triplicatamente di quello ha messo il 2. è fatta tempesta nel mare, si perdono tutte dette mercantie; se dimanda quanto ciascheduno ha perso in detta tempesta? poniamo, che il primo habbi messo scuti 500. & per consequenza quelli del 2. sariano 1000. & quelli del 3. 3000. quali uniti insieme summano 4500. & noi habbiamo di bisogno, che summassero 7200. di modo, che la prima positione pigliata di scuti 500. è falsa, nondimeno da detta falsa haueremo la vera, si dice dunque per la regola del tre, si scuti 4500. prouengono da 500. da doue proueniranno scuti 7200. come questo esempio dimostra.

4500 500 7200 800

Siche dunque la prima positione douea essere di scuti 800. per il primo Mercante, & per consequenza quelli del 2. sariano 1600. & quelli del 3. 4800. quali uniti insieme summano 7200. Si possono ancora ritrouare li denari del 2. & 3. Mercante con l' istesse loro positioni, dicendo, si 4500. prouengono da 1000. positione del 2. & 3000. positione del 3. da doue proueniranno li 7200.

H 4 con-

conforme dimostra questo esempio.

| | | | | |
|------|----|------------|------|------------|
| 4500 | da | 1000 del 2 | 7200 | 1600 del 1 |
| | | 3000 del 3 | | 4800 del 2 |

Nondimeno basta ritronare il primo numero vero, & poi facilmente, se cognoscono l'altri.

Dub. 2. Vno Signore fù dimandato quanto spendesse l'anno nella casa, rispose, che $\frac{2}{3}$ delli suoi denari andaua per vitto $\frac{1}{3}$ andaua per vestire, & $\frac{1}{6}$ per Seruitori, e corrozza, & in queste tre cose spendeua l'anno 6750. scuti, se dimanda quanto questo Signore hauesse di rendita l'anno? poniamo, che habbi scuti 12000. l'anno, & per conseguenza vno terzo sarà 4000. vno quarto sarà 3000. & vno sesto sarà 2000. quali uniti insieme, summano scuti 9000. & noi habbiamo di bisogno, che summassero 6750 di modo, che la prima positione di scuti 12000. è falsa, per ritronare la vera, diciamo; se scuti 9000. prouengono da scuti 12000. da doue proueniranno scuti 6750. conforme si vede in questo esempio.

| | | | | |
|------|----|-------|------|------|
| 9000 | da | 12000 | 6750 | 9000 |
|------|----|-------|------|------|

Di modo, che la prima positione vuole essere di scuti 9000. & tanta è la rendita di detto Signore poiche $\frac{2}{3}$ sono 3000. $\frac{1}{3}$ 2250. & $\frac{1}{6}$ 1500. quali uniti summano 6750.

Dub. 3. Vno Mercante, dimandato in quanto era fallito, rispose, che lui haueua perso il doppo di quello se ritrouaua al presente, anzi anora $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ più di quello si ritrouaua, quali denari se al presente hauesse, haueria scuti 12250. se dimanda quanti denari costui se ritroui, & quan-

quanti ne habbia perso? poniamo, che ne habbia 600.
 & così per cōsequenza, il duplicato perso, sariano 1200.
 & poi $\frac{1}{2}$ sariano 300. & $\frac{1}{4}$ sariano 150. quali tutti sum-
 mano scuti 2450. douenano summare 12250. diciamo
 dunque se li scuti 2450. prouengono da 600. da doue
 prouenirāno 12250. conforme si vede in questo esemplo.

2450 600 12250 3000

Si che li denari, che al presente si ritroua questo Mer-
 cante sono scuti 3000. & li denari persi sono scuti 9250.
 porche sottratti detti 3000. da 12250. restano 9250. &
 che sia il vero, il duplicato di 3000. sono 6000. la metà
 di 3000. sono 1500. & il 3. sarà 1000. & il 4. sarà 750
 quali summano scuti 9250. cioè li persi, a quali aggiunti
 li 3000. che al presente, summano scuti 12250.

Dub. 4. Vno Mercante hà comprato 2040. scuti
 di tre sorte di drappo con questa conditione, che il primo
 vagli tre volte di quello vale il secondo, & il secondo
 vagli quattro volte di quello vale il terzo. Si dimanda
 quanto detto Mercante habbi speso in cia)cheduno di que-
 sti drappi? poniamo, che nel primo habbi speso scuti 1200
 & per consequenza nel 2. 400. & nel 3. 100. detti as-
 summati insieme, fanno scuti 1700. douenano summare
 2040. Diciamo dunque se scuti 1700. prouengono da
 1200. da doue proueniranno scuti 2040. conforme vedi
 in questo esemplo.

1700 da 1200 2040 1440

Di modo, che scuti 1440. costa il primo drappo, il 2.
 per consequenza costa 480. & il 3. scuti 120. quali as-
 sum-

summati insieme fanno scuti 1440. è si vede similmente, che il primo costa tre volte più del 2. & il 2. quattro volte più del 3.

Dimandato vn Filosofo, quanti discepoli hauesse, & quanti Filosofi haueua fatto, rispose, che haueua fatto altre tanto Filosofi, quanti discipoli al presente si ritrouaua, anzi $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ & $\frac{1}{4}$ de più. di modo, che se vi fosse vn' altro sariano 112 si dimanda quanti discepoli hauesse all' hora detto Filosofo. Doue è da aduertire, che questo dubbio non si può sciogliere per questa regola, così però, conforme viene proposto per causa di quell' vno di più, il quale non hà proportionone alcuna con le parti proposte, si hà dunque da ritrouare vno numero, il quale duplicato, & poi aggiuntoui $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ & $\frac{1}{4}$ facci 111. al quale poi aggiunto vno facci 112 conforme al dubbio proposto, poniamo, che detto Filosofo habbi 24 discepoli, quali duplicati sono 48 vno dimidio, sono 12. vn 3. sono 8. & vn quarto sono 6. quali vnti con detti 48. summano 74. doue uano summare 111. diciamo dunque si 74. prouengono da 24. da doue proueniranno 111. conforme vedi in questo esempio.

74

24

111

36

Si che si vede, che li discepoli del Filosofo sono 36. poi che aggiuntoui altri 36. fanno 72. & vno dimidio, cioè 18. fanno 90. & $\frac{2}{3}$ cioè 12. fanno 102. & $\frac{1}{4}$ cioè 9. fanno 111. a quali aggiunto uno fanno 112.

Dub. 6. Vno Giocatore perse una volta giocando $\frac{1}{2}$ di li suoi denari, dopo ne perse $\frac{2}{3}$ di modo, che di tutti li denari, se ne restorno solamente scuti 300. si dimanda quanti scuti hauesse costui auanti, che giocasse, & quanti de-

denari perse in detto gioco; poniamo, che hauesse scuti 600 da quali leuati $\frac{1}{2}$ cioè scuti 200. & $\frac{2}{3}$ cioè scuti 240. restano scuti 160. doueriano restare 300. diciamo dunque, si scuti 160. prouengono da scuti 600. da doue proueniranno scuti 300. conforme si vede in questo esempio.

160 600 300 1125

Di modo, che haueua detto giocatore scuti 1125. & la prima volta perse scuti 375. cioè $\frac{1}{3}$ & la seconda volta scuti 450. cioè $\frac{2}{5}$ che summano scuti 825. persi, a quali aggiunti 300. ad esso rimasti fanno 1125. conforme vedi nell'esempio.

Dub. 7. Dimandato vn Mercante, quanto hauesse guadagnato in vna certa mercantia, rispose; hò guadagnato tanto, che $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ & $\frac{2}{5}$ di detti denari, summano scuti 178. si dimanda quanti denari guadagnasse costui in detta mercantia; poniamo, che fossero scuti 60. de quali $\frac{1}{2}$ sono 30. $\frac{1}{3}$ sono 20. $\frac{1}{4}$ sono 15. & $\frac{2}{5}$ sono 24. quali tutti summano 89 doueriano essere 178. diciamo dunque, se 89. prouengono da 60. da doue proueniranno 178. conforme vedi in questo esempio.

89 60 178 120

Si che sono li scuti guadagnati 120. de quali $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ & $\frac{2}{5}$ cioè 60. 40. 30. & 48. summano scuti 178.

Se alcuno dicesse. Ritrouatemi uno numero, dal quale sottratto $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ & $\frac{1}{4}$ il residuo sia 6. questi, & simili dubbij sogliono alle volte essere dimandati da ignorantij; poichè conforme è impossibile sottrarre 20. da 15. per essere minor numero il 15. che non è il 20. così ancora è igno-

vantia volgre sottraer dette parti da vno integro, essendo più dette parti, che non è vno integro.

Dub. 8. Dimandato vn certo huomo quanti denari hauesse in cassa, rispose non saperlo; ma sapena bene, che si à quelli, che lui hà, vi si aggiungerò $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ & $\frac{1}{4}$ di detti denari con altri scuti 50. hauerebbe scuti 250. per sapere detto dubbio, si sottraeno prima li 50. per la causa detta nel 5. Dub. & poi si hà da ritrouare vno numero, al quale aggiunto $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ siano scuti 200. à quali poi aggiunti li 50. faccino 250. Poniamo, che detto Morcante habbi scuti 48. à quali aggiunti 24. cioè $\frac{1}{2}$ & 16. cioè $\frac{1}{3}$ & 12. cioè $\frac{1}{4}$ summano scuti 100. doue uano summare scuti 200. diciamo dunque, si scuti 100. prouengono da 48. da doue proueniranno scuti 200. conforme vedi in questo esempio.

100

48

200

96

Sono dunque in detta cassa scuti 96. à quali aggiunti $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ cioè 48. 32. & 24. summano scuti 200. & aggiunti 50. fanno 250. conforme la risposta data.

Dub. 9. Si hanno da macinare 500. rubbii di grano in 5. molini vno de quali in vn' hora macina 7. rubbii di grano, il secondo molino ne macina 5. il terzo 4. il quarto 3. & il quinto vno, si dimanda in quanto tempo si macinaranno detti 500. rubbii di grano, & quanto grano se deue porre in ciascheduno molino? Poniamo in hore 6. in dette hore lo primo molino macinarà 42. rubbii di grano, il secondo 30. il terzo 24. il quarto 18. il quinto 6. che in tutto sono rubbii 120. deuono essere 500. diciamo dunque, si rubbii 120. si macinano in hore 6. in quante se macinaranno rubbii 500. come vedi in questo esempio.

Si

120

6

500

25

Si che in hore 25. si macinariano 500. rubbij di grano è per consequenza il primo molino in dette hore macinaria rubbij 175. il secondo 125. il terzo 100. il quarto 75. & il quinto 25. che in tutti summano 500.

Dub. 10. Vno Mercante in vna fiera ha guadagnato tanti denari, che viene ad hauere triplicatamente di quello lui portò in detta fiera. Et andando in vn'altra fiera con tutti detti denari, si fece cinque volte più di quello portò, & di nuouo andando in vn'altra fiera, si fece 4. volte più di quello hauera, di modo, che se ritroua scuti 9600. si dimanda quanti denari portò detto Mercante nella prima fiera? quui si hà da ritrouare vno numero, il quale multiplicato per tre, & poi detta summa multiplicata per 5. & questa similmente multiplicata per 4. faccino scuti 9000. Poniamo siano stati scuti 50. quali multiplicati per tre, sono 150. & detti multiplicati per 5. sono 750. quali similmente multipli. ati per 4. sono 3000. noi vogliamo, che siano 9600. diciamo dunque si scuti 3000. prouengono da 50. da doue proueniranno scuti 9600. conforme si vede in questo esempio.

3000

50

9600

160

Di modo, che li primi denari furono 160. poiche multiplicati per 3. sono 480. & questi multiplicati per 5. sono 2400. quali multiplicati per 4. sono 9600.

Dub. 11. Fu dimandato vno Romita, quanti anni era dimorato nell'Eremo? rispose, sono tanti anni, che se vi si aggiungesse $\frac{1}{2}$ cioè vn'altra metà, & poi da detta sum-

ma se ne leuasse $\frac{1}{4}$ di detti anni, sariano anni 99. Se dimanda, quanti anni poteua hauere di Eremo detto Romita. In questo dubbio si hà da ritrouare vno numero, al quale aggiunto $\frac{1}{2}$ & poi sottrattone $\frac{1}{4}$ faccino 99. poniamo, che hauesse anni 40. à quali aggiunto 20. cioè $\frac{1}{2}$ sono 60. da quali sottratti $\frac{1}{4}$ cioè 15. restano 45. mà noi vogliamo, che restino 99. però diciamo, se 45. prouengono da 40. da dove proueniranno 99. conforme vedi in questo esempio.

45 40 99 88

Hauena dunque detto Romita 88. anni di Eremo, poi che giunti ad 88. vno dimidio, cioè 44. summano 132. da quali sottratti $\frac{1}{4}$ cioè 33. restano 99.

Dub. 12. Alcuni forastieri andando in Roma, e scoprendo da lontano, parte della Cupula di S. Pietro, vno di essi giudicò detta parte di Cupula essere canne 60. & disse esservi ancora da scoprire $\frac{1}{2}$ & $\frac{2}{3}$ di detta Cupula, se dimanda quanto saria alta detta Cupula, conforme à questo parlare? Abbiamo à ritrouare vno numero, dal quale sottratto $\frac{1}{2}$ & $\frac{2}{3}$ resti canne 60; Poniamo, che siano canne 120. da quali leuati $\frac{1}{2}$ cioè 40. & $\frac{2}{3}$ cioè 48. restano 32. mà hanno da restare 60. si dice dunque si 32. prouengono da 120. da dove proueniranno 60. conforme vedi in questo esempio.

32 120 60 225

Si che canne 225. saria la Cupula di S. Pietro conforme al parlare di detto huomo; poiche leuate $\frac{1}{2}$ da 225. cioè 75. & $\frac{2}{3}$ cioè 90. restariano canne 60.

Dub. 13. Se dimanda qual sia quel numero, quale multi-

plicato per 3. & detto multiplicato per 4. & poi detto multiplicato per 6. con aggiungerfi 28. facci la summa di 1900. da questo numero, si hanno primieramente da sottraere detti 28. per la ragione detta di sopra nel dubbio 5. di modo, che restariano 1872. di poi si hà da ritrouare vno numero, il quale multiplicato per 3. & detto multiplicato per 4. & questo multiplicato per 6. facci 1872. à quali con aggiungere 28. faccino 1900. Poniamo, che siano 50. quali multiplicati per 3. fanno 150. & detti multiplicati per 4. fanno 600. quali multiplicati per 6 fanno 3600. ma doue uano fare 1872. diciamo dunque, si 3600. prouengono da 50. doue proueniranno 1872. conforme vedi in questo esempio.

3600 50 1872 26

Di modo, che il 26. è il numero si dimandaua, poiche multiplicato per 3. fanno 78. & detti multiplicati per 4. sono 112. quali multiplicati per 6. fanno 1872. a quali aggiunto li 28. summano 1900.

Dub. 14. La Grotte di Puzzuolo in Napoli per $\frac{1}{3}$ è vn poco lucida da vna parte, per $\frac{1}{3}$ è totalmente oscura, per $\frac{2}{3}$ non è tanto lucida, ne tanto oscura; è per passi 25. è totalmente lucida dall'altra parte, si dimanda, quanto saria lunga detta grotte, conforme à questo parlare, quini si hà da ritrouare vno numero dal quale con leuarne $\frac{1}{3}$ & $\frac{2}{3}$ resti 25. poniamo essere passi 45. da doue leuati $\frac{1}{3}$ cioè 9. & $\frac{2}{3}$ cioè 15. & $\frac{2}{3}$ cioè 10. restaranno 11. doue uano restare 25. si dice dunque, se 11. prouengono da 45. da doue proueniranno 25. conforme vedi in questo esempio.

11

45

25

102 $\frac{3}{4}$

+ Sarebbe dunque, conforme la detta suppositione, detta grotte di passi 102 $\frac{3}{4}$ poiche leuatone $\frac{1}{2}$ & $\frac{2}{3}$ cioè 20 $\frac{1}{2}$ 34 $\frac{1}{4}$ 22 $\frac{7}{8}$ restano 25.

Dub. 15. Vno Mercante hà speso scuti 3750. in canne 1000. di due sorte di panni; mà 500. canne costano il doppio più dell' altre 500. si dimanda quanto hà speso detto Mercante per ciascheduna canna di detto panno. Poniamo, che siano 2. scuti al primo, & per consequenza 4. al 2. di modo, che il primo panno costerà scuti 1000. & altre canne 500. del secondo panno, costaranno scuti 2000. che in tutto sono 3000. mà hauno da essere 3750 diciamo dunque, se scuti 3000. prouengono da scuti 2. da doue proueniranno scuti 3750. conforme vedi in questo esempio.

3000

2

3750

2 $\frac{1}{2}$

Costa dunque la canna del primo panno due scuti, & mezzo, & per consequenza il secondo 4. scuti la canna, e così le prime canne 500. vengano scuti 1250. & l'altre 500. del secondo panno, 2500. quali uniti insieme summano scuti 3750. il che basti per questa prima regola.

Delle false positioni doppie

Cap. II.

HAbbiamo detto sino adesso delli dubbij, quali si sciolgono con una falsa positione; Adesso diremo di quelli


quelli dubbj, quali si sciogliono con due false positioni, quando però con dette positioni, non si sodisfacesse al dubbio, & all' hora il numero souerchio, ò meno, che si è pigliato, si nota con questa lettera P. si sarà souerchio, ouero M. si sarà meno, di modo, che il P. dirà più, & lo M. dirà meno; si che quando in dette due positioni si è fatto errore, ò per souerchio numero, ò meno pigliato, si faranno due P. ò due M. & si in vna si fosse pigliato numero souerchio, & nell' altra meno, si fa vn P. & vno M. di modo, che quando l' esempio si vederanno due P. & due M. all' hora si sottrae vno di detti numeri minore del maggiore, & il residuo si serba per diuifore; mà quando si vedrà nell' esempio vn P. & vno M. all' hora si uniscono detti numeri insieme per farno detto diuifore, è fatto questo, si multiplica il numero prima pigliato con l' errore del secondo numero pigliato, & il numero secondo pigliato, con l' errore del primo numero pigliato, & si nell' esempio faranno ò due P. ò due M. all' hora similmente vno di detti numeri multiplicati, cioè il minore si sottrae dal maggiore, & il rimanente si diuide al diuifore serbato, il cotiente del quale sarà il numero, che si v' cercando; mà si nell' esempio sarà vn P. & vno M. si pigliano li due numeri similmente multiplicati come di sopra, & se ne fa vna summa, da diuidersi a detto diuifore, conforme il tutto si chiarirà meglio con esempij.

Dub. 1. Si dimanda, qual sia quel numero, dalla metà del quale leuato $\frac{1}{2}$, & $\frac{1}{3}$ habbi da restare 190. Poniamo 30. per schiuare le minutie, da detto numero leuato la metà restano 15. dal quale leuati $\frac{1}{2}$ cioè 10. & $\frac{1}{3}$ cioè 3. restano due, & noi vogliamo, che restino 190. di modo, che si è fatto errore in 188. si pone detto numero 30. prima pigliato a mano sinistra della croce dalla parte di

138 Delle false positioni duplicate Tr. VI.

sopra, & di sotto si pone l'errore fatto, & in mezzo si pone la lettere *M.* perche si è fatto errore in pigliare meno numero, conforme

uedi in questo esempio, poi si piglia il secondo numero, & poniamo, che sia 90. quali si pongono da mano destra incontro alli 30. leuati la metà da detti 90. restano 45. da quali leuati $\frac{2}{3}$ cioè 30. & $\frac{1}{3}$ cioè 9. restano 6. doue uano restare 190 si è fatto dunque errore



Diuisore


di 184. quali si pongono sotto li 90. & in mezzo v'n'altro *M.* significando, che di nouo si è fatto errore in pigliare meno numero, di poi si sottrae il numero 184. per essere minore, dal numero 188. è restano 4. quali si pongono in mezzo delli detti due numeri di errore, notandoci di sotto, diuisore.

Di poi si multiplicano li 30. primo numero pigliato con li 184. che summano 5520. & li 90. secondo numero pigliato con li 188. che summano 16920. & da detto numero sottrattone 5520. restano 11400. detto numero si diuide poi al diuisore 4. & daranno al cotiente 2850. è questo è il numero, che si andaua cercando, poiche leuato la metà da detto numero, restano 1425. è da detti leuato $\frac{2}{3}$ & $\frac{1}{3}$ cioè 950. & 285. restano 190. conforme si è dimandato.

Ma sciogliamo quest' istesso dubbio con pigliare numeri maggiori, & poniamo primieramente per prima positione 2900. detto numero diuiso per metà sono 1450. da quali leuati $\frac{2}{3}$ & $\frac{1}{3}$ cioè 966 $\frac{2}{3}$ & 390. restano 193 $\frac{1}{3}$

Delle false positioni duplicate Tr. VI. 139

doueuano restare 190. di modo, che si è errato in 3 $\frac{1}{2}$ quali numeri si pongono cō forme vedi in questo esempio, e nel mezzo si pone il P. per causa, che si è pigliato numero souerchio, & per la seconda positione, poniamo 3000. quali diuisi sono 1500. & da detti leuati $\frac{2}{3}$ et $\frac{1}{3}$ cioè 1000 & 300. restano 200.




Diuisore

doueuano restare 190. di modo, che si è fatto errore in 10. di più quali si pongono sotto alli 3000. & si fa vn'altro P. nel mezzo di detto esempio, poi si sottraeno li 3 $\frac{1}{2}$ da detti 10. & restano 6 $\frac{1}{2}$ quali si pongono in mezzo per diuisore. Poi si moltiplicano li 2900. per li 10. che fanno 29000. & li 3000. con li 3 $\frac{1}{2}$ che fanno 10000 quali sottratti da 29000. restano 19000. & questi si hanno a diuidere al diuisore 6 $\frac{1}{2}$ & diuisi danno al cotiente 2850. & questo è il numero, che si è dimandato, poiche la metà souo 1425. da quali leuati $\frac{2}{3}$ & $\frac{1}{3}$ cioè 950. & 285. restano 190. conforme al dubbio.

Di noua resoluamo detto dubbio con uno numero maggiore, & con vn'altra minore, & poniamo per prima positione 3000. quali diuisi sono 1500. & da detti leuati $\frac{2}{3}$ & $\frac{1}{3}$ cioè 1000. & 300. restano 200. si che si è errato in 10. di più, perche doueuano restare 190. si pongono nel primo braccio della croce li 3000. & sotto li 10. & nel mezzo il P. poniamo per seconda positione 90. la metà souo 45. da quali leuati $\frac{2}{3}$ & $\frac{1}{3}$ cioè 30. & 9 re-

240 Delle false positioni duplicate Tr. VI.

Stano 6. di modo, che si è fatto errore in 184. quali si pongono sotto al li 90. & nel mezzo si fa M. si che in detto esempio in una parte si vede il P. & dell' altra lo M. quando l' esempio è a questo modo si uniscono li due numeri di errore in una somma, per il diuifore, come si



uede in detto esempio, poi si moltiplicano li 3000. per li 184. & fanno 552000. & li 90. per 10. che fanno 900. quali numeri si assummano insieme, & faranno 552900. & poi si diuidono al diuifore 194. & diuisi danno al cotiente 2850. quali sono il numero, che si cercava, poiche la metà sono 1425. da' quali leuati $\frac{2}{3}$ & $\frac{1}{3}$ cioè 950. & 285. restano 190. conforme si è dimandato.

Di modo, che da questi tre modi di sciogliere li dubbij proposti, si vede la differenza, con la quale si deue operare, quando nelli esempi faranno due P. ò due M. ouero quando sarà uno P. & uno M. poiche nelli primi due si sottrae no li numeri di errore, cioè il numero minore dal maggiore, & il rimanente serue per diuifore, & poi moltiplicati li numeri prima pigliati per li numeri delli errori messi in croce, si sottraeno similmente li minori dalli maggiori, & il rimanente si diuide al diuifore; ma nel terzo modo si uniscono li numeri di errore, & fanno il diuifore, & poi moltiplicati li primi numeri pigliati con li numeri di errore in croce, si uniscono detti moltiplicati numeri in una somma da diuidersi al diuifore, & al cotiente è il numero, che

si dimanda.

Alessandro Magno parlando vn giorno familiarmente con Calistene Filosofo disse queste parole, io supero l'età di Efestione in due anni; ma Clito tiene li anni di tutti noi due, & altri anni 4. di più, in modo tale, che tutti noi tre habbiamo anni 96. à punto tanti, quanti ne visse tuo padre. Si dimanda quanti anni hauesse all'hora Alessandro Magno, Efestione, & Clito. In detto dubbio, habbiamo da ritrouare vno numero, quale diuiso in tre parti, la prima superi la seconda in due, & la terza superi la prima & seconda vnite insieme in 4. è, che dette tre parti siano 96: poniamo, che Ales-

sandro Magno hauesse

20. anni; per consequenza

Efestione 18. & Clito 42.

quali numeri uniti insieme, summiano 80.

& conforme la dimanda,

deuono essere 96 di

modo, che si è fatto errore in 16. meno.

quali si pongono nell'esempio

conforme si vede, per la seconda

posizione, poniamo, che Alessandro Ma-

gno hauesse anni 30. per consequenza

Efestione 28. & Clito 62.

quali uniti insieme fanno 120. di modo, che si è

errato in 24. di più, douendo essere 96. doppo si vniscano

detti numeri di errore 16. & 24. che summiano 40.

& detti si pongono per diuifore, fatta poi la multiplicatione

del primo 20. con li 24. di errore, fanno 480. & li 30.

con li 16. summiano similmente 480. & uniti insieme so-

no



summati insieme fanno seuti 1440. è si vede similmente, che il primo costa tre volte più del 2. & il 2. quattro volte più del 3.

Dimandato vn Filosofo, quanti discepoli hauesse, & quanti Filosofi haueua fatto, rispose, che haueua fatto altre tanto Filosofi, quanti discepoli al presente si ritrouana, anzi $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ & $\frac{1}{4}$ de più. di modo, che se vi fosse vn altro sariano 112 si dimanda quanti discepoli hauesse all' hora detto Filosofo. Doue è da aduertire, che questo dubbio non si può sciogliere per questa regola, così però, conforme viene proposto per causa di quell' vno di più, il quale non hà proportione alcuna con le parti proposte, si hà dunque da ritrouare vno numero, il quale duplicato, & poi aggiuntoui $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ & $\frac{1}{4}$ facci 111. al quale poi aggiunto vno facci 112 conforme al dubbio proposto, poniamo, che detto Filosofo habbi 24 discepoli, quali duplicati sono 48 vno dimidio, sono 12. vn 3. sono 8. & vn quarto sono 6. quali vn ti con detti 48. summano 74. doue uano summare 111. diciamo dunque si 74. prouengono da 24. da doue proueniranno 111. conforme vedi in questo esempio.

74

24

111

36

Si che si vede, che li discepoli del Filosofo sono 36. poi che aggiuntoui altri 36. fanno 72. & vno dimidio, cioè 18. fanno 90. & $\frac{1}{3}$ cioè 12. fanno 102. & $\frac{1}{4}$ cioè 9. fanno 111. a quali aggiunto uno fanno 112.

Dub. 6. Vno Giocatore perse una volta giocando $\frac{1}{4}$ di li suoi denari, di po' ne perse $\frac{1}{2}$ di modo, che di tutti li denari, se ne restorno solamente scuti 300. si dimanda quanti scuti hauesse costui auanti, che giocasse, & quanti de-

denari perse in detto gioco; poniamo, che hauesse scuti 600 da quali leuati $\frac{1}{3}$ cioè scuti 200. & $\frac{2}{3}$ cioè scuti 240. restano scuti 160. doueriano restare 300. diciamo dunque, si scuti 160. pronengono da scuti 600. da doue proueniranno scuti 300. conforme si vede in questo esempio.

160 600 300 1125

Di modo, che hauena detto giocatore scuti 1125. & la prima volta perse scuti 375. cioè $\frac{1}{3}$ & la seconda volta scuti 450. cioè $\frac{2}{5}$ che summano scuti 825. per si, a quali aggiunti li 300. ad esso rimasti fanno 1125. conforme vedi nell'esempio.

Dub. 7. Dimandato vn Mercante, quanto hauesse guadagnato in vna certa mercantia, rispose; hò guadagnato tanto, che $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ & $\frac{2}{5}$ di detti denari, summano scuti 178. si dimanda quanti denari guadagnasse costui in detta mercantia; poniamo, che fossero scuti 60. de quali $\frac{1}{2}$ sono 30. $\frac{1}{3}$ sono 20. $\frac{1}{4}$ sono 15. & $\frac{2}{5}$ sono 24. quali tutti summano 89 doueriano essere 178. diciamo dunque, se 89. pronengono da 60. da doue proueniranno 178. conforme vedi in questo esempio.

89 60 178 120

Si che sono li scuti guadagnati 120. de quali $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ & $\frac{2}{5}$ cioè 60. 40. 30. & 48. summano scuti 178.

Se alcuno dicesse. Ritrouatemi vno numero, dal quale sottratto $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ & $\frac{2}{5}$ il residuo sia 6. questi, & simili dubbij sogliono alle volte essere dimandati da ignorantij; poi che conforme è impossibile sottracere 20. da 15, per essere minor numero il 15. che non è il 20. così ancora è igno-

vantia volgre sottraer dette parti da vno integro, essendo più dette parti, che non è vno integro.

Dub. 8. Dimandato vn certo huomo quanti denari hauesse in cassa, rispose non saperlo; mà sapena bene, che si à quelli, che lui hà, vi si aggiungerò $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ & $\frac{1}{4}$ di detti denari con altri scuti 50. hauerebbe scuti 250. per sapere detto dubbio, si sottraeno prima li 50. per la causa detta nel 5. Dub. & poi si hà da ritrouare vno numero, al quale aggiunto $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ siano scuti 200. à quali poi aggiunti li 50. faccino 250. Poniamo, che detto Morcante habbi scuti 48. à quali aggiunti 24. cioè $\frac{1}{2}$ & 16. cioè $\frac{1}{3}$ & 12. cioè $\frac{1}{4}$ summano scuti 100. doueano summare scuti 200. diciamo dunque, si scuti 100. prouengono da 48. da doue proueniranno scuti 200. conforme vedi in questo esempio.

100

48

200

96

Sono dunque in detta cassa scuti 96. à quali aggiunti $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ cioè 48. 32. & 24. summano scuti 200. & aggiunti 50. fanno 250. conforme la risposta data.

Dub. 9. Si hanno da macinare 500. rubbij di grano in 5. molini vno de quali in vn' hora macina 7. rubbij di grano, il secondo molino ne macina 5. il terzo 4. il quarto 3. & il quinto vno, si dimanda in quanto tempo si macinaranno detti 500. rubbij di grano, & quanto grano se deue porre in ciascheduno molino? Poniamo in hore 6. in dette hore lo primo molino macinarà 42. rubbij di grano, il secondo 30. il terzo 24. il quarto 18. il quinto 6. che in tutto sono rubbij 120. deuono essere 500. diciamo dunque, si rubbij 120. si macinano in hore 6. in quante se macinaranno rubbij 500. come vedi in questo esempio.

Sì

120

6

500

25

Si che in hore 25. si macinariano 500. rubbij di grano è per consequenza il primo molino in dette hore macinaria rubbij 175. il secondo 125. il terzo 100. il quarto 75. & il quinto 25. che in tutti summano 500.

Dub. 10. Vno Mercante in vna fiera ha guadagnato tanti denari, che viene ad hauere triplicatamente di quello lui portò in detta fiera. Et andando in vn'altra fiera con tutti detti denari, si fece cinque volte più di quello portò, & di nuouo andando in vn'altra fiera, si fece 4. volte più di quello hauua, di modo, che se ritroua scuti 9600. si dimanda quanti denari portò detto Mercante nella prima fiera? quiui si hà da ritrouare vno numero, il quale multiplicato per tre, & poi detta summa multiplicata per 5. & questa similmente multiplicata per 4, faccino scuti 9600. Poniamo siano stati scuti 50. quali multiplicati per tre, sono 150. & detti multiplicati per 5. sono 750. quali similmente multipli. ati per 4. sono 3000. noi vogliamo, che siano 9600. diciamo dunque si scuti 3000. prouengono da 50. da doue proveniranno scuti 9600. conforme si vede in questo esempio.

3000

50

9600

160

Di modo, che li primi denari furono 160. poiche multiplicati per 3. sono 480. & questi multiplicati per 5. sono 2400. quali multiplicati per 4. sono 9600.

Dub. 11. Fu dimandato vno Romita, quanti anni era dimorato nell'Eremo? rispose, sono tanti anni, che se vi si aggiunge 1/2 cioè vn'altra metà, & poi da detta sum-

ma se ne leuasse $\frac{1}{4}$ di detti anni, fariano anni 99. Se dimanda, quanti anni poteua hauere di Eremo detto Romita. In questo dubbio si hà da ritrouare vno numero, al quale aggiunto $\frac{1}{2}$ & poi sottrattone $\frac{1}{4}$ faccino 99. poniamo, che hauesse anni 40. à quali aggiunto 20. cioè $\frac{1}{2}$ sono 60. da quali sottratti $\frac{1}{4}$ cioè 15. restano 45. mà noi vogliamo, che restino 99. però diciamo, se 45. prouengono da 40. da dove proueniranno 99. conforme vedi in questo esempio.

45 40 99 88

Hauena dunque detto Romita 88. anni di Eremo, poi che giunti ad 88. vno dimidio, cioè 44. summano 132. da quali sottratti $\frac{1}{4}$ cioè 33. restano 99.

Dub. 12. Alcuni forastieri andando in Roma, e scoprendo da lontano, parte della Cupula di S. Pietro, vno di essi giudicò detta parte di Cupula essere canne 60. & disse esservi ancora da scoprire $\frac{1}{2}$ & $\frac{2}{3}$ di detta Cupula, se dimanda quanto saria alta detta Cupula, conforme à questo parlare? Abbiamo à ritrouare vno numero, dal quale sottratto $\frac{1}{2}$ & $\frac{2}{3}$ resti canne 60; Poniamo, che siano canne 120. da quali lenati $\frac{1}{2}$ cioè 40. & $\frac{2}{3}$ cioè 48. restano 32. mà hanno da restare 60. si dice dunque si 32. prouengono da 120. da dove proueniranno 60. conforme vedi in questo esempio.

32 120 60 225

Si che canne 225. saria la Cupula di S. Pietro conforme al parlare di detto huomo; poiche leuate $\frac{1}{2}$ da 225. cioè 75. & $\frac{2}{3}$ cioè 90. restariano canne 60.

Dub. 13. Se dimanda qual sia quel numero, quale multi-
plicaz

plicato per 3. & detto multiplicato per 4. & poi detto multiplicato per 6. con aggiungerli 28. facci la summa di 1900. da questo numero, si hanno primieramente da sottrarre detti 28. per la ragione detta di sopra nel dubbio 5. di modo, che restariano 1872. di poi si ha da ritrouare vno numero, il quale multiplicato per 3. & detto multiplicato per 4. & questo multiplicato per 6. facci 1872. a quali con aggiungere 28. faccino 1900. Poniamo, che siano 50. quali multiplicati per 3. fanno 150. & detti multiplicati per 4. fanno 600. quali multiplicati per 6 fanno 3600. ma doue uano fare 1872. diciamo dunque, si 3600. prouengono da 50. doue proueniranno 1872. conforme vedi in questo esempio.

3600 50 1872 26

Di modo, che il 26. è il numero si dimandaua, poiche multiplicato per 3. fanno 78. & detti multiplicati per 4. sono 104. quali multiplicati per 6. fanno 156. a quali aggiunto li 28. summano 1900.

Dub. 14. La Grotte di Puzzuolo in Napoli per $\frac{1}{3}$ è vn poco lucida da vna parte, per $\frac{1}{3}$ è totalmente oscura, per $\frac{2}{3}$ non è tanto lucida, ne tanto oscura; è per passi 25. è totalmente lucida dall'altra parte, si dimanda, quanto saria lunga detta grotte, conforme à questo parlare, quini si ha da ritrouare vno numero dal quale con leuarne $\frac{1}{3}$ & $\frac{2}{3}$ resti 25. poniamo essere passi 45. da doue leuati $\frac{1}{3}$ cioè 9. & $\frac{2}{3}$ cioè 15. & $\frac{2}{3}$ cioè 10. restaranno 11. doue uano restare 25. si dice dunque, se 11. prouengono da 45. da doue proueniranno 25. conforme vedi in questo esempio.

11

45

35

102 $\frac{3}{11}$

+ Sarebbe dunque, conforme la detta suppositione, detta grotte di passi 102 $\frac{3}{11}$ poiche leuatone $\frac{1}{2}$ & $\frac{2}{3}$ cioè 20 $\frac{1}{2}$ 34 $\frac{1}{11}$ 22 $\frac{7}{11}$ restano 25.

Dub. 15. Vno Mercante hà speso scuti 3750. in canne 1000. di due sorte di panni; mà 500. canne costano il doppio più dell' altre 500. si dimanda quanto hà speso detto Mercante per ciascheduna canna di detto panno. Poniamo, che siano 2. scuti al primo, & per consequenza 4. al 2. di modo, che il primo panno costarà scuti 1000. & altre canne 500. del secondo panno, costaranno scuti 2000. che in tutto sono 3000. mà hauno da essere 3750 diciamo dunque, se scuti 3000. prouengono da scuti 2. da doue proueniranno scuti 3750. conforme vedi in questo esempio.

3000

2

3750

2 $\frac{1}{2}$

Costa dunque la canna del primo panno due scuti, & mezzo, & per consequenza il secondo 4. scuti la canna, e così le prime canne 500. vengono scuti 1250. & l'altre 500. del secondo panno, 2500. quali uniti insieme summmano scuti 3750. il che basti per questa prima regola.

Delle false positioni doppio

Cap. 11.

HAbbiamo detto sino adesso delli dubbij, quali si sciolgono con una falsa positione; Adesso diremo di quelli


quelli dubbij, quali si sciogliono con due false positioni, quando però con dette positioni, non si sodisfacesse al dubbio, & all' hora il numero souerchio, ò meno, che si è pigliato, si nota con questa lettera P. si sarà souerchio, ouero M. si sarà meno, di modo, che il P. dirà più, & lo M. dirà meno; si che quando in dette due positioni si è fatto errore, ò per souerchio numero, ò meno pigliato, si faranno due P. ò due M. & si in vna si fosse pigliato numero souerchio, & nell' altra meno, si fa vn P. & vno M. di modo, che quando l' esempio si vederanno due P. & due M. all' hora si sottrae vno di detti numeri minore del maggiore, & il residuo si serba per diuifore; mà quando si vedrà nell' esempio vn P. & vno M. all' hora si vnifcono detti numeri insieme per farno detto diuifore, è fatto questo, si multiplia il numero prima pigliato con l' errore del secondo numero pigliato, & il numero secondo pigliato, con l' errore del primo numero pigliato, è si nell' esempio faranno ò due P. ò due M. all' hora similmente vno di detti numeri multiplicati, cioè il minore si sottrae dal maggiore, & il rimanente si diuide al diuifore serbato, il cotiente del quale sarà il numero, che si va cercando; mà si nell' esempio sarà vn P. & vno M. si pigliano li due numeri similmente multiplicati come di sopra, & se ne fa vna summa, da diuidersi a detto diuifore, conforme il tutto si chiarirà meglio con esempi.

Dub. 1. Si domanda, qual sia quel numero, dalla metà del quale leuato $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{3}$ habbi da restare 190. Poniamo 30. per schiuare le minutie, da detto numero leuato la metà restano 15. dal quale leuati $\frac{1}{2}$ cioè 10. & $\frac{1}{3}$ cioè 3. restano due, & noi vogliamo, che restino 190. di modo, che si è fatto errore in 188. si pone detto numero 30. prima pigliato a mano sinistra della croce dalla parte di

138 Delle false positioni duplicate Tr. VI.

sopra, & di sotto si pone l'errore fatto, & in mezzo si pone la lettera M. perche si è fatto errore in pigliare meno numero, conforme

vedi in questo esempio, poi si piglia il secondo numero, & poniamo, che sia 90. quali si pongono da mano destra incontro alli 30. leuati la metà da detti 90. restano 45. da quali leuati $\frac{2}{3}$ cioè 30. & $\frac{1}{3}$ cioè 9. restano 6. doue uano restare 190 si è fatto dunque errore



Diuisore

di 184. quali si pongono sotto li 90. & in mezzo v'n'altro M. significando, che di nuouo si è fatto errore in pigliare meno numero, di poi si sottrae il numero 184. per essere minore, dal numero 188. è restano 4. quali si pongono in mezzo delli detti due numeri di errore, notandoci di sotto, diuisore.

Dipoi si multiplicano li 30. primo numero pigliato con li 184. che summano 5520. & li 90. secondo numero pigliato con li 188. che summano 16920. & da detto numero sottrattone 5520. restano 11400. detto numero si diuide poi al diuisore 4. & daranno al cotiente 2850. è questo è il numero, che si andaua cercando, poiche leuato la metà da detto numero, restano 1425. è da detti leuato $\frac{2}{3}$ & $\frac{1}{3}$ cioè 950. & 285. restano 190. conforme si è dimandato.

Mà sciogliamo quest' istesso dubbio con pigliare numeri maggiori, & poniamo primieramente per prima positione 2900. detto numero diuiso per metà sono 1450. da quali leuati $\frac{2}{3}$ & $\frac{1}{3}$ cioè 966 $\frac{2}{3}$ & 290. restano 193 $\frac{1}{3}$

do:

Delle false positioni duplicate Tr. VI. 139.

douenano restare 190. di modo, che si è errato in $3\frac{1}{2}$ quali numeri si pongono cō forme vedi in questo esempio, e nel mezzo si pone il P. per causa, che si è pigliato numero souerchio, & per la seconda positione, poniamo 3000. quali diuisi sono 1500. & da detti leuati $\frac{2}{3}$ et $\frac{1}{3}$ cioè 1000 & 300. restano 200. douenano restare 190.



Diuisore

di modo, che si è fatto errore in 10. di più quali si pongono sotto alli 3000. & si fa vn'altro P. nel mezzo di detto esempio, poi si sottraeno li $3\frac{1}{2}$ da detti 10. & restano $6\frac{2}{3}$ quali si pongono in mezzo per diuisore. Poi si moltiplicano li 2900. per li 10. che fanno 29000. & li 3000. con li $3\frac{1}{2}$ che fanno 10000 quali sottratti da 29000. restano 19000. & questi si hanno a diuidere al diuisore $6\frac{2}{3}$ & diuisi danno al cotiente 2850. & questo è il numero, che si è dimandato, poiche la metà souo 1425. da quali leuati $\frac{2}{3}$ & $\frac{1}{3}$ cioè 950. & 285. restano 190. conforme al dubbio.

Di noua resoluamo detto dubbio con uno numero maggiore, & con vn'altro minore, & poniamo per prima positione 3000. quali diuisi sono 1500. & da detti leuati $\frac{2}{3}$ & $\frac{1}{3}$ cioè 1000. & 300. restano 200. si che si è errato in 10. di più, perche douenano restare 190. si pongono nel primo braccio della croce li 3000. & sotto li 10. & nel mezzo il P. poniamo per seconda positione 90. la metà sono 45. da quali leuati $\frac{2}{3}$ & $\frac{1}{3}$ cioè 30. & 9. re-

si dimanda.

Alessandro Magno parlando vn giorno familiarmente con Calistene Filosofo disse queste parole, io supero l'età di Efestione in due anni; ma Clito tiene li anni di tutti noi due, & altri anni 4. di più, in modo tale, che tutti noi tre habbiamo anni 96. à punto tanti, quanti ne visse tuo padre. Si dimanda quanti anni hauesse all'hora Alessandro Magno, Efestione, & Clito. In detto dubbio, habbiamo da ritrouare vno numero, quale diuiso in tre parti, la prima superi la seconda in due, & la terza superi la prima & seconda vnite insieme in 4. è, che dette tre parti siano 96: poniamo, che Ales-

sandro Magno hauesse

20. anni; per consequen-

za Efestione 18. & Cli-

to 42. quali numeri vni-

ti insieme, summiano 80.

& conforme la diman-

da, deuono essere 96 di

modo, che si è fatto erro-

re in 16. meno, quali si

pongono nell'esempio cō

forme si vede, per la se-

conda positione, poniamo,

che Alessandro Ma-

gno hauesse anni 30. per consequenza Efestione 28. &

Clito 62. quali vniti insieme fanno 120. di modo, che si è


errato in 24. di più, douenda essere 96. doppo si vniscano

detti numeri di errore 16. & 24. che summiano 40. &

detti si pongono per diuisore, fatta poi la multiplicatione

del primo 20. con li 24. di errore, fanno 480. & li 30.

con li 16. summiano similmente 480. & vniti insieme so-



Diuisore

142 Delle false positioni duplicate Tr. VI.

no 960. quali diuisi per li 40. diuifore, danno al cotiente e 24. di modo, che tanti anni haueua all'hora *Alessandro Magno*, & per consequenza Efestione 22. & Clito 50. quali uniti insieme summano 96. conforme al dubbio proposto.

Son tre Mercanti, quali si hanno da diuidere scuti 163 con questa conditione, che al secondo tocchi il doppio di quello si da al primo, & 5. scuti di più, & al 3. se dia il doppio di quello si è dato a tutti due, & 4. scuti di più, poniamo per il primo scuti 30

& per consequenza al secondo 65. & al 3. 194.

quali uniti insieme summano 289. doueuano restare 163. si che si è errato in 126. di più, poniamo di nuouo al primo 20. & per consequenza al 2. 45. & al terzo 134. quali uniti insieme summano 199. doueuano summare 163.

si che si è fatto errore in 36. di più, di modo, che si vedono due P. nell'esempio, & però si sottraeno li 36. dalli 126. & restano 90. quali si pongono per diuifore; poi si multiplicano li 30. per li 36.

& li 20. per li 126. che summano 180. & 2520. poi si sottraeno li 1080. da detti 2520. & restano 1440. quali diuisi al diuifore 90. danno al cotiente 16 di modo, che al primo si deuono dare 16. al 2. per consequenza 7. & al 3. 110. quali absummati insieme fanno 163. conforme si desideraua.

si che si è fatto errore in 36. di più, di modo, che si vedono due P. nell'esempio, & però si sottraeno li 36. dalli 126. & restano 90. quali si pongono per diuifore; poi si multiplicano li 30. per li 36.

& li 20. per li 126. che summano 180. & 2520. poi si sottraeno li 1080. da detti 2520. & restano 1440. quali diuisi al diuifore 90. danno al cotiente 16 di modo, che al primo si deuono dare 16. al 2. per consequenza 7. & al 3. 110. quali absummati insieme fanno 163. conforme si desideraua.

si che si è fatto errore in 36. di più, di modo, che si vedono due P. nell'esempio, & però si sottraeno li 36. dalli 126. & restano 90. quali si pongono per diuifore; poi si multiplicano li 30. per li 36.


& li 20. per li 126. che summano 180. & 2520. poi si sottraeno li 1080. da detti 2520. & restano 1440. quali diuisi al diuifore 90. danno al cotiente 16 di modo, che al primo si deuono dare 16. al 2. per consequenza 7. & al 3. 110. quali absummati insieme fanno 163. conforme si desideraua.

si che si è fatto errore in 36. di più, di modo, che si vedono due P. nell'esempio, & però si sottraeno li 36. dalli 126. & restano 90. quali si pongono per diuifore; poi si multiplicano li 30. per li 36.

& li 20. per li 126. che summano 180. & 2520. poi si sottraeno li 1080. da detti 2520. & restano 1440. quali diuisi al diuifore 90. danno al cotiente 16 di modo, che al primo si deuono dare 16. al 2. per consequenza 7. & al 3. 110. quali absummati insieme fanno 163. conforme si desideraua.

si che si è fatto errore in 36. di più, di modo, che si vedono due P. nell'esempio, & però si sottraeno li 36. dalli 126. & restano 90. quali si pongono per diuifore; poi si multiplicano li 30. per li 36.

& li 20. per li 126. che summano 180. & 2520. poi si sottraeno li 1080. da detti 2520. & restano 1440. quali diuisi al diuifore 90. danno al cotiente 16 di modo, che al primo si deuono dare 16. al 2. per consequenza 7. & al 3. 110. quali absummati insieme fanno 163. conforme si desideraua.



Diuisore

Mà se alcuno volesse solamente il numero del 2. ò del 3. si potria ancora multiplicare, v. g. li 65. con li 36. che fariano 2340. & li 45. con li 126. fariano 5670. poi sottratti li 2340. da detti 5670. restano 3330. quali diuisi al diuifore 90. danno al cotiente 37. conforme habbiamo già detto; Et per ritrouare il 3. si può ancora multiplicare il numero 194. per 36. che fanno 6984. & li 134. per 126. che fanno 16884. da quali sottratti li 6984. restano 9900. da diuidersi al diuifore 90. & diuisi danno al cotiente 110. conforme già si era detto.

Si dimanda, quali siano tre numeri, che costituischino 94. mà il 2 sia duplicato del primo, & 4. di più, & il 3. contenghi due volte il primo, & secondo, & 7. di più, poniamo 6. per il primo, et per consequenza al 2. 16.

& il 3. 51. quali tutti summano 73. doueriano essere 94. si che si è fatto errore in 21. meno, poniamo di nouo 10. per il primo, al 2. 24. & al 3. 75. quali uniti fanno 109. doueriano essere 94. si che si è fatto errore in 15. di più, e perche nell' esempio si vede vno P. &

| | |
|----|-----|
| 6 | 10 |
| 16 | 24 |
| 51 | 75 |
| — | — |
| 73 | 109 |
| 21 | 15 |
| 36 | |

Diuisore

vno M. si vnifcono li due numeri di errore, che fanno 36. per diuisore; poi multiplicati li 15. per li primi 6. sono 90 & li 21. per li 10. che sono 210. & uniti insieme sono 300. quali diuisi per il diuisore 36. danno al cotiente 8 1/3. si che questo è il numero, che si dimandaua, & poiche al 2.

144 Delle false positioni duplicate Tr. VI.

sarebbono 20. & al 3 65. quali uniti summano 94. conforme si è dimandato.

Diuidiamo 50 in due parti, ma in modo tale, che aggiunti ad una parte 25. & l'altra 5. la prima sia tre volte più della 2. poniamo che la prima siano 30. & la seconda 20. giunti li 25. alli 30. sono 55. nel quale numero non si contiene tre volte 25. ma bisogna fossero 75. di modo, che si è errato in 20. meno, poniamo di nuovo la prima parte 40. & la seconda 10. aggiunti 25. alli 40. sono 65. & li 5. alli 10. sono 15. doue similmente si vede, che 65. contengono più che tre volte li 15. & doueno essere 45. di modo, che si è errato in 20. di più. Vniti li 2. numeri di errore fanno 40. per il diuifore, poi moltiplicati li 30. per li 20. summano 600. & li 40. per l'altri 20 sono 800. quali uniti insieme, summano 1400. et diuisti al diuifore 40. danno al cotiente 35. & questo è il numero, al quale aggiunto 25. summano 60. et al rimanente numero 15. aggiunto 5. fanno 20. quali sono la terza parte di 60. conforme si dimandaua, la prima parte dunque di 50. sono 35. et la 2. 15.




Diuifore

Si potera nondimeno ritrouare questa verità di altro modo; poiche hauendo assummati li 55. et 25. si potera dire, che numero si contiene tre volte in 55. et sariano li 18. di modo, che suda 25. et sono 65. di errore meno, poi negli 65. et 15. dire, che numero entra tre volte in 65. et

sono li 12; si è fatto dunque errore in 6; di più, fattapoi l'operatione, conforme di sopra con multiplicare li 30. per 6; et li 40 per 6; et detti multiplicati uniti insieme & poi diuisi al diuifore 13; daranno al cotiète similn ète 35. conforme prima, ma il primo modo è migliore, perche si schinano le minutie.

Dimandato vn vecchio quanti anni hauesse, rispose, io hò duplicati anni deli tuoi, & d eci di più, & mio padre quando morse, haueua tre volte li anni tuoi, & otto di più, di modo, che li anni di mio padre con li miei, & tuoi summano 216. se dimanda quanti anni hauesse detto vecchio, quanti l'huomo, che fa la dimanda, & quanti il padre di detto vecchio, poniamo, che il vecchio habbi 80. anni, per consequenza l'huomo, che dimanda, 35. & il padre del vecchio 113. quali uniti summano 228. haueuano da summare

216. si che si è fatto errore in 12. di più; poniamo di nuouo, che il vecchio habbia 70. anni l'huomo, che dimanda 30. & il padre del vecchio 98. quali summati fanno 198. doue uano fare 216. si che si è fatto errore in 18. meno, poi uniti li numeri di errore fanno 30. che seruono per il diuifore;



& multiplicati li 80. per 18. & li 70. per 12. fanno 1440. & 840. quali uniti, summano 2280. & diuisi al diuifore 30. dando al cotiète 76. & questi sono gl'anni del

146 Delle false positioni duplicate Tr. VI.

del vecchio, quelli poi dell'huomo, che interroga, saranno 35. & quelli del padre del vecchio sono 107. quali uniti summano 216. conforme si è dimandato.

Dimandato vno guerriero, quanto hauesse il mese di piatto, rispose io hò tanto il mese, che multiplicato per 3. & giontoui 5. & poi detto numero multiplicato per 4. & aggiuntoui 6. & detto multiplicato per 5. & aggiuntoui 10. fanno scuti 1040. se dimanda quanti scuti costui hauesse il mese; poniamo, che hauesse 10. scuti quali multiplicati per 3. sono 30. & aggiuntoui 5. sono 35. quali multiplicati per

4. sono 140. & aggiuntoui 6. sono 146. quali

multiplicati per 5. sono 730. aggiuntoui 10

sono 740. doue uano essere 1040. si è fatto dñ

que errore in 300. meno;

poniamo di nuouo scuti 20. quali multiplicati per 3. sono 60.

aggiuntoui 5. sono 65. quali multiplicati per


4. sono 260. aggiuntoui 6. sono 266. & detti multiplicati per 5. sono 1330.

aggiuntoui 10 sono 1340. doue uano esser 1040. si che si è fatto errore in 300. di più.

Poi multiplicati li 10. per li 300. sono 3000. & li 20. per l'altri 300. che sono 6000. quali uniti sono 9000. & diuisi al diuifore fatto

delli due numeri di errore, che sono 600. danno al cotiente 15. & tanti sono li scuti, che ha il mese detto guerriero; poiche multiplicati per 3. sono 45. aggiuntoui 5. so-

no



Diuisore

no 50. quali multiplicati per 4. sono 200. aggiuntoui 6. sono 206. & detti multiplicati per 5. sono 1030. aggiuntoui 10. sono 1040. conforme si dimandaua.

Si hà da vendere una grande, & pretiosissima gioia, per uno prezzo assai grande; il che essendo inteso da uno gran Prencipe, disse con suoi familiari. Si ogni Terra, che io possedo mi dase 50. scuti, potria comprare detta gioia, con sopraggiungersi delli miei solamente 250. scuti, & se me ne dassero 60 me ne auuanzariano 3400. si dimanda quante terre possedea detto Prencipe, & quanto uolena detta gioia, poniamo, che dette terre siano 100.

& li denari saranno 5000 a quali aggiunto 250. sono 5250. & tanto sarebbe il valore di detta gioia; mà vediamo se con hauere 60. scuti per terra, auanti à detto Signore scuti 3400? & dando dette




terre li scuti 60 sariano, scuti 6000 da quali leuati 5250 per il prezzo della gioia, restano 750. douenano restare 3400. di modo, che vi è di errore scuti 2650. meno, poniamo di nuouo dette terre essere 150. li denari sariano 7500. & aggiuntoui li 250. del Prencipe sono 7750. et tanto saria il prezzo della gioia, e si dette terre hauesse- ro dat i scuti 60. li denari sariano 9000. da quali leuati 7750. restano 1250. douenano restare 2400. di modo, che si è fatto di nuouo errore in 2150. meno, quali scuti si sottraeno dall' altro numero di errore, cioè dalli 2650. restano 500. per il diuisore, poi multiplicati li primi 100 per 2150. sono 215000. & li 150. p 2650. fanno 397500 fan-

da quali sottratti li 215000 restano 182500. quali diuisi al diuifore 500. danno al cotiente 365. & di tante terre saria padrone detto Prencipe, conforme si dice essere il Prencipe di Stigliano in Napoli. Si che danno dette terre scuti 50. per ciascheduna, sariano 18250. a quali aggiunto li scuti 250. di detto Prencipe fanno 18500 è tanto saria il prezzo della gioia, & si dette terre dasse- ro scuti 60. li denari sariano 21900. da quali leuati li 18500. per il prezzo della gioia, resteriano a detto Signore scuti 3400. conforme si è dimandato.

Racconta Vitruuio nel lib. 9. al c. 3. che Hiero Re, hauendo fatto voto di donare vna corona d'oro puro alli suoi Di, la fè fare; quale fatta si accorse, che l'orefice l'hauena inganato, del che adirato, & desiderando hauere raggione euidente per potere castigare detto orefice; diede cura ad Archimede, che hauesse ritrouato detto errore; & inganno, & andando detto Archimede casualmente ad vno bagno, & entrandoui dentro, fè riflessione, che conforme la quantità del corpo, che entraua dentro del bagno, così era la quantità dell'acqua, che uscua fuori; per il che con grandissima allegrezza uscì del bagno, & andaua gridando, che già hauena ritrouato quello, che cercaua, poi fece fare due corone vna d'oro, & vn'altra d'argento; mà di eguale peso conforme era la prima fatta, doppò pigliò vno vaso pieno d'acqua sino alli labri, nel quale vi pose prima la corona d'argento, & misurò molto bene l'acqua, che uscì da detto vaso; poi riempì di nuouo il vaso, & vi pose la corona d'oro, et buttò manco acqua, perche era manco massa, poi di nuouo riempì detto vaso, & messoui la prima corona fatta dall'orefice, buttò più acque, che non hauena buttata l'altra corona d'oro, del che si accorse, che in detta corona ci era inganno, & che

era fatto d'oro, & argento. Ma vediamo adesso con la presente regola di scoprire puntualmente quanto fosse detta fraude.

Poniamo, che detta corona d'oro fosse di 100. libre, quale messa nel vaso, butti 65. libre d'acqua, et messoui la seconda di vero oro, butti 60. libre d'acqua, et messui la 3. d'argento, butti 90. libre d'acqua. Il che presupposto, poniamo per prima positione, che in detta prima corona dell'orefice vi siano solamente 60. libre d'oro, et 40. d'argento, poi diciamo se 100. libre d'oro buttano 60. libre d'acqua, quante ne buttaranno libre 60. saranno 36. et si 100. libre d'argento buttano 90. libre d'acqua, quante ne buttaranno libre 40? saranno 36. di modo, che se detta corona hauesse 60. libre d'oro, et 40. d'argento, ha ueria buttato 72. libre d'acqua; ma ne doueua buttare 65. conforme al presupposito, di modo, che si è errato in 7. di più; ma poniamo di nuouo, che in detta corona vi siano 70. libre d'oro, et 30. d'argento, et diciamo se 100 libre d'oro buttano 60. libre d'acqua, quante ne butteranno libre 70? saranno 42. et si 100. libre d'argento buttano 90 libre d'acqua, quante ne butteranno 30? saranno 27. quale unite con le 42. sono 69. doueuaano essere 65. si che si è errato in 4. di più, quali sottratti del 7. restano 3. per il diuifore, poi multiplicati li 60. per li 4. fanno 240. & li 70. per li 7. fanno 490. da quali sottratti 240. restano 250. et detti di uisi a 3. danno al cotiente $83\frac{1}{3}$ et queste sono le libre d'oro, che erano nella corona di



Diuifore


mo

150 Delle false positioni duplicate Tr. VI.

modo, che in detta corona vi erano libbre $83\frac{1}{3}$ d'oro, & $16\frac{2}{3}$ d'argento, et che sia il vero, diciamo, se libbre 100. d'oro buttano 60. libbre d'acqua, quante ne buttarano $83\frac{1}{3}$ faranno 50. et si 100. libbre d'argento buttano 90. libbre d'acqua, quante ne buttaranno $16\frac{2}{3}$ faranno 15. quale unite con le 50. sono 65. conforme si è presupposto.

Dne Mercanti si haueuano a diuidere 100. scuti, che già si contaуano; mà occorse differenza fra essi, et ciasche duno diede le mani alli denari, et pigl iò quello, che potè. doppò venuti in pace, fù bisogno vno dasse $\frac{2}{3}$ delli denari presi al compagno, & il compagno diede $\frac{2}{3}$ delli suoi a l'altro, con il che tanto l'vno, come l' altro vennero ad hauere scuti 50. per vno. Se dimanda, quanti denari ciascheduno prese in detto rumore; poniamo, che il primo habbi preso 30. scuti, & il secòdo 70. con dare $\frac{2}{3}$ cioè 10. del primo al 2. & $\frac{2}{3}$ cioè 14. del 2. al primo vène ad hauere detto primo scuti 34. doueua hauere 50. si che si è fatto errore in 16. meno, po-

niamo di nuouo, che il primo pigliasse scuti 60. & il 2. 40. con dare $\frac{2}{3}$ cioè 20. al 2. & $\frac{2}{3}$ cioè 8. al primo, hauerà detto primo scuti 48. ne doueua hauere 50. si che si è fatto errore in 2. meno, quali sottratti dalli 16. restano 14. per il diuisore, poi multiplicati li



Diuisore

30. per 2. sono 60. & li 60. per li 16. fanno 960. da quali sottratti li 60. restano 900. & detti diuisi a 14 diuisore, danno al cotiente 64 $\frac{2}{7}$ & questi sono li denari, che pigliò il primo, & il secòdo $31\frac{2}{7}$ poiche leuati vno terzo delli denari del primo, cioè 21 $\frac{2}{7}$ gli restano scuti 42 $\frac{4}{7}$ &

qua-

Delle false positioni duplicate Tr. VI. 151

quali aggiuntò $\frac{1}{4}$ dellidenari del 2. che sono $7\frac{1}{4}$ fanno 50. così ancora leuato $\frac{1}{4}$ dal 2. gli restano scuti 28 $\frac{1}{4}$ a quali aggiunti $\frac{1}{4}$ del primo, cioè 21 $\frac{3}{4}$ fanno similmente 50. conforme si è dimandato .

Mà poniamo, che talmente detti due Mercanti haues-
sero pigliati detti 100. scuti, che con pigliarne da vno $\frac{1}{4}$
& dell'altro $\frac{1}{4}$ & uniti insieme, & poi diuisi egualmen-
te a detti due Mercanti, venghi ad hauere ciascheduno
50. scuti; se dimanda, quanti scuti in questo caso, bisognò,
che pigliasse ciascheduno? poniamo, che il primo piglias-
se 60. scuti, & il 2. 40. pi-

gliando $\frac{1}{4}$ cioè 20. dal primo 60
& $\frac{1}{4}$ cioè 10. del 2. summa-

no 30. quali diuisi egualmē-
te toccano 15. per ciaschedu-

no, quali aggiunti al primo,
che gli sono rimasti 40. farā-

no 55. di modo, che haueria
5. di più, douendo essere 50.

poniamo di nuouo, che il pri-
mo habbi preso scuti 24. & il 2. 76. poi pigliando $\frac{1}{4}$ cioè

8. del primo, & $\frac{1}{4}$ cioè 19. del 2. summano 27. quali di-
uisi sono 13 $\frac{1}{2}$ per ciascheduno, & detti aggiunti alli 16.

che sono rimasti al primo, fanno 29 $\frac{1}{2}$ doueuano fare 50.
di modo, che si è fatto errore in 20 $\frac{1}{2}$ meno. Vniti poi li


5. di errore con l'altri 20 $\frac{1}{2}$ fanno 25 $\frac{1}{2}$ per u diuifore; &

moltiplicati li 60. per 20 $\frac{1}{2}$ sono 1230. & li 24 per 5.
sono 120. quali uniti sono 1350. & diuisi al diuifore

25 $\frac{1}{2}$ dāno al cotiēte 52 $\frac{8}{11}$ ouero 52 $\frac{8}{11}$ quali saranno li de-
nari, che pigliò il primo, & il 2. 47 $\frac{1}{11}$ da quali pigliati $\frac{1}{4}$

cioè 17 $\frac{1}{11}$ del primo, & $\frac{1}{4}$ cioè 11 $\frac{1}{11}$ del 2. & uniti in-
sieme sono 29 $\frac{7}{11}$ quali diuisi sono 14 $\frac{1}{11}$ per ciascheduno

di




Diuifore

152 Delle false positioni duplicate Tr. VI.

di modo, che si se aggiungono alle parti da ciascheduno rimasta, cioè al primo rimase $35\frac{5}{7}$ & al 2. $35\frac{5}{7}$ fanno 50. per vno, conforme si è dimandato.

Si hanno à diuidere 500. scuti a due Mercanti, mà il primo hà d'hauere 27. scuti più del 2 si dimanda, quanto si hà da dare a ciascheduno? poniamo, che al primo se diuino 30. scuti, & al 2.

200. verria il primo ad hauere 100. scuti più del 2. doue uano essere 37. sono di errore 63. di più, poniamo di nuouo al primo, scuti 280. & al 2. 220. due saranno 60. più al primo, douendo essere 37. si è fatto di errore in 23. di più, quali sottratti dalli 63. restano 40. per il diuifore



poi multiplicatili 300. per 23. fanno 6900. & li 280. per 63. sono 17640. da quali sottratti li 6900. restano 10740. & diu si al diuifore 40. danno al cotiente 268 $\frac{5}{2}$ per il primo Mercante, & li rimanenti 231 $\frac{1}{2}$ per il 2. & detti del primo auanzano quelli del 2. in 37. conforme si è dimandato.

Un Signore tiene due bacili d'argento, & vno bacile d'argento, che costa 80. scuti, & messo detto boccale al primo bacile, cotteranno tre volte più, che non costa il 2. bacile, & messo detto boccale al 2. bacile, saranno di eguale prezzo con il primo bacile. Per non confonderfi, in questo dubbio, si hanno à ritrouare due numeri, vno de quali vnito con li 80. sia 3. volte più del 2. numero, & vniti detti 80. con il 2. numero, sia eguale al primo numero. Poniamo, che detto primo numero siano scuti

100. & che tanto costi il primo bacile, a quali aggiunto li scuti 80. del boccale, sono 180. & per conseguenza il secondo bacile costerà scuti 60. a quali aggiunto li 80. sono 140. doueua costare scuti 100. acciò fosse eguale al prezzo del primo bacile, di modo, che si è errato in 40. di più, poniamo di nuouo per primo numero 55. a quali aggiunti li 80. sono 135. & il 2. bacile costerà scuti 45. a quali aggiunti li 80. del boccale, sono 125. doueua essere 55. acciò fosse simile al prezzo del primo bacile, di modo, che si è fatto errore in 70. di più, poi da detti 70. sottratti li 40. restano 30. per il diuisore. Et



moltiplicati li primi 100. per 70. sono 7000. & li 55. per li 40. sono 2200 quali sottratti da 7000. restano 4800 et diuisi al 30. diuisore, danno al cotiente 160. et tanto sarà il prezzo del primo bacile; poichè aggiunti li 80. sono 240. & per conseguenza il 2. bacile costerà scuti 80. a quali aggiunti altri 80. del boccale, fanno 160. conforme habbiamo detto costare il primo bacile.


Ma poniamo, che detto boccale aggiunto al primo bacile, sia triplicato prezzo del 2. bacile, & messo al 2. bacile faccra triplicato prezzo di quello costa il primo bacile, vediamo quanto errehbano a costare detti bacili, poniamo, che il primo costi scuti 82. quali uniti con li 80 del boccale, sono 162. & per conseguenza il 2. costerà scuti 54. a quali aggiunti li 80. sono 134. doueua essere

154 Delle false positioni duplicate Tr. VI.

re 164. per esser duplicato al prezzo del primo bacile, si che si è errato in 30. meno, poniamo di nuouo, che il primo bacile costi scuti 100 a quali aggiunti li 80. del boccale, saranno scuti 180. & per consequenza il 2. bacile costerà scuti 60. a quali vniti li 80 fanno 140 doue uano essere 200. di modo, che si è fatto errore in 60.



meno, da quali sottratti 30. del primo errore, restano altri 30. per il diuisore; poi moltiplicati li 82. per 60. sono 4920 et li 100. per li 30. sono 3000. quali sottratti da 4920. restano 1920. et detti diuisi al diuisore 30. danno al cotiente 64. et questi saranno il prezzo del primo bacile, poiche aggiuntoui li 80. sono 144. et per consequenza il 2. costerà scuti 48. a quali aggiunti li 80. fanno 128. duplicato prezzo del primo, conforme si è dimandato.



Dimandato vno Compratore d'un Monasterio, per quanti Religiosi hauesse comprato tanto pesce, rispose, che 3 1/2 et altri 22. sariano 100. Religiosi a mangiare del


no pesce, se dimanda quanti fossero detti Religiosi. *Quinto* si è da ritrouare uno numero, del quale $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ et 22. facciano 100. poniamo siano 12. Religiosi, de quali $\frac{1}{2}$ sono 6. $\frac{1}{3}$ sono 4. $\frac{1}{4}$ sono 3 che in tutto fanno 13. et aggiuntoui 22. faranno 35. ma bisogna siano 100. si che si è fatto errore in 65. meno, poniamo di nuovo, detti Religiosi essere 60. de quali $\frac{1}{2}$ sono trenta, $\frac{1}{3}$ sono 20. et $\frac{1}{4}$ sono 15. a quali tutti uniti 22. fanno 87. doueano essere 100. si è fatto errore in 13. meno detti 13. sottratti da 65. restano 52. per il diuifore, et multiplicatili 12. cō li 13. sono 156. et li 60. con li 65. sono 3900. da quali leuati 156. restano 744. et detti diuisi al diuifore 52. danno al coriente 72. et tanti sono li Religiosi, per li quali seruiua detto pesce, poiche $\frac{1}{2}$ sono 36. $\frac{1}{3}$ sono 24. $\frac{1}{4}$ sono 18 quali uniti sono 78. et aggiuntoui 22. sono 100. conforme si è dimadato.

Uno Prencipe dimandò ad un altro Prencipe, quanto hauesse d'entrata; il quale rispose; io hò tanta entrata, che si dasse a voi dodeci milia scuti delli miei, hauereffino sei volte più di quello restaria a me, et si voi daffino a me 15000 scuti delli vostri, baueria dieci volte più di quella hauee voi, se dimada quati scuti habbino d'entrata questi due Prencipi, poniamo, che il 2. Prencipe, cioè quello, che è stato interrogato, habbi 20000. scuti, delli quali datone 12000 al primo Prencipe interrogato, vegono a restare al 2. Prencipe scuti 8000. et per consequenza, il primo hauera 48000. scuti, cioè sei volte più di quello è rimasto al 2. si che detto primo, haueua di scuti 36000. ananti, che



156 Delle false positioni duplicate Tr. VI.


hauesse li scuti
12000 de qua
li scuti 36000
si se ne dassero
15000. al 2.
Prencipe, ha-
ueria detto 2.
scuti 35000.
cioè li 20000
suoi, con que-



sti altri 15000. fanno 35000. & restariano a detto pri-
mo scuti 21000. & douendo essere li scuti del 2. dieci
volte più del primo si vede, chiaramente, che li 35000.
di detto primo, non contengono dieci volte li 21000. del
2. essendo, che dieci volte 21000. sono 210000. & da
35000. sino a 210000. ci vogliono 175000. quali so-
no di errore. Poniamo di nuovo, che il 2. Prencipe in-
terrogato habbia 100000 scuti, dalli quali lenati 12000
gli restano 88000. & per consequenza haueà il primo
scuti 528000. cioè 6. volte più di quello è rimasto a det-
to 2. & detto primo è segno, che lui haueua 516000.
scuti auanti, che hauesse li 12000. da quali 516000. le-
nati 15000. & dandoli al 2. haueà detto 2. 115000.
scuti quali non sono dieci volte più del rimasto a detto
primo, che sariano 501000. mà li bene 5010000. saria-
no le 10. volte più di 501000. di modo, che da 115000
sino a detti 5010000. ci sono d'errore 4895000. meno,
poi da detto ultimo num. d'errore sottrattone li 175000
del primo errore, restano per il diuisore 4720000. poi
moltiplicati li 20000 primo loco pigliati cō li 4895000
fanno 97900000000. & li 100000. per li 175000.
sono 17500000000. quali sottratti dal primo multipli-

tato, restano 80400000000. da diuidersi al diuifore, & diuifi, danno al cotiente 17033 $\frac{1}{3}$ cioè $\frac{5}{3}$ & questa è l'entrata del secondo Principe, quale fù interrogato, & che sia il vero, leuati scuti 12000. da detta summa; restano per detto 2. scuti 5033 $\frac{1}{3}$ & per consequenza, il primo verria ad hauere scuti 30203 $\frac{2}{3}$ cioè 6. volte più di quello era rimasto al 2. & detto primo auanti che riceuesse detti scuti 12000. hauena per consequenza scuti 18203 $\frac{2}{3}$ da quali leuati scuti 15000. resteria a detto primo scuti 3203 $\frac{2}{3}$ & detti scuti 15000. uniti con li scuti 17033 $\frac{1}{3}$ del 2. summano scuti 32033 $\frac{2}{3}$ quale numero è dieci volte più, che non sono li scuti 3203 $\frac{2}{3}$ rimasti a detto primo, conforme si è dimandato. Replie dunque che il 2. Principe, che fù dimandato, hauena d'entrata scuti 17033 $\frac{1}{3}$ & il primo, che dimandò hauena scuti 18203 $\frac{2}{3}$.

Dimandato vn'huomo da' uno suo amico, quanti denari hauesse in borsa, rispose, io hò tanti denari, che se ne dasse a te 6. scuti, tu haneressi duplicatamente di quello restaria a me; risponde quello, che hà dimandato io sò, che se io te dasse scuti 3. delli miei, haueressi l'istessi denari, che mi restariano a me; si dimanda quanti denari habbino in borsa questi due amici; poniamo, che il 2. cioè quello, che è stato interrogato habbia scuti 15. delli quali dandone 6. al primo restano 9. a detto 2. & il primo per consequenza haueria scuti 18. id duplicato di quello è rimasto al 2. & auanti che detto primo hauesse li 6. bisognaua ha-



uesse 12. de quali dandone 3. al 2. restariano 9. & detto 2. baueria 18. di modo, che questo numero, non saria eguale al numero, che è rimasto a detto primo; ma ci sono 9. di più. Poniamo di nuouo, che il 2. habbia 20. scuti, da quali leuati 6. restano 14. & il primo bisogna habbi scuti 28. il doppio di quello è rimasto al 2. & prima, che hauesse detto primo li 6. bisogna hauesse scuti 22. da quali leuati 3. restano 19. a detto primo, & dandoli al 2. baueria scuti 23. quel numero non è eguale alli 19. rimasti a detto primo; ma ci è d'errore 4. di più; di poi sottratti detti 4. dalli 9. restano 5. per il diuisione, & multiplicati li 15. per 4. fanno 60. et li 20. per 9. fanno 180. da quali sottratti li 60. restano 120. et detti diuisi a 5. danno al cotiente 24. et tanti sono li scuti del 2. poiche leuandone 6. restano al 2. 18. et per consequenza il primo hauerà scuti 36. ma auanti riceuesse li 6. bisogna hauesse scuti 30. da quali leuandone 3. restano a detto primo scuti 27. et il 2. con hauere detti 3. baueria similmente scuti 27. conforme si è proposto.

Vna pescbiera tiene tre aperture nel fondo, et per votarla con aprire una di dette apertura, si vota detta pescbiera in due hore, et si se aprisse la 2. se votaria in tre hore, ma si se aprisse la 3. sola, si votaria in 6. hore, si dimanda, in caso si aprissero tutte 3. dette aperture in quanto tempo si votaria detta pescbiera? poniamo votarsi in hore 4. et diciamo con la regola del 3. se una apertura in hore due vota una pescbiera, quante ne voterà in hore 4? saranno 2. et se la seconda apertura in hore 3. voterà una pescbiera, quante ne voterà in hore 4? saranno 1½ et se la 3. apertura vota una pescbiera in hore 6. quante ne voterà in hore 4? saranno ⅔ di modo, che tutte tre aperture in hore 4. votariano 4. pescchiere; si che si è fat-

to errore di tre peschiere so-
uerchie, poniamo di nuovo ho-
re 10. et diciamo, si in hore
2. la prima apertura vota
una peschiera, quante ne vo-
terà in hore 10. saranno 5. et
si la seconda apertura in hore
3. vota una peschiera, quan-
te ne voterà in hore 10. sarā-
no 3 $\frac{1}{2}$; et si la 3. apertura in 6



hore vota una peschiera, quante ne voterà in hore 10?
saranno 1 $\frac{2}{3}$ di modo, che tutte tre aperture in hore 10.
voteranno 10. peschiere; si è fatto errore in 9. peschiere
di più, poi sottratte le 3. peschiere dalle 9. restano 6. per
il divisore, et moltiplicato il 4. per 9. fanno 36. et li 10.
per il 3. fanno 30. quali sottratti da 36. restano 6. et di-
uisi al divisore 6. danno al cotiente 1. di modo, che det-
te tre aperture, voteriano in un' hora detta peschiera.
poiche la prima apertura in un' hora voterà $\frac{1}{2}$ la 2. vo-
terà $\frac{1}{3}$ et la 3. voterà $\frac{1}{6}$ che fanno una cisterna.

Diciamo di altro modo, cioè detta peschiera, che ha
uno canale, per il quale venendo del continuo acqua, em-
pie detta peschiera in hore 12. mà nel fondo tiene una
apertura, che in hore 18. vota detta peschiera; si diman-
da, in caso detta peschiera stasse sempre aperta con quella
apertura, et per il canale venisse continuamente acqua,
in quante hore si empiria detta peschiera, poniamo in ho-
re 20. poi diciamo per la regola del tre, si detta apertura
vota una peschiera in hore 18. quante ne voterà in hore
20 sarà 1 $\frac{1}{9}$; dunque è necessario in dette hore 20. empir
peschiere 2 $\frac{2}{9}$ acciò votata 1 $\frac{1}{9}$ resti una piena, diciamo poi
se il canale in hore 12. empir una peschiera, quante ne


160 Delle false positioni duplicate Tr. VI.

empirà in hore 20. sarà $1\frac{2}{3}$ douena essere $2\frac{1}{3}$ vi manca-
no dunque $\frac{1}{3}$ poniamo di nuouo in hore 30. & diciamo, se
in hore 18. se vota una pes-
chiera, quante se ne voteranno
in hore 30? sarà $1\frac{2}{3}$ dunque
sarà necessario in hore 30. em-
pire peschiere $2\frac{2}{3}$ acciò vota-
ta $1\frac{2}{3}$ resti una piena; dicia-
mo poi, se in hore 12. se empie
detta peschiera, quanta se ne
empiranno in hore 30? sarà-
no $2\frac{1}{3}$ bisognauano essere $2\frac{2}{3}$
vi manca dunque $\frac{1}{6}$ quale sottratto da $\frac{1}{3}$ resta $\frac{1}{6}$ per il
diuisore, poi multiplicati li 20. per $\frac{1}{6}$ & li 30. per $\frac{1}{6}$ fan-
no $\frac{20}{6}$ & $\frac{30}{6}$ & facendo l'altre operationi, conforme di
sopra, ritrouerai, che si darà al cotiente 36. & tante sono
le hore, nelle quali sarà piena detta cisterna, poiche in
dette hore si empiria tre volte, & non potria votarsi, se
non che due volte, & così resteria piena, & acciò più fa-
cilmente si sappia, l'operatione in questo esemplo si fa in
questo modo, che si è fatto il diuisore $\frac{1}{6}$ conforme vedi
nell'esempio; si multiplicano li 20. per $\frac{1}{6}$ & fanno $\frac{20}{6}$ &
multiplicati li 30. per $\frac{1}{6}$ fauno $\frac{30}{6}$ del quale numero, si
hanno da sottraere li $\frac{20}{6}$ & perciò fare, bisogna porre
detti numeri sotto uno denominatore, conforme alla re-
gola già imparata, & così verriano detti numeri in que-
sto modo $\frac{20}{6}$ $\frac{30}{6}$ poi sottratto dalli 720. li 180. re-
stariano $\frac{540}{6}$ & detti diuisi al diuisore $\frac{1}{6}$ danno al co-
tiente 36. & tante sono le hore, nelle quali restaria piena
detta cisterna, conforme si è detto.

Si hanno da ritrouare tre numeri, il primo del quale
unito con 73. facci duplicato numero di tutti l'altri
due



due, & il 2. con detti 37. facci treplicato numero dell' altri due, & il 3. con detti 37. facci quadruplicato numero dell' altri due. poniamo per primo, vno. o altro numero sparò, acciò possi essere il doppio dell' altri due. detto vno con 73. fanno 74 di modo, che l' altri due numeri, bisogna siano 37. & perche il 2. numero ha da fare numero triplicato dell' altri due; però auanti si passi auanti à detto dubbio, bisogna vedere come si hanno à diuidere detti 37. acciò, vna parte d' esse con li 37 habbi da essere treplicata con il primo numero vno, & con l' altra parte, che resterà del 37.



Poniamo dunque per prima parte 2. & la 2. sarà 35. uniti 73. al 2. sono 75. & li 35. & 1 sono 36. doue si vede, che 75. non è tripluata parte di 36. mà bisogna siano 108. vi mancano dunque 33. poniamo di nuouo per prima parte 5. & la 2. sarà 32. messi 37. a 5. sono 78. a 32. messo 1. sarà 33. doue si vede parimente, che detti 78 non contengono tre volte 33 mà bisogna siano 99. vi mancano dunque 21. operando poi conforme si è fatto nell' altre regole ritroueremo, che la prima parte di detti 37. deue essere 10 $\frac{1}{4}$ & la 2. 26 $\frac{3}{4}$.



162 Delle false positioni duplicate Tr. VI.

Di modo, che nel primo dubbio hauendo pigliato per primo numero, uno, il 2. sarà $10\frac{1}{2}$ & il 3. $26\frac{1}{2}$ poiche a questo modo li 73 con uno farà numero duplicato dell' altri due, & uniti con il 2. numero $10\frac{1}{2}$ farà numero triplicato dell' altri due, resta solamente a vedere, si detti 73. con il 3. numero $26\frac{1}{2}$ facci quadruplicata summa dell' altri due, & uniti sono $99\frac{1}{2}$ & li due primi sono $11\frac{1}{2}$ dunque doue uano essere 45. perche questo è il quadruplo delli $11\frac{1}{2}$ si è dunque ecceduto in $54\frac{1}{2}$.

Poniamo di nuouo per primo numero 3. quale unito con 73. fanno 76. è detto numero deue essere duplicato dell' altri due, quali bisogna siano 38. & perche il 2. bisogna sia triplicato dell' altri due, bisogna prima vedere come si hanno a diuidere detti 38. accio una parte unita con 73. sia triplicato numero del 3. & dell' altra parte di detti 38.

Poniamo dunque la prima parte essere 2. & la 2. sarà 36. uniti li 2. con 73. fanno 75. & li 36. con li 3. fanno 39. doue si vede, che detti 75. non possono essere triplicato numero delli 39. ma bisognaua fossero 117. di modo, che vi mancano 42. poniamo di nuouo per prima parte 23. & la 2. sarà 15. detti 23 con 73. fanno 96. & li 15. con 3. sono 18. doue uano essere 54. perche questo è il numero triplicato di 18. si che si è ecceduto in 42. operando poi




conforme si deue, se vederà, che la prima parte è $2\frac{1}{2}$ & la 2. $25\frac{1}{2}$ poiche aggiunti li 23. cō $11\frac{1}{2}$ sono $85\frac{1}{2}$ & li $25\frac{1}{2}$ cō li 3. sono $28\frac{1}{2}$ de quali il numero triplicato è $85\frac{1}{2}$

Il secondo dunque numero sarà $12\frac{1}{2}$ & il 3. $25\frac{1}{2}$ da porsi nel primo esempio, cōforme già iui vedifatto, ni m̃a ca solo, che il 3. numero con 73. facci numero quadruplicato dell' altri due, & uniti li $25\frac{1}{2}$ con 73. sono $98\frac{1}{2}$ & li $12\frac{1}{2}$ con li 3. sono $15\frac{1}{2}$ del quale numero, il suo quadruplicato sarà 62. di modo, che si è ecceduto in $36\frac{1}{2}$ cōforme il tutto vedi nel primo esempio.

Ciò fatto, si fa il diuifore, poi si multiplicano li numeri pigliati con li errori, & multiplicato il primo numero, & diuiso al diuifore, si ritrouerà, che il vero primo numero, sarà 7. & così similmente fatto con li 2. & 3. numeri, si ritrouerà, che il vero secondo numero, sarà 17. et il 3. sarà 23. poiche uniti li 7. a 73. sono 80. duplicato numero delli 17. & 23. perche dette due summe sono 40. così ancora uniti li 17. con li 73. sono 90. triplicato numero delli 7. & 23. essendo queste due partite 30. poi uniti li 23. con li 73. sono 96 quadruplicato numero delli 7. & 17. quale due partite summano 24. di modo, che li 7. 17. & 23. sono li tre numeri si cerca uano.

In uno exercito fatto dall' Imperatore di Turchi, vi sono 40000. Soldati di Germania, altri poi d' Italia, & di Vngaria, ma quelli d' Italia sono la metà $\frac{1}{2}$ delli Germani, & Ungari, et li Vngari sono $\frac{1}{3}$ dell' Italiani, & Germani, si dimanda quantifiano li Soldati Italiani, & quanti li Vngari, & infine tutto l' exercito? Poniamo l' Italiani essere 30000. è perche




Diuifore

detto

164 · Delle false positioni duplicate Tr. VI.

detto numero deue essere $\frac{1}{2}$ delli Germani, & Vngari, saranno detti Germani, & Vngari 60000. de quali essendone 40000. Germani, ne saranno 20000. Vngari, e detti Vngari deueno essere $\frac{1}{3}$ delli Germani, & Italiani, quali habbiamo detto essere 70000. cioè 30000. Italiani, et 40000. Germani, di modo, che li 20000. Vngari, non possono essere $\frac{1}{3}$ di 70000. perche vi sono 10000. di più. Poniamo di nuouo l'Italiani essere 24000. è questo numero perche deue essere $\frac{1}{2}$ delli Germani, & Vngari, saranno tutti 48000. & essendo li Germani 40000. saranno li Vngari 8000. quali deueno essere $\frac{1}{3}$ dell' Italiani, & Germani, & detti, conforme habbiamo detto sono 64000. et 8000. non possono essere $\frac{1}{3}$ di 64000. ma si bene di 24000 habbiamo dunque ecceduto in 40000. di più, operando poi conforme la regola, si ritrouerà, che l'Italiani sono 32000. et li Vngari 24000. è tutto l'esercito sarà 96000 poiche li 32000. sono $\frac{1}{2}$ delli Germani, che sono 40000. & delli Vngari, che sono 24000. & detti 24000. sono $\frac{1}{3}$ dell' Italiani, & Germani, conforme si è dimandato.

Sono tre Giocatori, il primo ha vinto al 2. $\frac{1}{2}$ delli denari haueua, il 2. al 3. ha vinto $\frac{1}{3}$ delli suoi denari, & il 3. ha vinto al primo $\frac{1}{4}$ delli suoi denari, finito il gioco, se ritrouano tutti 3. con scuti 700. per ciascheduno; se dimanda, quanti scuti portassero detti Giocatori nel gioco, poniamo, che il primo habbi portato scuti 100. da quali lenati $\frac{1}{4}$ cioè 25. gli re-



Stano 75. & perche detto resto deue essere di 700. aggiugendoci la metà $\frac{1}{2}$ delli denari del 2. bisogna, che detto 2. habbi portato in gioco scuti 1250. la metà de quali, cioè 625. con detti 75. fanno 700. è perche similmente il residuo del 2. con $\frac{1}{3}$ di denari del 3. giocatore hanno da fare altri scuti 700. bisogna dunque, che detto 3. habbi portato in gioco scuti 225. uno terzo de quali sono 75. quali uniti con li 625. del 2. fanno 700. & a detto 3. restariano 150. è perche questo residuo con $\frac{1}{2}$ delli denari del primo giocatore, deue fare similmente 700. si vede, che non può fare più, che 175. di modo, che si è errato in 525 meno.

Poniamo di nuouo, che detto primo habbi portato 200 da quali leuatone $\frac{1}{2}$ cioè 50. restano 50. quale residuo con $\frac{1}{2}$ delli denari del 2. ha da fare 700. dunque bisogna portasse il 2. scuti 1100. la metà de quali, cioè 550. con detto residuo di 150. fanno 700. è perche l'altra metà di detto secondo cioè 550. ha da fare ancora 700. con uno terzo delli denari del 3. giocatore, bisogna, che detto 3. habbi portato in gioco scuti 450. $\frac{1}{3}$ de quali sono 150 quali uniti con li 550. fanno 700. & restano a detto 3. scuti 300. quali uniti con $\frac{1}{2}$ delli denari del primo giocatore, bisognaria facessero 700. ma non fanno più che 350 si è dunque errato in 350. meno, operando poi conforme la regola, ritrouerai, che il primo porto in gioco scuti 400 il 2. scuti 800. & il 3. scuti 900. conforme si è amandato.



TRATTATO SETTIMO

Delle Progressioni Aritmetiche.

Che cosa sia progressione Aritmetica, & come
si fac-i. Cap. Vnico.

Progressione Aritmetica è un'ordine di più numeri, che vno auanzi l' altro in eguale proportionē, v. g. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. &c. & questa si chiama progressione naturale, che comincia da 1. & ogni numero auanza l' altro solamente in 1. Possono essere ancora dette proportioni di più numeri, cioè, che vno auanzi l' altro in eguali numeri, v. g. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. &c. ouero 1. 5. 9. 13. 17. 21. 25. 29. 33. 37. &c. doue nel primo esempio vno auanza l' altro in 2. & nel 2. vno auanza l' altro in 4.

Sono ancora altre progressioni de numeri pari, cioè, che cominciano da numeri pari, & poi vno numero auanza l' altro in eguali numeri, v. g. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. &c. ouero 2. 5. 8. 11. 14. 17. 20. 23. 26. 29. 32. così ancora 4. 8. 12. 16. 20. 24. 28. 32. 36. 40. In fare dette progressioni, bisogna subito aduertire in quanti numeri vno ha da superare l' altro, et detti numeri, nelli quali si supera, andare aggiungendo per fare li numeri subsequenti, v. g. si ha da fare vna progressione, che cominci da 6. & vadi auanzando in 5. si aggiunge il 5. al 6 che sono 11. & si fa per 2. numero, poi giunti 5. alli 11. sono 16. per 3. numero, & così di mano in mano, che verria in questo modo, 6. 11. 16. 21. 26. 31. 36. 41. 46. 51. &c.

Così similmente si fa per sottrattione, quando dalli numeri maggiori, se volesse venire verso li numeri minori, come

come v.g. in questa progressione 8. 13. 18. 23. 28. doue ogni numero auanza l'altro in 5. & cominciando dalli 28. leuando 5. restano 23. & da 23. leuando 5. resta no 18. & così di mano in mano.

Ma è da aduertire, che la proprietà di dette progressio ni è, che essendo la progressione di tre partite di numeri, pigliando la prima partita con la 3. farà l'istesso nume ro, che farà la seconda partita de numeri multiplicati in se stessi; & essendo la progressione di 4. partite de numeri, la prima unita con la 4. farà l'istesso numero, che farà la 2. unita con la 3. v.g. nel primo caso 4. 9. 14. uniti li 4. con 14. sono 18. & il 9. multiplicato in se stesso, fa an co 18. & nel 2. caso 2. 5. 8. 11. uniti li 2. con 11. fan no 13. così ancora uniti li 5. con 8 sono 13.

Da dette proprietà si caua, che essendo dette progres sioni di termini spari, come 3. 5. 7. all'hora il primo ter mine, ouero numero unito con l'ultimo, farà l'istesso nu mero, che farà il 2. termine di numero con il penultimo, & così sarà ancora il 3. con l'antepenultimo, & di mano in mano; ma quel termine, che si ritroua in mezzo, si rad doppia, & farà similmente l'istesso numero, conforme fan no l'altri, v.g. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. uniti li 5. con li 25. fanno 30. così ancora li 7. uniti con li 23 fanno 30. & tutti l'altri fanno l'istesso, nel mezzo resta no li 15. quali radoppiati fanno similmente 30. confor me l'altri numeri. Ma quando li termini delli nume ri sono pari, all'hora non ci occorre questo raddoppiare v.g. 8. 11. 14. 17. 20. 23. 26. 29. 32. 35. doue uniti li 8. co li 35. sono 43. & lo stesso numero faranno tutti l'altri numeri, co questo ordine uniti, cioè il primo con l'ultimo 2. co il penultimo, il 3. con l'antepenultimo, &c. da che se queste cose presupposte si caua una regole, et è questa.

In qualsivoglia progressione Arithmetica, sapendo il numero delli termini di detta progressione, & il numero primo, & ultimo subito si può sapere tutta la quantita de numeri, che sono in dette progressioni, con aggiungere il primo numero a l'ultimo, & poi detto aggregato multiplicarlo per il numero delli termini di detta progressione, & la metà di detta multiplicatione, faranno tutti li numeri di detta progressione. v. g. in questa progressione, 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. unit. li 3. con li 25. sono 28. quali multiplicati per li 12. termini di detta progressione, faranno 336. la metà di detta multiplicatione, cioè 168. sono tutti li numeri di detta progressione, ouero essendo li termini di detti numeri pari, conforme è stato in detto esempio, basta multiplicare detto aggregato delli due estremi numeri, per la metà di detti termini, che darà l'istesso numero, & essendo li termini impari, basterà multiplicare la metà dell' aggregato delli numeri estremi per li termini della progressione, che ad ogni modo, daranno l'istesso numero, come si vede in questi esempi di termini pari, & l'altro di termini impari.

5. 9. 13. 17. 21. 25. 29. 33. 37. 41.

2. 5. 8. 11. 14. 17. 20. 23. 26. 29. 32.

Doue nel primo esempio, aggiunti li 5. al 41. fanno 46 è perche li termini sono 10. basterà multiplicare detti 46 per 5. & faranno 230. dell'istesso modo che si se fossero multiplicati per 10. pauche faranno 460. & pigliandone la metà sono 23. così ancora nel 2. esempio uniti li 2. co' 32. sono 34. (nota, che quando li termini sono impari, l'aggregato delli due estremi sarà pari) di 34. pigliandone la metà sono 17. & questi basterà, che si multipli-

chino per li 11. termini della progressione, & faranno 187 dell'istesso modo, che si se multiplicassero li 34 per 11. & poi detto multiplicato se pigliasse la metà, poiche fariano 374. & la metà sono 187. cos ancora sarà, si essendo l'aggregato dell' due estremi paro, multiplicare la metà di esso per il numero dell' termini, & essendo sparo, si multiplica per la metà del numero dell' termini. che in tal caso sempre saranno pari, & in tutti detti modi, si ritrouerà sempre l'istessa verità, come si può vedere da detti esēpij.

Ma nella progressione naturale, che comincia da 1. & vā auuanzando sempre in vno, facilmente ancora si possono sapere tutti li numeri di detta progressione, con multiplicare l'ultimo numero, con il numero maggiore, che appresso di detta progressione potria seguitare, come v.g. in questa progressione.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Con multiplicare li 12. con li 13. che potria seguitare appresso, si cognosce quanti numeri si contengono in detta progressione; pigliando però la metà di detta multiplicatione, come in detta progressione multiplicati li 13. per 12. sono 156. la metà sono 78. & questi sono tutti li numeri di detta progressione.

Si possono ancora ritrouare detti numeri d' altro modo, cioè si l'ultimo numero della progressione è paro, si può multiplicare lo prossimo maggiore numero per la metà dell'ultimo numero, & essendo sparo, si può multiplicare l'ultimo numero per la metà del numero doueua seguitare nella progressione; come v.g. nella sopradetta progressione di 12. si potriano multiplicare 6. con 13 che seguitariano appresso, & parimente fariano 78. & si

L detta

detta progressione fosse di 11. si potriano multiplicare detti 11. per 6. cioè la metà di 12. doueria seguitare, et fariano 36. dell'istesso modo, che si se multiplicassero detti 11. con 12. & poi se pigliasse la metà, poiche multipli-
cati, fariano 132. & la metà sono 66. si che in tutti detti modi si può cognoscere quanti siano li numeri delle pro-
gressioni.

Esse la progressione sarà di numeri spari, che comin-
cia da 1. si potrà ancora cognoscere la quantità di nu-
meri di detta progressione, con multiplicare in se stesso il
numero di termini di detta progressione, v.g.

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21.

Doue li termini sono 11. quali multiplicati in se stessi, sono 121. & tanti sono li numeri, che sono in detta pro-
gressione, & per sapere lo numero delli termini, basta ag-
giungere uno a l'ultimo numero, & la metà di detto ag-
gregato, sarà il numero di detti termini, come v.g. nel
detto esempio, aggiunto uno a 21. sono 22. & la metà
sono 11. & tanti sono li termini di detta progressione, co-
me v.g. in quest'altra progressione.

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29.

Aggiunto uno a 29. sono 30. la metà de quali sono
15. & tanti sono li termini di detta progressione, & det-
ti termini multiplicati in se fanno 225. & tanti sono li
numeri di detta progressione.

Così ancora se la progressione sarà, che numeri pari, &
comincia da 2. si potrà ancora sapere la quantità di detti
numeri con multiplicare la metà dell'ultimo numero in
il

il numero prossimo maggiore, & detta metà di numeri
dinota ancora la metà della somma di detta progres-
sione, si che v. g. in questa progressione, 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26.

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26.

La metà di 26. sono 13. & tanti sono detti termini pi-
gliati; moltiplicati poi detti 13. con 28. che doueria se-
guire doppo li 26. fanno 364. & tanti sono li numeri da
detta progressione.

La seconda regola, che si caua dalle cose dette è, che in
qual si voglia progressione Aritmetica: se si saprà il nu-
mero delli termini, con il primo termine, & la differen-
tia con la quale camina detta progressione, si potrà sape-
re l'ultimo termine, di che numero sia, senza che si veda-
no l'altr. termini intermedij, in questo modo, si leua rna
termine, cioè il primo da detta progressione, poi si multi-
plica il numero dell' altri termini per la differenza con
la quale si camina in detta progressione alla quale moltip-
licatione aggiunto poi li numeri del primo termine le-
uato, darà il numero dell' ultimo termine detta progres-
sione, come v. g. in questo esempio.

3. 8. 13. 18. 23. 28. 33. 38. 43. 48.

Doue sono 10. termini, & si camina con 5. di differo-
tia leuato il primo termine 3. restano 9. termini, quali
moltiplicati per 5. che è la differenza, fanno 45. & ag-
giunti poi il primo termine, cioè 3. sono 48. di modo
che non sapendosi li termini, si sa, che detti 48. in tale
progressione tenesse il decimo luogo.

Si suppone dunque proponesse questa dubbio, Harcole di-
mandò ad Arzia quanti boni bancus usposse, li min ba-

Si stanno in 40 luochi in modo tale, che quante volte nel primo luoco sono 3. boui, tante volte nel 2. ci ne sono 5. & nel 3. 7. & nel 4. 9. & così di mano in mano; andò Hercolo al primo luoco, & ritrouò 30. boui si dimanda; quanti boui hauesse Augia, & quanti ne stassero nell' ultimo luoco, poiche essendone 30. nel primo luoco, nel 2. sarebbero 50. & nel 3. 70. & così di mano in mano; si che la differentia è di 20. si fa dunque in questo modo, di 40. termini, se ne leua uno, & restano 39. & detti multiplicati per 20. che sono la differentia, fanno 780. a quali aggiunto il primo termine di 30. fanno 810. & tanti boui saranno nel luoco 40. per sapere poi quanti siano, si aggiungono li 30. alli 810. che fanno 840. & detti multiplicati per 20. metà di detti termini sono 16800 & tanti sono tutti detti boui, conforme si vede anco in tutta detta progressione fatta distintamente.

30. 50. 70. 90. 110. 130. 150. 170. 190. 210
230. 250. 270. 290. 310. 330. 350. 370. 390
410. 430. 450. 470. 490. 510. 530. 550. 570
590. 610. 630. 650. 670. 690. 710. 730. 750
770. 790. 810.

Così ancora è morto un Príncipe, & ha lasciato, che di 30. della sua famiglia si diano al più infimo scuti 100. al' altro 2. scuti 140. al 3. scuti 180. & così di mano in mano sino alli 20. con 40. di differentia per ciascheduno; se dimanda quanti scuti toccheranno al' vigesimo, & quanti denari ci vogliono per tutti 20. si leua il primo termine di 100. & restano termini 19. poi multiplicati detti 19. per 40. di differentia, sono 760. a quali aggiunti il primo termine di 100. sono 860. tanti scuti toccheranno al

Il vigesimo, & per sapere quanti scuti ci vogliono, si aggiungono li 100. a detti 860. che fanno 960. quali moltiplicati per 10. metà delli termini, sono 9600. & tanti sono li scuti ci vogliono per detti 20. huomini, conforme si vede similmente detta progressione per estensum.

100. 140. 180. 220. 260. 300. 340. 380. 420.
460. 500. 540. 580. 620. 660. 700. 740. 780.
820. 860.



1024. 512. 256. 128. 64. 32. 16. 8. 4. 2. 1. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{32}$

La proprietà poi di detta progressione Geometrica è, che pigliando tre numeri, ouero tre termini di numeri di essa, & multiplicando il primo con il 3. darà l'istesso numero, che darà il 2. multiplicato in se stesso, come v. g. pigliando questi tre termini di numeri 12. 24. 48. multiplicati li 12. con 48. fanno 576. così ancora fa multiplicati li 24. in se stessi. Et si se pigliano 4. termini di detta progressione con multiplicare, il primo con il 4. darà l'istesso numero, che multiplicando il 2. con il 3. v. g. 12. 24. 48. 96. multiplicati li 12. con 96. fanno 1152. così ancora fa il multiplicare li 24. con li 48. il che similmente aduene in qualsiuoglia 4. numeri, benché non proporzionale, ma basta, che quella proportionione è fra il primo, & 2. fra il 2. & 4. v. g. 4. 8. 15. 30. doue multiplicato il 4. con 30. fanno 120. & così ancora farà il multiplicare 8. con 15.

Da detta proprietà si caua, che in qualsiuoglia progressione geometrica, essendo li termini spari, con multiplicare il primo numero, con l'ultimo, darà l'istesso numero, che multiplicandosi il 2. numero con lo penultimo, & il 3. con l'antepenultimo, et così di mano in mano, & quello di mezzo con multiplicarsi in se stesso, darà similmente l'istesso numero; ma essendo la progressione di numeri pari, non ci occorre detto mezzo, & però con multiplicare detti numeri, conforme si è detto, daranno sempre eguale numero.

v. g. 5. 10. 20. 40. 80. 160. 320. 640.

ouero 4. 8. 16. 32. 64. 128. 256. 512. 1024.

L 4 Mul-

176 Progressioni Geometriche Trat. VII.

Moltiplicati li 5. con li 640. sono 3200. così ancora sarà con moltiplicare li 10. con 320. & tutti l'altri, similmente ancora, moltiplicati li 4. cō 1024. sono 4096 & così faranno tutti l'altri, & li 64. di mezzo moltiplicati in se stessi, fanno similmente 4096.

Sogliono ancora usare li Geometri vn' altra progressione per proportioni sequialtera, cioè, che vno numero a-
nanzì il suo antecedente in $\frac{1}{2}$ v.g. 4 6. 9 13 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{4}$ 30 $\frac{3}{8}$ 45 $\frac{9}{16}$ &c. quale cose tutte presupposte si caua la prima regola, & è questa.

In qualsiuoglia progressione Geometrica, essendo noto il primo, & ultimo numero, & la differentia con la quale si camina in detta progressione; si può sapere tutti li numeri si contengono in detta progressione, in questo modo, si sottraeno li numeri del primo termine dalli numeri del l'ultimo termine, & il numero rimanente si diuide per la differentia, ma in vno numero meno, & al numero del cotiente, si aggiunge l'ultimo termine, che farà la summa di tutti li numeri della progressione, v.g.

5. 15. 45. 135. 405. 1215. 3645. 10935.

Sottratti li 5. dalli 10935. sono 10930. & perche in detta progressione, si camina per triplicata proportioni, si hanno da diuidere detti 10930. a due, & daranno al cotiente 5465. al quale numero aggiunto li 10935. del l'ultimo termine, sono 27400. quali sono tutti li numeri di detta progressione, così ancora in quest'altra.

4. 6. 9. 13 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{4}$ 30 $\frac{3}{8}$ 45 $\frac{9}{16}$.

In detta progressione sesquitercia sottratti li 4. da

45 $\frac{9}{16}$

45 $\frac{9}{8}$ restano 41 $\frac{7}{8}$ & perche in detta progressione la sua differentia è $1\frac{1}{2}$ leuato 1. resta $\frac{1}{2}$ per il quale diuiso l' 41 $\frac{7}{8}$ darà al cotiente 83 $\frac{7}{8}$ a quali aggiunto l'ultimo numero 45 $\frac{9}{8}$ (ammano 128 $\frac{1}{2}$ & detti sono li numeri di detta progressione, & così si fa in tutte l'altre.

Ma quando la progressione camina per duplicata proportionione & comincia da vno, all' hora basta duplicare l'ultimo termine, & di detto duplicato leuandone vno resta la somma di tutti li numeri della progressione, v.g. in detta progressione.

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. 256. 512. 1024.

Duplicati li 1024. sono 2048. da quali leuato 1. restano 2047. & questi sono li numeri di detta progressione; dal che similmente si caua, che leuando da qualsiuoglia termine di progressione vno, il rimanente è la somma di tutti li termini antecedente in detta progressione, conforme si può scorgere in detto esempio.

La seconda regola, che similmente si può cauare è, che in ogni progressione geometrica, che comincia da vno, moltiplicando, qualsiuoglia numero di detta progressione in se stesso farà vno numero, con tanto interuallo, quanto è quello, che lui tiene del primo numero, & così ancora moltiplicandosi qualche numero di detta progressione per l'altro numero minore di detta progressione, farà vno numero con tanto interuallo, quanto tiene detto numero minore del primo numero, v.g. in questa progressione duplicata.

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. 256. 512. 1024. 2048.

Mul-

176 Progressione Geometriche Tr. VIII.

Moltiplicandosi, v.g. li 32. in se stessi quali standa nel 6. luogo, farà di numero 1024. Istesso finalmente luogo da detto numero 32. & così detto numero 1024. viene ad occupare l'undecimo luogo, & moltiplicandosi, v.g. li 128. per li 8. fariano 1024. 4. loco da detti 128 perche li 8. tengono il 4. loco cominciando da uno, & così fariano tutti l'altri.

Di modo, che in tutte le progressioni geometriche, che cominciano da vno, ogni numero multiplicato in se stesso, farà num. cō duplicato intervallo, meno vno loco, dal primo, & multiplicandosi per altro numero minore di detta progressione, farà di tanto intervallo, quanto è detto numero minore dal primo numero, come si può vedere anco in quell'altra progressione triplicata.

1.3.9.27.81.243.729.2187.6561.9683.

Moltiplicati li 81. del quinto luogo in se stesso, farà 6561. per il nono loco, uno meno del duplicato, che sarà il decimo loco: & moltiplicati li 729. per 9. fanno 9561 terzo loco distante da detti 729. conforme il 9. tiene il 3. loco da uno.

Et perciò sapere più facilmente, si possono fare dette
progressioni, & poi di sotto a ciascheduno termine di nu-
meri, porre li numeri naturali, ma nel primo termine por-
re uno zero, & poi ogni numero moltiplicato in se stesso,
si potrà porre al duplicato loco il numero, che sta di sotto a
detto numero moltiplicato, v.g. in questa progressione
quadrupla.

1. 4. 16. 64. 256. 1024. 4096. 16384. 65536
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Mul-

Moltiplicati li 64. in se stessi, faranno 4096. da porre nel duplicato loco del numero, che sta sotto a detti 64. che sarà il 6 perche sotto al 64. vi sta il 3. & il suo duplicato è 6. & così faranno tutti l'altri numeri, da doue si cava, che ciascheduno può cognoscere il numero di qualsivoglia loco delle progressioni, benché non si scriuano li numeri intermedi, v. g. se desidera sapere il vigesimoquinto loco di una progressione dupla, che comincia da uno, conforme quini si vede.

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64.
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Moltiplicati, v. g. li 8. in se stessi fanno 64. per il settimo loco in ordine, & moltiplicati li 64. in se stessi, fanno 4096. per il terzodecimo loco, & moltiplicati in se stessi 4096. fanno 16777216. per il 25. loco, di modo, che conforme sotto li 8. sta il 3. così sotto li 64. sta il 6. & sotto alli 4096. deue stare il 12. & sotto alli 16777216 deue stare 24. che sarà in loco 25. in ordine al primo, & se si cercasse il numero del loco 28. basterebbe moltiplicare detto numero del loco 25. per li 8. loco 4. perche il loco 28. è il 4. dello 25. & così sariano 134217728. per detto loco 28.

Quando poi dette progressioni non cominciano da uno, ma da più numeri, all'hora se fa dell'istesso modo, ma si diuide il numero doppo, che è moltiplicato al primo numero delle progressioni, & il cotiente è il numero da porre nel loco duplicato, conforme al numero gli sta, & douerria stare di sotto a detto numero moltiplicato, v. g. in questa progressione.

180 Progressioni Geometriche Tr. VIII.

3.6.12.24.48.96.192.384.768.1536.

0.1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Moltiplicati li 48. in se, fanno 2304. quali diuisi al 3 primo numero, darà al cotiente 768. quali si deuono porre all'ottano loco duplicato del 4 che sta sotto alli 48. moltiplicati, di modo, che in qualsiuoglia modo cominciano dette progressioni, si può cognoscere, il numero di qualsiuoglia loco, benché non siano tutti distesi li luochi intermedij.

Si che habbiamo detto nella prima regola, che in ogni progressione geometrica, che comincia da vno, con leuare vno da qualsiuoglia termine di numeri, resterà la somma di tutti li numeri antecedenti, & nella 2. regola, che in tal caso, cioè in tali progressioni, che cominciano da vno, moltiplicando se stesso qualsiuoglia numero di detti termini, farà numero per il duplicato loco, meno vno, che non è detto numero moltiplicato, dal che viene, che si a qualsiuoglia somma di più termini insieme uniti, vi si aggiungerà vno, & poi detto numero se moltiplicherà in se stesso, farà numero per il duplicato loco, con mancare però prima vno numero da detto numero moltiplicato, come v.g. in questa progressione.

1. 2. 4. 8. 16. 32.

Con leuare vno da 32. restano 31. che sono la somma di tutti li termini antecedenti; a detta somma, se di nouo si aggiunge vno, sono 32. quali moltiplicati in se stessi, fanno 1024. che sarà l' undecimo loco di detta progressione, & con leuarne vno, sarà la somma delli dieci ter-

mini antecedenti; si che se vno volesse sapere breuemente, quanti numeri sariano in vna progressione di 64. termini, quante sono le case delli scacchi, & con porre, v.g. vno vago di grano nella prima casa, due nella 2. 4. nella 3. & così di mano in mano per proportionne dupla sino al li 64. si faria in questo modo, per sapere quanti vaghi di grano ci vorriano per empire detti 64. lochi di scacchi.

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128.

Per sapere la summa di detti 8. termini, se radoppia il numero di 128. che sariano 256. & poi se ne manca vno, & restariano 255. per la summa di tutti detti 8. termini; a quali poi di nuouo aggiunto vno, sono 256. & multiplicati in se stessi, fanno 65536. da quali leuato vno, restarà la summa di 16. luochi; poi aggiunto di nuouo, detto vno, & multiplicati detti 65536. in se stessi, fanno 4294967296. da quali leuandone vno, restarà la summa di 32. luochi; poi messoni di nuouo detto vno, & multiplicati detti 4294967296. in se stessi, fanno 18446744073709551616. del quale numero leuato vno, restarà la summa di 64. luochi, & tanti sariano li vaghi di grano vorrebbono in detti luochi di scacchi; quale summa non solo non si patria ritrouare in più Regni, ma ne anco in tutto il Mondo, benchè a molti parerà impossibile; nondimeno questo si può chiarire in questo modo.

Conforme l'esperientia de' Medici, & Spetiali, 60. vaghi di grano fanno vna dramma, cioè $\frac{1}{2}$ di vn'oncia, & per consequenza, in vn'oncia, ci vorranno vaghi 480. di grano, & per vna libra 5760. & perche vno rubio alla misura Romana, che sono 5. tomo la Napolitane, ouero

ouero una salma, ordinariamente si fanno 600. libbre, però ci vorrebbono in uno rubio vaghi di grano 3456000. spartiti poi tutti li vaghi di grana, che sono nelli 64. luochi di scacchi, a detti 3456000. daranno rubij 533759983365. & poco più, & alla misura Napolitana (supposto, che ogni rubio sia 5. tomola) lariano tomola 2668799916825. quali difficilmente si ritroueranno in tutto il Mondo:

Et essendo, che una Naue, si carica con 3000. rubij di grano; bauendosi da caricare detto grano, ci vorriano Naue 1779199852 si che ciascheduno può considerare, che per caricare tante Navi, non saria nel Mondo tanto grano.

E si nel Mondo non si ritroueriano tanti vaghi di grano, cioè 18446744073709551615. con molta più ragione bisogna dire ancora, che nel Mondo non se ritroueriano tanti quattrini, benché tutti li denari del Mondo, se risoluessero in quattrini.

E che sia il vero. Vno scuto Romano sono dieci giulij, cioè quattrini 500. & dieci scuti di argento sono una libra; poi si se diuidessero li numeri già detti delli 64. luochi de scacchi, per 500. dariano scuti 36893488147419103 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ quali pesariano libbre d'argento 3074457345618258 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ & perche una naue habbiamo presupposto, che se carichi con rubij 3000. di grano, che sono di peso li 1800000. però caricando per ciascheduna naue libbre 1800000. d'argento; vi vorriano naue 1708032858 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{32}$ $\frac{1}{64}$ doue ciascheduno si può imaginare, come mai si potriano ritrouare tanti scuti d'argento per caricare dette navi.

Poniamo dunque, che uno Re habbia da vendere 40. Città con prezzo di uno quattrino della prima; due quattrini

trini della 2. 4. quattrini per la 3. & così di mano in mano caminando per dupla portione in ciascheduna Città, con patto ancora, che detto compratore tenghi detti denari a censo & dia 5. per 100. Se dimanda quanto saria il prezzo di dette 40. Città, & quanto saria la rendita, che laria detto prezzo in ciascheduno anno? poniamo cinque termini, cioè 1. 2. 4. 8. 16. che sono in tutto 31. poi aggiunto 1. sono 32. quali multiplicati in se stessi, faranno 1024. de quali 1023. faranno la summa di dieci termini, poi aggiuntoui uno fanno 1024. quali multiplicati in se stessi faranno 1048576. da quali lenato uno resterà per summa di 20. termini 1048575. poi di nuovo aggiuntoui detto uno fanno 1048576. quali multiplicati in se stessi, faranno 1099511627776. da quali con mancare uno, resterà la summa di quaranta termini, che faranno quattrini 1099511627775. & tanto farà il prezzo di dette 40. Città; quali quattrini fanno scuti 2199023255 $\frac{2}{5}$ alla ragione di 500. quattrini per scuto, conforme la moneta Romana. Renderiano di poi detti scuti in ciaschedun' anno alla ragione di 5. per cento, scuti 2199023255 $\frac{5}{100}$ cioè baiocchi 55. quale entrata non ha qualsiuoglia Monarca del Mondo.

Sì che era ancora molto bona quella vendita, di quel cauallo che haueua 24. chiodi nelli piedi, & il padrone ne dimandaua uno quattrino del primo chiodo, due di 2. 4. del 3. & così di mano in mano per dupla proportion; resterà detto cauallo quattrini 16777215 che sono scuti, 33554 $\frac{2}{5}$ che laria uno prezzo molto commodo per uno cauallo.

TRATTATO NONO

Della Radice Quadra.

Che cosa sia Radice quadra, & come si caui dalli numeri, Cap. Vnico.

Radice quadra, ouero Numero quadrato non vuole dire altro, se non che vno numero, il quale si fa dalla multiplicatione di vno numero in se stesso, come v.g. li 81. si fanno dalli 9 multiplicati in se, & li 64. si fanno dalli 8. li 49. dalli 7 così ancora li 4. dal 2. & l'vno ancora vien chiamato dalli Aritmerici numero quadrato, perche multiplicato in se stesso fa sempre vno; Li numeri poi, che in se multiplicati fanno detto numero quadrato, se chiama radice di detto numero, di modo, che estrattione di radice quadra, vuol dire, ritrouare quel numero, che multiplicato in se stesso, facci il numero proposto, si sarà quadrato, come v.g. dal numero 100. si cauerà la sua radice 10 perche in se multiplicati fanno 100. così ancora da 36. si cauerà 6. & da 256. si cauerà 16. & se il numero proposto non sarà quadrato, la radice sarà del numero più prossimo quadrato a detto numero proposto, come v.g. da 3375. si caua la sua radice 59. quale numero in se multiplicato fa 3364. più prossimo numero quadrato, di detto numero 3375. come poi si caui detta radice, si fa in questo modo.

Essendo proposto il numero, del quale si ha da ritrouare la sua radice primieramente si segna di punti con cominciare dalla prima figura di mano destra, & poi la 3. & la 5. la 7. & c. sempre per numero sparo, sino al fine di

di modo, che da uno punto all' altro vi sia solamente una figura, come v.g. in questo numero 12^o 47465. si che ogni punto viene ad hauere due figure, cioè quella sopra al punto, & la sequente, & quanti punti saranno nel numero; tante figure haerà la sua radice.

Di poi si comincia dal primo punto da mano sinistra, & si piglia la radice di quell' una, o due figure, che sono sopra detto punto, & si pone sotto a detto punto, auertendo, che detta radice non può essere più che 9. & si scrive anco detta radice dietro una linea, conforme si fa al cotiente, & si moltiplica similmente al modo di detto cotiente con l' istessa figura di sotto al punto, & il moltiplicato si sottrae dal numero sopraposto, conforme si fa nella diuisione, notando, che il numero, che resta non può essere più che duplicato della radice messa sotto al punto.

Il che fatto, si raddoppia detta radice, & si pone sotto alla figura antecedente del sequente punto, & essendo più figure, si pongono appresso verso mano sinistra, non toccando il punto sequente, perche in si ha da porre la figura noua del cotiente, poi si vede quante volte cape detto numero duplicato nel numero, che gli sta di sopra, & si pone detto cotiente tanto al suo luoco, come sotto del 2. punto, & si moltiplica detta figura per tutte le figure vengono ad essere sotto li punti, & detto moltiplicato si sottrae come di sopra, auuertendo prima si scriva la figura al cotiente, vedere, se moltiplicando detta figura con detto numero duplicato facci numero tale da potersi sottrarre dal numero sopraposto, perche altrimenti si faria errato, ouero si faria zero al cotiente, & di nouo si raddoppia la radice messa al cotiente, & se scrive detto duplicato conforme si è detto di sopra, senza toccare il terzo più

to, conforme il tutto si chiarirà meglio con esempj.

Ritrouiamo la radice quadra di questo numero 11664
fatti li punti conforme si vede, si piglia la radice dell'vno, quale radice è
similmente vno; si pone detto vno tanto sotto al numero vno, quanto al luoco
del cotiente; poi multiplicato l'vno del
cotiente; cō l'vno sotto la linea, farà pure vno, quale sot-
tratto da vno di sopra, resta zero, poi duplicata detta fi-
gura del cotiente 1. fa 2. quale messo sotto al 2. 1. si ve-
de, che non cape detto 2. in vno, però si fa zero al cotien-
te, & zero sotto al 6. puntato, poi si raddoppia tutto il co-
tiente 10. che farà 20. quali messi, cioè zero sotto al 2. 6.
e il 2. sotto al zero primo. sopra quali 20. veggono a stare
166. nel quale numero li 20. capeno 8. volte; si fa 8. al
cotiente, & otto sotto al 4. puntato, poi multiplicato det-
to otto per tutto il diuifore 208. summano 1664. ne ci
resta minutia alcuna, però la radice di detto numero sarà
108. conforme si vede in detto esempio.

$$\begin{array}{r} 0 \\ +1664 \\ +2008 \\ \hline 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 108 \end{array}$$

Ritrouiamo di nuouo la radice di questo numero
331533025. si piglia la radice quadra del 5. è perche
il 5. non è numero quadrato si
piglia la radice del numero qua-
drato più vicino a detto 5. che
è 2. perche multiplicato in se
fa 4. detto 2. si pone tanto sot-
to al 5. quanto al cotiente, &
multiplicati insieme fanno 4. quali sottratti dal 5. resta
vno, si cassa il 5. & il 2. di sotto poi si raddoppia la figu-
ra del cotiente 2. che fa 4. quali si pongono sotto al 3. et
si vede, che detto 4. cape nel numero di sopra, che sono 15
3. volte, quali si pongono tanto al cotiente, quanto sotto
l'vno

$$\begin{array}{r} + 3 \\ +31533025 \\ +436 \\ \hline 40 \end{array} \quad \begin{array}{r} 180 \end{array}$$

l'uno puntato; multiplicando poi detto 3. per tutto il di-
uifore 43. fanno 129. quali sottratti da 131. di sopra
restano 2. poi duplicato il cotiente 23. sono 46. quali si
pongono, cioè il 6. sotto al 5. & il 4. sotto al 3. cassato,
ma perche sopra sono 25. quali non contengono 46. però
si fa zero al cotiente, & sotto al 6. di modo, che sopra re-
stano 2533. duplicato poi il cotiente 230. fanno 460.
qual si pongono, cioè il zero sotto l'ultimo 3. li 6. sotto al
zero, & il 4. sotto l'altro 4. cassato, quali numeri 460.
ben capeno al numero 2533 che sta di sopra, & ci cape-
no 5. volte, & fanno 2300

si pone dunque 5. al cotien-
te, & 5. sotto al zero pun-
tato, & multiplicati detti
5. per tutto il diuifore
4605, fanno 23025. quali


$$\begin{array}{r}
 + \quad 2305 \\
 531533025 \quad | \quad 23055 \\
 \underline{460505} \\
 461
 \end{array}$$

sottratti dal numero di sopra 25330. restano 2305. du-
plicati poi le figure del cotiente, fanno 4610. quali si po-
nno, cioè il zero sotto al 2. & l'altre di mano in mano
appresso, poi si vede quante volte cape detto numero di
sopra, che sono 23052. & si vede, che cape 5. volte, per-
che fanno 23050. si pongono dunque 5. al cotiente, &
5. sotto al 5. puntato, poi multiplicato detto 5. per tutto
il diuifore, summano 230525. conforme al numero, che
sta sopra, dunque la radice di questo numero 531533025
sarà 23055. come si vede in detto esempio.

Quando poi il numero non è quadrato all'hora si estra-
la radice del summo quadrato, cioè di quel num. più vici-
no a detto numero non quadrato, come v. g. haueuosi a ri-
trouare la radice di 90. si ritrouaria il 9. quale è radice
di 81. perche detti 90. non sono numero quadrato, essen-
do, che non ci è numero, quale multiplicato in se stesso pos-

si fare 90. così anco se si hanesse da canare detta radice da 55. si canaria il 7. radice del 49. più prossima a detto 55. numero non quadrato.

Le regole poi per vedere quando l' operatione è fatta bona, sono 3. cōforme si è detto della diuisione de' numeri intieri, cioè quella del 9. del 7. & il multiplicare in se stessa detta radice ritrouata mīssa nel cottente; perche bisogna di l' istesso numero da doue si è canata, la regola poi del 9. & 7. si lenano li 9. o 7. dalla radice ritrouata, & il rimanente si pone tanto a mano destra, come a mano sinistra della croce, poi si multiplicano dette figure frā se, & lenando li 9. o 7. si pone il rimanente sopra la croce, & poi si lenano detti 9. o 7. dal numero proposto, che darā simile figura a quella di sopr. la croce, v.g. nel primo esemplo verrā in questo modo leuando li 9. da 108. resta zero da porsi da tutte due le parti della croce, & perche multiplicati detti zeri in se, fanno similmente zero, però si pone zero sopra la croce, così ancora restarā zero leuando li 9. da 11664. numero proposto.



Enel secondo esemplo verrā in questo modo poiche leuando li 9. da 13055. restano 6. da porsi in tutte due le parti della croce, & multiplicati detti 6. frā se, fanno 36. da quali leuando li noue resta zero da porre sopra la croce, & poi leuando li 9. dal numero proposto 531533025. resta similmente zero, da porre sotto la croce, di modo, che stanno ben fatte dette operationi.



E ancora da aduertire, che il numero più, che rimane nella estrattione di qualsiuoglia radice da qualsiuoglia

numero, non può essere più, che il doppio, dalla radice ritrouata, di modo, che si sarà vno numero più di detto duplicato numero, sarà segno, che detta radice bisogna sia vn numero più di quello si è ritrouato, perche ogni numero quadrato auanza il suo prossimo minore quadrato in duplicato numero. & vno di più, che non è la radice di di detto numero minore quadrato, v.g. 81. numero quadrato, auanza il suo minore prossimo quadrato 64. in 17. quali sono duplicato numero, & vno di più della radice di detti 64. che è 8. è, che sia vero, aggiungendo detti 17. alli 64. fanno 81. & così la sua radice sarà 9. sì che mai può essere il numero rimanente più del duplicato della radice ritrouata; quale ancora sarà buona regola, per sapere si l' operatione sia ben fatta, il che basti per questo luogo, & per fine di quest'opera.

FINE.



| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----|------------|
| v.g. 7. per $4\frac{3}{4}$ | v.g. 7. per $4\frac{3}{4}$ | 56 | 4 del fine |
| $\frac{3}{4}$ | $\frac{1}{4}$ | 50 | 8 |
| $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ | 50 | 9 |
| esato | vsato | 50 | 2 |
| cape in detto
numeratore. | cape di detto
denominatore. | 53 | 5 |
| $7\frac{3}{4}$ | $7\frac{3}{4}$ | 54 | 17 |
| $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 55 | 2 |
| $3\frac{4}{5}$ | $3\frac{4}{5}$ | 58 | 8 |
| v.g. $\frac{1}{4}$ | v.g. $\frac{1}{4}$ | 61 | 5 |
| che dette $\frac{7}{4}$ | che dette $\frac{7}{4}$ | 62 | 3 |
| $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 64 | 2 |
| $10\frac{7}{8}$ | $10\frac{7}{8}$ | 66 | 3 |
| $20\frac{1}{2}$ | $26\frac{1}{2}$ | 63 | 11 |
| con il 4. & cō
il 2. con il 3. | con il 4. & il 2
con il 3. | 74 | 2 del fine |
| baiocchi $19\frac{1}{16}$ | baiocchi $19\frac{1}{16}$ | 87 | 10 |
| & il secondo $\frac{2}{3}$ | & il secondo $\frac{2}{3}$ | 105 | 1 |
| vicercare | ricenere | 105 | 10 |

100

442

მზე მზ

მზ

მზ

500

